



LandsIM3D®

Partagez votre vision du paysage



Plantes disponibles organisées en bases

VERSION 1.0

Catalogue des plantes

Table des matières (cliquez sur le nom d'une plante pour vous y rendre)

Base Europe tempérée.....	21
1 Abricotier japonais (<i>Prunus mume</i>)	21
2 Agérate bleue (<i>Ageratum houstonianum</i>)	21
3 Alchémille (<i>Alchemilla mollis</i>)	21
4 Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	22
5 Amélanchier-l (<i>Amelanchier laevis</i>)	22
6 Anthurium (<i>Anthurium andreaeanum</i>)	22
7 Arbre à papillons (<i>Buddleja davidii</i>)	23
8 Ardisia de Chine (<i>Ardisia crenata</i>)	23
9 Ardisia du Japon (<i>Ardisia japonica</i>)	23
10 Aulne glutineux, verne, vergne (<i>Alnus glutinosa</i>)	24
11 Avoine bleue (<i>Helictotrichon sempervirens</i>)	24
12 Avoine cultivée (<i>Avena pratense</i>)	24
13 Bambou nain (<i>Arundinaria sp.</i>)	25
14 Bambou pubescent (<i>Phyllostachis edulis 'Heterocycla' (syn 'Pubescens')</i>)	25
15 Bananier commun (<i>Musa domestica</i>)	25
16 Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	26
17 Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	26
18 Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	26
19 Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	27
20 Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	27
21 Blé barbu (<i>Triticum sp.-a</i>)	27
22 Bois-joli ou bois-gentil (<i>Daphne mezereum</i>)	27
23 Boule de neige (<i>Viburnum plicatum 'Mariesii'</i>)	28
24 Bouleau commun, blanc ou verruqueux (<i>Betula pendula (verrucosa)</i>)	28
25 Bouleau de l'Himalaya (<i>Betula utilis</i>)	28
26 Bruyère (<i>Erica carnea</i>)	29
27 Bruyère 'Spring Cream' (<i>Calluna vulgaris 'Spring Cream'</i>)	29
28 Buddleia à pompons (<i>Buddleja globosa</i>)	29
29 Buis 'Green Mountain' (<i>Buxus x sheridan 'Green Mountain'</i>)	30
30 Buisson taillé en 'coussin' (<i>Dumus indeterminatus</i>)	30
31 Callune fausse bruyère, brande (<i>Calluna vulgaris</i>)	30
32 Cèdre bleu (<i>Cedrus atlantica</i>)	31
33 Cerisier à fleurs japonais-e (<i>Prunus x yedoensis</i>)	31
34 Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais (<i>Prunus serrulata (lannesiana)</i>)	31
35 Charme (<i>Carpinus betula</i>)	32
36 Châtaignier-a (<i>Castanea sativa-a</i>)	32
37 Châtaignier-b (<i>Castanea sativa-b</i>)	32
38 Chêne pédonculé (<i>Quercus Pedunculata (Robur)</i>)	33
39 Chêne Rouvre (<i>Quercus petrae</i>)	33
40 Chèvrefeuille rampant (<i>Lonicera sp.</i>)	33
41 Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	34
42 Clématite (<i>Clematis jackmanii 'Superba'</i>)	34
43 Coleus (<i>Coleus blumei 'sanguineum'</i>)	34
44 Coléus à feuilles larges (<i>Coleus blumei 'Brightness'</i>)	35
45 Coréopsis à verticilles (<i>Coreopsis verticillata</i>)	35
46 Cormier (<i>Sorbus domestica</i>)	35
47 Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	36
48 Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos 'Sensation'</i>)	36
49 Cotoneaster (<i>Cotoneaster franchetti</i>)	36
50 Crocus (<i>Crocus sp.</i>)	37
51 Cytise (<i>Laburnum x watereri 'Vossii'</i>)	37
52 Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	37
53 Epicéa (<i>Picea abies</i>)	38
54 Epicéa 'pyramidalis' (<i>Picea abies var. pyramidalis</i>)	38
55 Pinette blanche (<i>Picea glauca</i>)	38

56	Erable champêtre (forme arbre) (<i>Acer campestre</i>)	39
57	Erable champêtre forme taillis (<i>Acer campestre forme taillis</i>)	39
58	Erable plane (<i>Acer platanoides</i>)	39
59	Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	40
60	Ficus benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	40
61	Fleurs à massifs (<i>Flos indeterminatus</i>)	40
62	Forsythia ou mimosa de Paris (<i>Forsythia x intermedia</i>)	41
63	Fougère femelle (<i>Athyrium filix femina</i>)	41
64	Fougère mâle (<i>Dryopteris pseudomonas</i>)	41
65	Frêne à fleurs (<i>Fraxinus ornus</i>)	42
66	Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i>)	42
67	Frêne oxyphylle (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	42
68	Frêne taillé (<i>Fraxinus excelsior (trimmed)</i>)	43
69	Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	43
70	Genévrier commun rampant (<i>Juniperus communis 'Prostrata'</i>)	43
71	Gingembre parfumé (<i>Hedychium gardnerianum</i>)	44
72	Gueule de loup (<i>Antirrhinum majus 'Wedding Bells'</i>)	44
73	Hamamélis (<i>Hamamelis mollis</i>)	44
74	Hélianthème faux alysse (<i>Helianthemum nummularium</i>)	45
75	Herbe-a (<i>Herba indeterminata-a</i>)	45
76	Herbe-b (<i>Herba indeterminata-b</i>)	45
77	Herbe-c (<i>Herba indeterminata-c</i>)	46
78	Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	46
79	Hêtre commun-a (<i>Fagus sylvatica-a</i>)	46
80	Hêtre commun-b (<i>Fagus sylvatica-b</i>)	47
81	Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	47
82	Hortensia grimpant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	47
83	Houx (<i>Ilex aquifolia</i>)	48
84	If des bois (<i>Taxus baccata</i>)	48
85	Immortelle de Virginie (<i>Anaphalis margaritacea</i>)	48
86	Iris hollandais (<i>Iris lusitanica x tingitana</i>)	49
87	Jasmin d'hiver (<i>Jasminum nudiflorum</i>)	49
88	Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	49
89	Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	50
90	Laurier cerise (<i>Prunus laurocerasus</i>)	50
91	Laurier du Portugal ou laurier palme (<i>Prunus lusitanica</i>)	50
92	Laurier rose (<i>Nerium oleander</i>)	51
93	Laurier-tin (<i>Viburnum tinus</i>)	51
94	Lierre rampant-a (<i>Hedera helix 'Glacier'</i>)	51
95	Lierre rampant-b (<i>Hedera helix var.</i>)	52
96	Lilas commun (<i>Syringa vulgaris</i>)	52
97	Lin textile (<i>Linum usitatissimum</i>)	52
98	Luzerne cultivée (<i>Medicago sativa</i>)	53
99	Lys blanc (<i>Lilium candidum</i>)	53
100	Lys carnaval (<i>Lilium bulbiferum</i>)	53
101	Maïs cultivé (<i>Zea mays</i>)	54
102	Marronnier-a (<i>Aesculus x hippocastaneum-a</i>)	54
103	Marronnier-b (<i>Aesculus x hippocastaneum-b</i>)	54
104	Marronnier-c (<i>Aesculus x hippocastaneum-c</i>)	55
105	Marronnier-d (<i>Aesculus x hippocastaneum-d</i>)	55
106	Massette noire (<i>Typha latifolia</i>)	55
107	Mélèze d'Europe (<i>Larix decidua</i>)	56
108	Merisier (<i>Prunus avium</i>)	56
109	Merisier (<i>Prunus avium</i>)	56
110	Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	57
111	Myrtilier commun, myrtille, airelle, brimbelle (<i>Vaccinium myrtillum</i>)	57
112	Narthecium (<i>Narthecium sp.</i>)	57
113	Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	58
114	Noisetier de Turquie (<i>Corylus colurna</i>)	58
115	Noyer commun (<i>Juglans regia</i>)	58
116	Olivier de Bohême, chalef (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)	59

117	Orme champêtre (<i>Ulmus campestris</i>)	59
118	Orpin géant (<i>Sedum telephium</i>)	59
119	Palette de peintre (<i>Caladium bicolor</i>)	60
120	Palmier d'intérieur-b (<i>Phoenix humilis</i>)	60
121	Pâturin (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	60
122	Pavot d'Islande (<i>Papaver nudicaule</i>)	61
123	Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	61
124	Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	61
125	Perce-neige (<i>Galanthus niva</i>)	62
126	Pervenche (<i>Vinca major</i>)	62
127	Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	62
128	Peuplier blanc (<i>Populus alba</i>)	63
129	Peuplier d'Italie (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	63
130	Peuplier noir (<i>Populus nigra</i>)	63
131	Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i>)	64
132	Pin de l'Himalaya (<i>Pinus wallichiana</i>)	64
133	Pin de montagne, pin de Mongolie (<i>Pinus mugo (montana) 'Mungho'</i>)	64
134	Pin laricio (<i>Pinus nigra sp. laricio</i>)	65
135	Pin maritime (<i>Pinus pinaster</i>)	65
136	Pin noir d'Autriche (<i>Pinus nigra</i>)	65
137	Pin sylvestre (<i>Pinus sylvestris</i>)	66
138	Platane taillé (<i>Platanus x acerifolia-c</i>)	66
139	Platane taillé (grand) (<i>Platanus x acerifolia-d</i>)	66
140	Platane-a (<i>Platanus x acerifolia-a</i>)	67
141	Polygonum rouge (<i>Polygonum affine 'Darjeeling red'</i>)	67
142	Prunier (ou pêcher) décoratif (<i>Prunus x persica</i>)	67
143	Prunier décoratif-w (<i>Prunus x padus</i>)	68
144	Raisin d'ours, busserole (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)	68
145	Rosier ancien-c (<i>Rosa 'Golden Wings'</i>)	68
146	Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	69
147	Rosier grim pant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	69
148	Rosier polyantha (<i>Rosa 'Yesterday'</i>)	69
149	Sapin de Douglas (<i>Pseudotsuga douglasii</i>)	70
150	Saule argenté, saule blanc, saule vivier (<i>Salix alba-d</i>)	70
151	Saule pleureur (<i>Salix alba 'Chrysocoma'</i>)	70
152	Saule taillé (<i>Salix alba-b</i>)	71
153	Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii 'Gaiety'</i>)	71
154	Skimmia (<i>Skimmia japonica var.</i>)	71
155	Sorbier des oiseaux, sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i>)	72
156	Sorbier torminal, alisier (<i>Sorbus torminalis</i>)	72
157	Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	72
158	Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana glauca 'Domino'</i>)	73
159	Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana glauca 'Sensation'</i>)	73
160	Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	73
161	Tilleul à grandes feuilles, tilleul de Hollande (<i>Tilia platyphyllos</i>)	74
162	Tilleul-a (<i>Tilia cordata</i>)	74
163	Tilleul-b (<i>Tilia x europaea</i>)	74
164	Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	75
165	Trèfle blanc (<i>Trifolium pratense</i>)	75
166	Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa 'x Darwin'</i>)	75
167	Valériane glauque (<i>Centranthus ruber 'Coccineus'</i>)	76
168	Vigne vraie (<i>Vitis vinifera</i>)	76
169	Viorne à feuilles de néflier (<i>Viburnum rhytidophyllum</i>)	76
170	Viorne lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	77
171	Weigélia (<i>Weigela 'B. Ruby'</i>)	77

Base Méditerranée.....	78	
1	Abricotier japonais (<i>Prunus mume</i>)	78
2	Albizia (<i>Albizia julibrissin</i>)	78
3	Albizia gommier (<i>Albizia gummifera</i>)	78
4	Alchémille (<i>Alchemilla mollis</i>)	79
5	Aloès de Volken (<i>Aloe volkensii</i>)	79
6	Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	79
7	Amélanchier-1 (<i>Amelanchier laevis</i>)	80
8	Anthurium (<i>Anthurium andreaeanum</i>)	80
9	Arbousier (forme buisson) (<i>Arbutus unedo-a</i>)	80
10	Arbousier d'Amérique (<i>Arbutus menziesii</i>)	81
11	Arbre de Judée (<i>Cercis silicestrum</i>)	81
12	Ardisia de Chine (<i>Ardisia crenata</i>)	81
13	Ardisia du Japon (<i>Ardisia japonica</i>)	82
14	Bambou nain (<i>Arundinaria sp.</i>)	82
15	Bambou pubescent (<i>Phyllostachis edulis 'Heterocycla' (syn 'Pubescens')</i>)	82
16	Bananier commun (<i>Musa domestica</i>)	83
17	Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	83
18	Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	83
19	Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	84
20	Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	84
21	Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	84
22	Bois-joli ou bois-gentil (<i>Daphne mezereum</i>)	85
23	Bouleau commun, blanc ou verruqueux (<i>Betula pendula (verrucosa)</i>)	85
24	Bruyère (<i>Erica carnea</i>)	85
25	Buis 'Green Mountain' (<i>Buxus x sheridan 'Green Mountain'</i>)	86
26	Buisson taillé en 'coussin' (<i>Dumus indeterminatus</i>)	86
27	Canne de Provence (<i>Arundo donax</i>)	86
28	Catalpa commun (<i>Catalpa bignioïdes</i>)	87
29	Cèdre bleu (<i>Cedrus atlantica</i>)	87
30	Cèdre du Liban (<i>Cedrus libani</i>)	87
31	Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais (<i>Prunus serrulata (lannesiana)</i>)	88
32	Châtaignier-a (<i>Castanea sativa-a</i>)	88
33	Châtaignier-b (<i>Castanea sativa-b</i>)	88
34	Chêne vert (<i>Quercus ilex</i>)	89
35	Chêne vert (forme cépée) (<i>Quercus ilex (bush shape)</i>)	89
36	Chêne vert (forme taillée) (<i>Quercus ilex (pruned shape)</i>)	89
37	Chèvrefeuille rampant (<i>Lonicera sp.</i>)	90
38	Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	90
39	Clématite (<i>Clematis jackmanii 'Superba'</i>)	90
40	Coleus (<i>Coleus blumei 'sanguineum'</i>)	91
41	Coléus à feuilles larges (<i>Coleus blumei 'Brightness'</i>)	91
42	Commiphora (<i>Commiphora trothea</i>)	91
43	Cordia à feuilles ovales (<i>Cordia ovalis</i>)	92
44	Coréopsis à verticilles (<i>Coreopsis verticillata</i>)	92
45	Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	92
46	Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos 'Sensation'</i>)	93
47	Cotoneaster (<i>Cotoneaster franchetti</i>)	93
48	Crotalaria griffe de lion (<i>Crotalaria agatiflora</i>)	93
49	Croton à feuilles larges (<i>Croton macrostachyus</i>)	94
50	Cyprès d'Italie (<i>Cupressus sempervirens</i>)	94
51	Cyprès de Lawson-a (<i>Chamaecyparis lawsonii-a</i>)	94
52	Cyprès de Lawson-b (<i>Chamaecyparis lawsonii-b</i>)	95
53	Cyprès de Provence pyramidal (<i>Cupressus sempervirens 'Horizontalis'</i>)	95
54	Cytise (<i>Laburnum x watereri 'Vossii'</i>)	95
55	Dattier des Canaries (<i>Phoenix canarensis</i>)	96
56	Dattier du désert (<i>Balanites aegyptiaca</i>)	96
57	Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	96
58	Epine du Christ ou arbre à chapeau (<i>Paliurus spinachristi</i>)	97

59	Eucalyptus (<i>Eucalyptus sp.</i>)	97
60	Eucalyptus commun (<i>Eucalyptus globulus</i>)	97
61	Ficus benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	98
62	Ficus benjamina (forme tropicale haie libre) (<i>Ficus benjamina (trop.)</i>)	98
63	Filaire à feuilles étroites ou à feuilles d'olivier (<i>Phyllirea angustifolia</i>)	98
64	Fleurs à massifs (<i>Flos indeterminatus</i>)	99
65	Forsythia ou mimosa de Paris (<i>Forsythia x intermedia</i>)	99
66	Frêne à fleurs (<i>Fraxinus ornus</i>)	99
67	Frêne oxyphylle (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	100
68	Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	100
69	Gingembre parfumé (<i>Hedychium gardnerianum</i>)	100
70	Gueule de loup (<i>Antirrhinum majus 'Wedding Bells'</i>)	101
71	Hamamélis (<i>Hamamelis mollis</i>)	101
72	Héliantheme faux alysse (<i>Helianthemum nummularium</i>)	101
73	Herbe-a (<i>Herba indeterminata-a</i>)	102
74	Herbe-b (<i>Herba indeterminata-b</i>)	102
75	Herbe-c (<i>Herba indeterminata-c</i>)	102
76	Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	103
77	Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	103
78	Hortensia grim pant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	103
79	Houx (<i>Ilex aquifolia</i>)	104
80	Immortelle de Virginie (<i>Anaphalis margaritacea</i>)	104
81	Iris hollandais (<i>Iris lusitanica x tingitana</i>)	104
82	Jasmin d'hiver (<i>Jasminum nudiflorum</i>)	105
83	Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	105
84	Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	105
85	Laurier cerise (<i>Prunus laurocerasus</i>)	106
86	Laurier du Portugal ou laurier palme (<i>Prunus lusitanica</i>)	106
87	Laurier rose (<i>Nerium oleander</i>)	106
88	Laurier-tin (<i>Viburnum tinus</i>)	107
89	Lavande (<i>Lavandula angustifolia</i>)	107
90	Lierre rampant-a (<i>Hedera helix 'Glacier'</i>)	107
91	Lilas commun (<i>Syringa vulgaris</i>)	108
92	Lilas des Indes (<i>Melia azedarach</i>)	108
93	Lin de Narbonne (<i>Linum narbonense</i>)	108
94	Lin textile (<i>Linum usitatissimum</i>)	109
95	Lys blanc (<i>Lilium candidum</i>)	109
96	Lys carnaval (<i>Lilium bulbiferum</i>)	109
97	Mahonia-c (<i>Mahonia x media 'Charity'</i>)	110
98	Mahonia-m (<i>Mahonia aquifolium</i>)	110
99	Mais cultivé (<i>Zea mays</i>)	110
100	Marronnier-a (<i>Aesculus x hippocastaneum-a</i>)	111
101	Marronnier-b (<i>Aesculus x hippocastaneum-b</i>)	111
102	Marronnier-c (<i>Aesculus x hippocastaneum-c</i>)	111
103	Marronnier-d (<i>Aesculus x hippocastaneum-d</i>)	112
104	Mélèze d'Europe (<i>Larix decidua</i>)	112
105	Micocoulier (<i>Celtis australis</i>)	112
106	Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	113
107	Mûrier à papier (<i>Broussonetia papyrifera</i>)	113
108	Myoporum (<i>Myoporum laetum</i>)	113
109	Narthecium (<i>Narthecium sp.</i>)	114
110	Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	114
111	Nerprun (forme buisson) (<i>Rhamnus alaternus-a</i>)	114
112	Nerprun (forme tige) (<i>Rhamnus alaternus-b</i>)	115
113	Noisetier de Turquie (<i>Corylus colurna</i>)	115
114	Noyer commun (<i>Juglans regia</i>)	115
115	Olivier (Européen) (<i>Olea europaea</i>)	116
116	Olivier de Bohême, chalef (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)	116
117	Palette de peintre (<i>Caladium bicolor</i>)	116
118	Palmier (Phœnix) (<i>Phoenix sp.</i>)	117
119	Palmier Arenga (<i>Arenga pinnata</i>)	117

120	Palmier chamaerops (<i>Chamaerops sp.</i>)	117
121	Palmier d'intérieur-b (<i>Phoenix humilis</i>)	118
122	Palmier de Guadeloupe (<i>Brahea edulis</i>)	118
123	Palmier de Washington (<i>Washingtonia filifera</i>)	118
124	Palmier du Mexique (<i>Washingtonia robusta</i>)	119
125	Palmier méditerranéen (<i>Chamaerops humilis</i>)	119
126	Pâturin (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	119
127	Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	120
128	Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	120
129	Pervenche (<i>Vinca major</i>)	120
130	Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	121
131	Peuplier blanc (<i>Populus alba</i>)	121
132	Peuplier d'Italie (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	121
133	Peuplier de Chine, peuplier du Yunnan (<i>Populus yunnanensis</i>)	122
134	Peuplier noir (<i>Populus nigra</i>)	122
135	Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i>)	122
136	Pin d'Alep (<i>Pinus halepensis</i>)	123
137	Pin de l'Himalaya (<i>Pinus wallichiana</i>)	123
138	Pin laricio (<i>Pinus nigra sp. laricio</i>)	123
139	Pin noir d'Autriche (<i>Pinus nigra</i>)	124
140	Pin parasol, pin pignon (<i>Pinus pinea</i>)	124
141	Platane taillé (<i>Platanus x acerifolia-c</i>)	124
142	Platane taillé (grand) (<i>Platanus x acerifolia-d</i>)	125
143	Platane-a (<i>Platanus x acerifolia-a</i>)	125
144	Polygonum rouge (<i>Polygonum affine 'Darjeeling red'</i>)	125
145	Prunier (ou pêcher) décoratif (<i>Prunus x persica</i>)	126
146	Prunier décoratif-w (<i>Prunus x padus</i>)	126
147	Rince bouteille pleureur (<i>Callistemon viminalis</i>)	126
148	Riz (<i>Oryza sativa</i>)	127
149	Romarin commun (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	127
150	Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	127
151	Rosier grim pant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	128
152	Sarcococca (<i>Sarcococca humilis</i>)	128
153	Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii 'Gaiety'</i>)	128
154	Séquoia côtier (<i>Sequoia sempervirens</i>)	129
155	Skimmia (<i>Skimmia japonica var.</i>)	129
156	Souchet géant (<i>Cyperus immensus</i>)	129
157	Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	130
158	Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana alata 'Domino'</i>)	130
159	Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana alata 'Sensation'</i>)	130
160	Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	131
161	Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	131
162	Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa 'x Darwin'</i>)	131
163	Valériane glauque (<i>Centranthus ruber 'Coccineus'</i>)	132
164	Vigne vraie (<i>Vitis vinifera</i>)	132

Base Amérique du nord..... 133

1	Abricotier japonais (<i>Prunus mume</i>)	133
2	Acacia blanc (<i>Robinia pseudoacacia-r</i>)	133
3	Acacia parasol (<i>Robinia pseudoacacia-t</i>)	133
4	Alchémille (<i>Alchemilla mollis</i>)	134
5	Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	134
6	Amélan chier-a (<i>Amelanchier sp.</i>)	134
7	Amélan chier-l (<i>Amelanchier laevis</i>)	135
8	Ananas (<i>Anans commosus var. 'Cayenne'</i>)	135
9	Anthurium (<i>Anthurium andrea num</i>)	135
10	Arbousier d'Amérique (<i>Arbutus menziesii</i>)	136
11	Ardisia de Chine (<i>Ardisia crenata</i>)	136
12	Ardisia du Japon (<i>Ardisia japonica</i>)	136
13	Aubépine ergot de coq (<i>Crataegus crus-galli</i>)	137

14	Bambou nain (<i>Arundinaria sp.</i>)	137
15	Bambou pubescent (<i>Phyllostachis edulis 'Heterocycla' (syn 'Pubescens')</i>)	137
16	Bananier commun (<i>Musa domestica</i>)	138
17	Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	138
18	Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	138
19	Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	139
20	Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	139
21	Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	139
22	Bois à levier ou bois de fer (<i>Ostrya virginiana</i>)	140
23	Bois blanc (forêt) (<i>Tilia americana-d</i>)	140
24	Bois blanc (isolé) ou tilleul d'Amérique (<i>Tilia americana-c</i>)	140
25	Bouleau à papier (isolé) (<i>Betula papyrifera</i>)	141
26	Bouleau jaune (isolé) (<i>Betula alleghaniensis</i>)	141
27	Bruyère (<i>Erica carnea</i>)	141
28	Bruyère 'Spring Cream' (<i>Calluna vulgaris 'Spring Cream'</i>)	142
29	Buddleia à feuilles étroites (<i>Buddleja alternifolia</i>)	142
30	Buis 'Green Mountain' (<i>Buxus x sheridan 'Green Mountain'</i>)	142
31	Buisson taillé en 'coussin' (<i>Dumus indeterminatus</i>)	143
32	Callune fausse bruyère, brande (<i>Calluna vulgaris</i>)	143
33	Caryer cordiforme (<i>Carya cordiformis</i>)	143
34	Cassie blanc (<i>Leucaena leucocephala</i>)	144
35	Catalpa commun (<i>Catalpa bignioïdes</i>)	144
36	Céanothe 'Gloire de Versailles' (<i>Ceanothus 'Gloire de Versailles'</i>)	144
37	Cèdre de l'est, arbovitae ou thuya américain (<i>Thuja occidentalis</i>)	145
38	Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais (<i>Prunus serrulata (lannesiana)</i>)	145
39	Chêne des marais (<i>Quercus palustris</i>)	145
40	Chêne Rouvre (<i>Quercus petrae</i>)	146
41	Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	146
42	Clématite (<i>Clematis jackmanii 'Superba'</i>)	146
43	Cléome 'Color Fountain' (<i>Cleome hassleriana 'Colour Fountain'</i>)	147
44	Coleus (<i>Coleus blumei 'sanguineum'</i>)	147
45	Coléus à feuilles larges (<i>Coleus blumei 'Brightness'</i>)	147
46	Copalme d'Amérique (<i>Liquidambar styraciflua</i>)	148
47	Coréopsis à verticilles (<i>Coreopsis verticillata</i>)	148
48	Cormier ou maskouabina (<i>Sorbus americana</i>)	148
49	Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos 'Sensation'</i>)	149
50	Cyprès de Lawson-a (<i>Chamaecyparis lawsonii-a</i>)	149
51	Cyprès de Lawson-b (<i>Chamaecyparis lawsonii-b</i>)	149
52	Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	150
53	Epinette blanche (<i>Picea glauca</i>)	150
54	Erable à sucre (forêt) (<i>Acer saccharum-c</i>)	150
55	Erable à sucre (isolé) (<i>Acer saccharum-a</i>)	151
56	Erable argenté (forêt) (<i>Acer saccharinum-d</i>)	151
57	Erable argenté (isolé) (<i>Acer saccharinum-b</i>)	151
58	Erable champêtre (forme arbre) (<i>Acer campestre</i>)	152
59	Erable champêtre forme taillis (<i>Acer campestre forme taillis</i>)	152
60	Erable glabre (<i>Acer glabrum</i>)	152
61	Erable negundo ou à feuilles de frêne (<i>Acer negundo</i>)	153
62	Erable rouge (<i>Acer rubrum</i>)	153
63	Févier d'Amérique (<i>Gleditsia triacanthos inermis 'Skyline'</i>)	153
64	Févier d'Amérique ou carouge à miel (<i>Gleditsia triacanthos inermis 'Sunburst'</i>)	154
65	Ficus benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	154
66	Fleurs à massifs (<i>Flos indeterminatus</i>)	154
67	Fothergille (<i>Fothergilla major</i>)	155
68	Frêne blanc (<i>Fraxinus americana</i>)	155
69	Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	155
70	Gingembre parfumé (<i>Hedychium gardnerianum</i>)	156
71	Gueule de loup (<i>Antirrhinum majus 'Wedding Bells'</i>)	156
72	Hélianthème faux alysse (<i>Helianthemum nummularium</i>)	156
73	Herbe-a (<i>Herba indeterminata-a</i>)	157
74	Herbe-b (<i>Herba indeterminata-b</i>)	157

75	Herbe-c (<i>Herba indeterminata-c</i>)	157
76	Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	158
77	Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	158
78	Hortensia grimpant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	158
79	Immortelle de Virginie (<i>Anaphalis margaritacea</i>)	159
80	Iris hollandais (<i>Iris lusitanica x tingitana</i>)	159
81	Jasmin d'hiver (<i>Jasminum nudiflorum</i>)	159
82	Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	160
83	Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	160
84	Laurier des montagnes (<i>Kalmia latifolia</i>)	160
85	Liane à lait (<i>Allamanda cathartica</i>)	161
86	Liard ou cotonnier (<i>Populus deltoides</i>)	161
87	Lierre rampant-a (<i>Hedera helix 'Glacier'</i>)	161
88	Lys blanc (<i>Lilium candidum</i>)	162
89	Lys carnaval (<i>Lilium bulbiferum</i>)	162
90	Magnolia yulan (<i>Magnolia heptapeta (syn. denudata)</i>)	162
91	Mahonia-m (<i>Mahonia aquifolium</i>)	163
92	Maïs cultivé (<i>Zea mays</i>)	163
93	Mélèze laricin ou d'Amérique (<i>Larix laricina</i>)	163
94	Merisier (<i>Prunus avium</i>)	164
95	Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	164
96	Narthecium (<i>Narthecium sp.</i>)	164
97	Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	165
98	Noyer commun (<i>Juglans regia</i>)	165
99	Noyer noir (<i>Juglans nigra</i>)	165
100	Noyer tendre (<i>Juglans cinerea</i>)	166
101	Palette de peintre (<i>Caladium bicolor</i>)	166
102	Palétuvier rouge (<i>Rhizophora mangle</i>)	166
103	Palmier "bouteille" (<i>Hyophorbe lagenicaulis</i>)	167
104	Palmier Arenga (<i>Arenga pinnata</i>)	167
105	Palmier d'intérieur-b (<i>Phoenix humilis</i>)	167
106	Palmier de Guadeloupe (<i>Brahea edulis</i>)	168
107	Palmier de Washington (<i>Washingtonia filifera</i>)	168
108	Palmier du Mexique (<i>Washingtonia robusta</i>)	168
109	Palmier royal de Cuba (<i>Roystonea regia</i>)	169
110	Pâturin (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	169
111	Pavot d'Islande (<i>Papaver nudicaule</i>)	169
112	Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	170
113	Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	170
114	Pervenche (<i>Vinca major</i>)	170
115	Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	171
116	Peuplier hybride du Canada (<i>Populus deltoides x nigra</i>)	171
117	Pin argenté (<i>Pinus monticola</i>)	171
118	Pin blanc ou pin du Lord (<i>Pinus strobus</i>)	172
119	Pin gris (<i>Pinus banksiana</i>)	172
120	Pin jaune des Montagnes Rocheuses (<i>Pinus ponderosa</i>)	172
121	Pin rouge (<i>Pinus resinosa</i>)	173
122	Polygonum rouge (<i>Polygonum affine 'Darjeeling red'</i>)	173
123	Pometier à petits fruits (<i>Malus baccata 'Columnaris'</i>)	173
124	Pometier Makamik (<i>Malus x 'Makamik'</i>)	174
125	Pruche du Canada (<i>Tsuga canadensis</i>)	174
126	Prunier (ou pêcher) décoratif (<i>Prunus x persica</i>)	174
127	Riz (<i>Oryza sativa</i>)	175
128	Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	175
129	Rosier grimpant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	175
130	Sabal (<i>Sabal palmetto</i>)	176
131	Sapin baumier (<i>Abies balsamea</i>)	176
132	Sapin bleu (<i>Picea pungens 'Glauca'</i>)	176
133	Sapin de Douglas (<i>Pseudotsuga douglasii</i>)	177
134	Sapin de Vancouver (<i>Abies grandis</i>)	177
135	Sapin du Colorado (<i>Abies concolor</i>)	177

136	Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii</i> 'Gaiety')	178
137	Séquoia côtier (<i>Sequoia sempervirens</i>)	178
138	Skimmia (<i>Skimmia japonica</i> var.)	178
139	Sorbier des oiseaux, sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i>)	179
140	Sorbier torminal, alisier (<i>Sorbus torminalis</i>)	179
141	Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	179
142	Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana glauca</i> 'Domino')	180
143	Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana glauca</i> 'Sensation')	180
144	Tabebuia, Tecoma rose (<i>Tabebuia rosea</i>)	180
145	Thuya géant (<i>Thuja plicata</i>)	181
146	Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	181
147	Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	181
148	Trèfle blanc (<i>Trifolium pratense</i>)	182
149	Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa</i> 'x Darwin')	182
150	Tulipier (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	182
151	Valériane glauque (<i>Centranthus ruber</i> 'Coccineus')	183
152	Vigne vraie (<i>Vitis vinifera</i>)	183

Base Tropique 184

1	Acacia parasol de savane (<i>Acacia tortilis</i>)	184
2	Acacia siffleur (<i>Acacia drepanolobium</i>)	184
3	Albizia (<i>Albizia julibrissin</i>)	184
4	Albizia (Mimosa) de montagne (<i>Albizia falcata</i>)	185
5	Albizia gommier (<i>Albizia gummifera</i>)	185
6	Alchémille (<i>Alchemilla mollis</i>)	185
7	Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	186
8	Ananas (<i>Ananas comosus</i> var. 'Cayenne')	186
9	Anthurium (<i>Anthurium andreanum</i>)	186
10	Arbousier d'Amérique (<i>Arbutus menziesii</i>)	187
11	Arbre à cochonnets - ATI, TAMANU (<i>Calophyllum inophyllum</i>)	187
12	Arbre à pluie, arbre de 5 heures - MARU MARU (<i>Samanea saman</i>)	187
13	Arbre à saucisses (<i>Kigelia africana</i>)	188
14	Arbre du voyageur (Palmier) (<i>Ravenala madagascarensis</i>)	188
15	Ardisia de Chine (<i>Ardisia crenata</i>)	188
16	Ardisia du Japon (<i>Ardisia japonica</i>)	189
17	Aréquier (<i>Areca catechu</i>)	189
18	Bambou nain (<i>Arundinaria</i> sp.)	189
19	Bambou pubescent (<i>Phyllostachis edulis</i> 'Heterocyclus' (syn 'Pubescens'))	190
20	Bambou Sasa panaché (<i>Sasa veitchii</i> 'Albomarginata')	190
21	Bananier commun (<i>Musa domestica</i>)	190
22	Bancoulier (<i>Aleurites moluccana</i>)	191
23	Bancoulier de plaine (<i>Aleurites moluccana</i> - tree type)	191
24	Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	191
25	Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	192
26	Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia</i> 'Elithe')	192
27	Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	192
28	Blé (<i>Triticum</i> sp.-b)	193
29	Bois à piquet (<i>Cassipourea malosana</i>)	193
30	Bois de fer (<i>Casuarina collina</i>)	193
31	Bois-joli - TOU (<i>Cordia subcordata</i>)	194
32	Brachychiton à feuille étroite (<i>Brachychiton acerifolius</i>)	194
33	Bruyère (<i>Erica carnea</i>)	194
34	Buis 'Green Mountain' (<i>Buxus x sheridan</i> 'Green Mountain')	195
35	Buisson taillé en 'coussin' (<i>Dumus indeterminatus</i>)	195
36	Cacaoyer (<i>Theobroma cacao</i>)	195
37	Caféier (<i>Coffea robusta</i>)	196
38	Callistemon de montagne- POHUTU (<i>Metrosideros collina</i>)	196
39	Cassie blanc (<i>Leucaena leucocephala</i>)	196
40	Catalpa commun (<i>Catalpa bignonioides</i>)	197
41	Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	197

42	Citronnelle (<i>Cymbopogon citratus</i>)	197
43	Clématite (<i>Clematis jackmanii</i> 'Superba')	198
44	Clérodendron du Japon (<i>Clerodendrum trichotomum</i>)	198
45	Cocotier (<i>Coco nucifera</i>)	198
46	Coleus (<i>Coleus blumei</i> 'sanguineum')	199
47	Coléus à feuilles larges (<i>Coleus blumei</i> 'Brightness')	199
48	Coréopsis à verticilles (<i>Coreopsis verticillata</i>)	199
49	Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos</i> 'Sensation')	200
50	Dattier des Canaries (<i>Phoenix canarensis</i>)	200
51	Draceana (<i>Draceana</i> sp.)	200
52	Euphorbe bussei (<i>Euphorbia bussei</i>)	201
53	Euphorbe candelabre (arbre) (<i>Euphorbia candelabrum</i>)	201
54	Faux manguier à parfum, Arbre à reserpine, Arbre à quinine (<i>Rauvolfia caffra</i>)	201
55	Ficus à écorce jaune, ficus à feuilles de mûrier (<i>Ficus lutea</i>)	202
56	Ficus benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	202
57	Ficus benjamina (forme tropicale haie libre) (<i>Ficus benjamina</i> (trop.))	202
58	Ficus sycomore (<i>Ficus sycomorus</i>)	203
59	Figuier étrangleur, figuier à petits fruits (<i>Ficus thonningii</i>)	203
60	Filao (<i>Casuarina equisetifolia</i>)	203
61	Fleurs à massifs (<i>Flos indeterminatus</i>)	204
62	Folle avoine rouge (<i>Themeda triandra</i>)	204
63	Fougère arborescente de plaine - NAHE (<i>Angiopteris evecta</i>)	204
64	Fromager (<i>Bombax ceiba</i>)	205
65	Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	205
66	Gingembre jaune (<i>Hedychium flavescens</i>)	205
67	Gingembre parfumé (<i>Hedychium gardnerianum</i>)	206
68	Gueule de loup (<i>Antirrhinum majus</i> 'Wedding Bells')	206
69	Hélianthème faux alysse (<i>Helianthemum nummularium</i>)	206
70	Herbe-a (<i>Herba indeterminata-a</i>)	207
71	Herbe-b (<i>Herba indeterminata-b</i>)	207
72	Herbe-c (<i>Herba indeterminata-c</i>)	207
73	Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	208
74	Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	208
75	Hortensia grim pant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	208
76	Immortelle de Virginie (<i>Anaphalis margaritacea</i>)	209
77	Iris hollandais (<i>Iris lusitanica</i> x <i>tingitana</i>)	209
78	Ixora, Arbuste corail (<i>Ixora coccinea</i>)	209
79	Jasmin d'hiver (<i>Jasminum nudiflorum</i>)	210
80	Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	210
81	Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	210
82	Latanier rouge (<i>Latania lontaroides</i>)	211
83	Liane à lait (<i>Allamanda cathartica</i>)	211
84	Lierre rampant-a (<i>Hedera helix</i> 'Glacier')	211
85	Lilas des Indes (<i>Melia azedarach</i>)	212
86	Lys blanc (<i>Lilium candidum</i>)	212
87	Lys carnaval (<i>Lilium bulbiferum</i>)	212
88	Maïs cultivé (<i>Zea mays</i>)	213
89	Manguier - VI POPAA (<i>Mangifera indica</i>)	213
90	Morinda - NONO (<i>Morinda citrifolia</i>)	213
91	Mûrier à papier (<i>Broussonetia papyrifera</i>)	214
92	Myoporum (<i>Myoporum laetum</i>)	214
93	Narthecium (<i>Narthecium</i> sp.)	214
94	Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	215
95	Nerprun (forme buisson) (<i>Rhamnus alaternus-a</i>)	215
96	Palette de peintre (<i>Caladium bicolor</i>)	215
97	Palétuvier rouge (<i>Rhizophora mangle</i>)	216
98	Palmier "bouteille" (<i>Hyophorbe lagenicaulis</i>)	216
99	Palmier (Phœnix) (<i>Phoenix</i> sp.)	216
100	Palmier à sucre (<i>Caryota urens</i>)	217
101	Palmier à tronc rouge (<i>Cyrtostachys renda</i>)	217
102	Palmier Arenga (<i>Arenga pinnata</i>)	217

103	Palmier chamaerops (<i>Chamaerops sp.</i>)	218
104	Palmier d'Arec (<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>)	218
105	Palmier d'intérieur-b (<i>Phoenix humilis</i>)	218
106	Palmier dattier sauvage (<i>Phoenix reclinata</i>)	219
107	Palmier de Guadeloupe (<i>Brahea edulis</i>)	219
108	Palmier de Roebelen, Palmier dattier nain (<i>Phoenix roebelinii</i>)	219
109	Palmier de Washington (<i>Washingtonia filifera</i>)	220
110	Palmier du Mexique (<i>Washingtonia robusta</i>)	220
111	Palmier femelle nain (<i>Rhapis humilis</i>)	220
112	Palmier Royal (cocos) (<i>Arecastrum romanzoffianum</i>)	221
113	Palmier royal de Cuba (<i>Roystonea regia</i>)	221
114	Pandanus, baquois - FARA, HINANO (<i>Pandanus odoratissimus</i>)	221
115	Papyrus souchet (<i>Cyperus involucratus</i>)	222
116	Pâturin (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	222
117	Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	222
118	Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	223
119	Pervenche (<i>Vinca major</i>)	223
120	Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	223
121	Plante à pétrole (<i>Euphorbia tirucalli</i>)	224
122	Polygonum rouge (<i>Polygonum affine 'Darjeeling red'</i>)	224
123	Queue de lapin (<i>Pennisetum mezianum</i>)	224
124	Riz (<i>Oryza sativa</i>)	225
125	Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	225
126	Rosier grim pant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	225
127	Sabal (<i>Sabal palmetto</i>)	226
128	Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii 'Gaiety'</i>)	226
129	Senecio (Africain) Fleurs Jaunes (<i>Crassocephalum mannii</i>)	226
130	Sisal sauvage, Sisal masaï, Sisal oldupai (<i>Sanseveria ehrenbergiana (syn. S. ehrenbergii)</i>)	227
131	Skimmia (<i>Skimmia japonica var.</i>)	227
132	Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	227
133	Sporobolus ioclados (<i>Sporobolus ioclados</i>)	228
134	Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana alata 'Domino'</i>)	228
135	Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana alata 'Sensation'</i>)	228
136	Tabebuia, Tecoma rose (<i>Tabebuia rosea</i>)	229
137	Taro géant - APE (<i>Alocasia macrorrhiza</i>)	229
138	Taro, Grande toyave - APE (<i>Alocasia esculanta</i>)	229
139	Teck (<i>Tectona grandis</i>)	230
140	Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	230
141	Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	230
142	Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa 'x Darwin'</i>)	231
143	Valériane glauque (<i>Centranthus ruber 'Coccineus'</i>)	231
144	Ylang Tlang - MOTOI (<i>Canaga odorata</i>)	231

Base Asie tempérée 232

1	Abricotier japonais (<i>Prunus mume</i>)	232
2	Albizia (<i>Albizia julibrissin</i>)	232
3	Albizia (Mimosa) de montagne (<i>Albizzia falcata</i>)	232
4	Alchémille (<i>Alchemilla mollis</i>)	233
5	Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	233
6	Anthurium (<i>Anthurium andreaum</i>)	233
7	Arbre à cochonnets - ATI, TAMANU (<i>Calophyllum inophyllum</i>)	234
8	Arbre à papillons (<i>Buddleja davidii</i>)	234
9	Arbre aux quarante écus taillé (<i>Ginkgo biloba</i>)	234
10	Arbre aux quarante écus-a (<i>Ginkgo biloba-a</i>)	235
11	Arbre aux quarante écus-b (<i>Ginkgo biloba-b</i>)	235
12	Ardisia de Chine (<i>Ardisia crenata</i>)	235
13	Ardisia du Japon (<i>Ardisia japonica</i>)	236
14	Aréquier (<i>Areca catechu</i>)	236
15	Arundinaria chino (<i>Pleioblastus chino</i>)	236
16	Bambou (<i>Phyllostachis viridiglaucescens</i>)	237

17	Bambou nain (<i>Arundinaria sp.</i>)	237
18	Bambou pubescent (<i>Phyllostachis edulis 'Heterocycla' (syn 'Pubescens')</i>)	237
19	Bambou Sasa panaché (<i>Sasa veitchii 'Albomarginata'</i>)	238
20	Bananier commun (<i>Musa domestica</i>)	238
21	Bancoulier (<i>Aleurites moluccana</i>)	238
22	Bancoulier de plaine (<i>Aleurites moluccana - tree type</i>)	239
23	Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	239
24	Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	239
25	Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	240
26	Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	240
27	Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	240
28	Bois porte-bonheur (<i>Corylopsis spicata</i>)	241
29	Bois-joli - TOU (<i>Cordia subcordata</i>)	241
30	Boule de neige (<i>Viburnum plicatum 'Mariesii'</i>)	241
31	Bouleau de l'Himalaya (<i>Betula utilis</i>)	242
32	Bruyère (<i>Erica carnea</i>)	242
33	Bruyère 'Spring Cream' (<i>Calluna vulgaris 'Spring Cream'</i>)	242
34	Buis 'Green Mountain' (<i>Buxus x sheridan 'Green Mountain'</i>)	243
35	Buisson taillé en 'coussin' (<i>Dumus indeterminatus</i>)	243
36	Callune fausse bruyère, brande (<i>Calluna vulgaris</i>)	243
37	Camélia du Japon (<i>Camellia japonica</i>)	244
38	Camphrier (<i>Cinnamum camphora</i>)	244
39	Canne de Provence (<i>Arundo donax</i>)	244
40	Cerisier à fleurs japonais-e (<i>Prunus x yedoensis</i>)	245
41	Cerisier à fleurs japonais-h (<i>Prunus jamasakura</i>)	245
42	Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais (<i>Prunus serrulata (lannesiana)</i>)	245
43	Châtaignier-a (<i>Castanea sativa-a</i>)	246
44	Châtaignier-b (<i>Castanea sativa-b</i>)	246
45	Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	246
46	Citronnelle (<i>Cymbopogon citratus</i>)	247
47	Clématite (<i>Clematis jackmanii 'Superba'</i>)	247
48	Clérodendron du Japon (<i>Clerodendrum trichotomum</i>)	247
49	Cognassier du Japon (<i>Chaenomeles japonica</i>)	248
50	Cognassier du Japon 'Moerloosii' (<i>Chaenomeles speciosa 'Moerloosii'</i>)	248
51	Coleus (<i>Coleus blumei 'sanguineum'</i>)	248
52	Coléus à feuilles larges (<i>Coleus blumei 'Brightness'</i>)	249
53	Coréopsis à verticilles (<i>Coreopsis verticillata</i>)	249
54	Corète du Japon (<i>Kerria japonica</i>)	249
55	Cornouiller discuté (<i>Cornus controversa</i>)	250
56	Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	250
57	Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos 'Sensation'</i>)	250
58	Cryptomère Sugi (<i>Cryptomeria japonica</i>)	251
59	Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	251
60	Erable du Japon (<i>Acer palmatum</i>)	251
61	Ficus benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	252
62	Ficus benjamina (forme tropicale haie libre) (<i>Ficus benjamina (trop.)</i>)	252
63	Fleurs à massifs (<i>Flos indeterminatus</i>)	252
64	Fromager (<i>Bombax ceiba</i>)	253
65	Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	253
66	Gingembre parfumé (<i>Hedychium gardnerianum</i>)	253
67	Gueule de loup (<i>Antirrhinum majus 'Wedding Bells'</i>)	254
68	Hamamélis (<i>Hamamelis mollis</i>)	254
69	Hélianthème faux alysse (<i>Helianthemum nummularium</i>)	254
70	Herbe-a (<i>Herba indeterminata-a</i>)	255
71	Herbe-b (<i>Herba indeterminata-b</i>)	255
72	Herbe-c (<i>Herba indeterminata-c</i>)	255
73	Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	256
74	Hibiscus rose de Chine (<i>Hibiscus rosasinensis</i>)	256
75	Hinoki (<i>Chamaecyparis obtusa</i>)	256
76	Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	257
77	Hortensia grim pant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	257

78	Houx du Japon (<i>Ilex rotundifolia</i>)	257
79	Immortelle de Virginie (<i>Anaphalis margaritacea</i>)	258
80	Iris hollandais (<i>Iris lusitanica x tingitana</i>)	258
81	Ixora, Arbuste corail (<i>Ixora coccinea</i>)	258
82	Jasmin d'hiver (<i>Jasminum nudiflorum</i>)	259
83	Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	259
84	Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	259
85	Laurier cerise (<i>Prunus laurocerasus</i>)	260
86	Lierre rampant-a (<i>Hedera helix 'Glacier'</i>)	260
87	Lilas des Indes (<i>Melia azedarach</i>)	260
88	Lys blanc (<i>Lilium candidum</i>)	261
89	Lys carnaval (<i>Lilium bulbiferum</i>)	261
90	Magnolia yulan (<i>Magnolia heptapeta (syn. denudata)</i>)	261
91	Maïs cultivé (<i>Zea mays</i>)	262
92	Manguier - VI POPAA (<i>Mangifera indica</i>)	262
93	Marronnier du Japon (<i>Aesculus turbinata</i>)	262
94	Marronnier-a (<i>Aesculus x hippocastaneum-a</i>)	263
95	Marronnier-b (<i>Aesculus x hippocastaneum-b</i>)	263
96	Marronnier-c (<i>Aesculus x hippocastaneum-c</i>)	263
97	Marronnier-d (<i>Aesculus x hippocastaneum-d</i>)	264
98	Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	264
99	Mûrier à papier (<i>Broussonetia papyrifera</i>)	264
100	Narthecium (<i>Narthecium sp.</i>)	265
101	Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	265
102	Noisetier de Turquie (<i>Corylus colurna</i>)	265
103	Olivier de Bohême, chalef (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)	266
104	Orme du Japon-a (<i>Zelkova serrata-a</i>)	266
105	Orme du Japon-b (<i>Zelkova serrata-b</i>)	266
106	Pachysandra du Japon (<i>Pachysandra terminalis</i>)	267
107	Palette de peintre (<i>Caladium bicolor</i>)	267
108	Palmier à sucre (<i>Caryota urens</i>)	267
109	Palmier à tronc rouge (<i>Cyrtostachys renda</i>)	268
110	Palmier Arenga (<i>Arenga pinnata</i>)	268
111	Palmier d'intérieur-b (<i>Phoenix humilis</i>)	268
112	Palmier de Chine (<i>Trachycarpus fortunei</i>)	269
113	Palmier de Roebelen, Palmier dattier nain (<i>Phoenix roebelinii</i>)	269
114	Palmier femelle nain (<i>Rhapis humilis</i>)	269
115	Pandanus, baquois - FARA, HINANO (<i>Pandanus odoratissimus</i>)	270
116	Parasol chinois (<i>Firmiana simplex</i>)	270
117	Pâturin (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	270
118	Paulownia (<i>Paulownia tomentosa</i>)	271
119	Pavot d'Islande (<i>Papaver nudicaule</i>)	271
120	Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	271
121	Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	272
122	Persea thunbergii (<i>Machilus thunbergii</i>)	272
123	Pervenche (<i>Vinca major</i>)	272
124	Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	273
125	Peuplier de Chine, peuplier du Yunnan (<i>Populus yunnanensis</i>)	273
126	Pin de l'Himalaya (<i>Pinus wallichiana</i>)	273
127	Pin de montagne, pin de Mongolie (<i>Pinus mugo (montana) 'Mungho'</i>)	274
128	Pin noir du Japon taillé (<i>Pinus thunbergii</i>)	274
129	Pin rouge du Japon taillé (<i>Pinus densiflora</i>)	274
130	Polygonum rouge (<i>Polygonum affine 'Darjeeling red'</i>)	275
131	Pommétier à petits fruits (<i>Malus baccata 'Columnaris'</i>)	275
132	Prunier (ou pêcher) décoratif (<i>Prunus x persica</i>)	275
133	Prunier décoratif-w (<i>Prunus x padus</i>)	276
134	Riz (<i>Oryza sativa</i>)	276
135	Ronce décorative (<i>Rubus calcynoides</i>)	276
136	Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	277
137	Rosier grimpant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	277
138	Sapin du Japon (<i>Abies firma</i>)	277

139	Sarcococca (<i>Sarcococca humilis</i>)	278
140	Saule taillé (<i>Salix alba-b</i>)	278
141	Sawara (<i>Chamaecyparis pisifera</i>)	278
142	Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii 'Gaiety'</i>)	279
143	Skimmia (<i>Skimmia japonica var.</i>)	279
144	Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	279
145	Styrax du Japon (<i>Styrax japonica</i>)	280
146	Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana alata 'Domino'</i>)	280
147	Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana alata 'Sensation'</i>)	280
148	Taro géant - APE (<i>Alocasia macrorrhiza</i>)	281
149	Taro, Grande toyave - APE (<i>Alocasia esculanta</i>)	281
150	Teck (<i>Tectona grandis</i>)	281
151	Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	282
152	Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	282
153	Troène de Chine (<i>Ligustrum delavayanum</i>)	282
154	Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa 'x Darwin'</i>)	283
155	Tulipier (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	283
156	Valériane glauque (<i>Centranthus ruber 'Coccineus'</i>)	283
157	Vigne vraie (<i>Vitis vinifera</i>)	284
158	Viorne à feuilles de néflier (<i>Viburnum rhytidophyllum</i>)	284
159	Ylang Tlang - MOTOI (<i>Canaga odorata</i>)	284

Nurserie complète 285

1	Abricotier japonais (<i>Prunus mume</i>)	285
2	Acacia à écorce jaune (<i>Acacia xanthophloea</i>)	285
3	Acacia à épines rouges (<i>Acacia lahai</i>)	285
4	Acacia blanc (<i>Robinia pseudoacacia-r</i>)	286
5	Acacia parasol (<i>Robinia pseudoacacia-t</i>)	286
6	Acacia parasol de savane (<i>Acacia tortilis</i>)	286
7	Acacia siffleur (<i>Acacia drepanolobium</i>)	287
8	Agérate bleue (<i>Ageratum houstonianum</i>)	287
9	Albizia (<i>Albizia julibrissin</i>)	287
10	Albizia (Mimosa) de montagne (<i>Albizzia falcata</i>)	288
11	Albizia gommier (<i>Albizia gummifera</i>)	288
12	Alchémille (<i>Alchemilla mollis</i>)	288
13	Aloès de Volken (<i>Aloe volkensii</i>)	289
14	Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	289
15	Amélanchier-a (<i>Amelanchier sp.</i>)	289
16	Amélanchier-l (<i>Amelanchier laevis</i>)	290
17	Ananas (<i>Anans commosus var. 'Cayenne'</i>)	290
18	Anthurium (<i>Anthurium andreanum</i>)	290
19	Arbousier (forme buisson) (<i>Arbutus unedo-a</i>)	291
20	Arbousier d'Amérique (<i>Arbutus menziesii</i>)	291
21	Arbre à cochonnets - ATI, TAMANU (<i>Calophyllum inophyllum</i>)	291
22	Arbre à laque, butée (<i>Butia capitata</i>)	292
23	Arbre à papillons (<i>Buddleja davidii</i>)	292
24	Arbre à pluie, arbre de 5 heures - MARU MARU (<i>Samanea saman</i>)	292
25	Arbre à saucisses (<i>Kigelia africana</i>)	293
26	Arbre aux quarante écus taillé (<i>Ginkgo biloba</i>)	293
27	Arbre aux quarante écus-a (<i>Ginkgo biloba-a</i>)	293
28	Arbre aux quarante écus-b (<i>Ginkgo biloba-b</i>)	294
29	Arbre brosse à dents, moutardier (<i>Salvadora persica</i>)	294
30	Arbre de Judée (<i>Cercis silicestrum</i>)	294
31	Arbre du voyageur (Palmier) (<i>Ravenala madagascarensis</i>)	295
32	Ardisia de Chine (<i>Ardisia crenata</i>)	295
33	Ardisia du Japon (<i>Ardisia japonica</i>)	295
34	Aréquier (<i>Areca catechu</i>)	296
35	Arundinaria chino (<i>Pleioblastus chino</i>)	296
36	Aubépine ergot de coq (<i>Crataegus crus-galli</i>)	296
37	Aulne glutineux, verne, vergne (<i>Alnus glutinosa</i>)	297

38	Avoine bleue (<i>Helictotrichon sempervirens</i>)	297
39	Avoine cultivée (<i>Avena pratense</i>)	297
40	Bambou (<i>Phyllostachis viridiglaucescens</i>)	298
41	Bambou nain (<i>Arundinaria sp.</i>)	298
42	Bambou pubescent (<i>Phyllostachis edulis 'Heterocycla' (syn 'Pubescens')</i>)	298
43	Bambou Sasa panaché (<i>Sasa veitchii 'Albomarginata'</i>)	299
44	Bananier commun (<i>Musa domestica</i>)	299
45	Bancoulier (<i>Aleurites moluccana</i>)	299
46	Bancoulier de plaine (<i>Aleurites moluccana - tree type</i>)	300
47	Baobab, pain de singe (<i>Adansonia digitata</i>)	300
48	Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	300
49	Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	301
50	Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	301
51	Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	301
52	Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	302
53	Blé barbu (<i>Triticum sp.-a</i>)	302
54	Bois à levier ou bois de fer (<i>Ostrya virginiana</i>)	302
55	Bois à piquet (<i>Cassipourea malosana</i>)	302
56	Bois blanc (forêt) (<i>Tilia americana-d</i>)	303
57	Bois blanc (isolé) ou tilleul d'Amérique (<i>Tilia americana-c</i>)	303
58	Bois de fer (<i>Casuarina collina</i>)	303
59	Bois porte-bonheur (<i>Corylopsis spicata</i>)	304
60	Bois-joli - TOU (<i>Cordia subcordata</i>)	304
61	Bois-joli ou bois-gentil (<i>Daphne mezereum</i>)	304
62	Boule de neige (<i>Viburnum plicatum 'Mariesii'</i>)	305
63	Bouleau à papier (isolé) (<i>Betula papyrifera</i>)	305
64	Bouleau commun, blanc ou verruqueux (<i>Betula pendula (verrucosa)</i>)	305
65	Bouleau de l'Himalaya (<i>Betula utilis</i>)	306
66	Bouleau jaune (isolé) (<i>Betula alleghaniensis</i>)	306
67	Brachychiton à feuille étroite (<i>Brachychiton acerifolius</i>)	306
68	Bruyère (<i>Erica carnea</i>)	307
69	Bruyère 'Spring Cream' (<i>Calluna vulgaris 'Spring Cream'</i>)	307
70	Buddleia à feuilles étroites (<i>Buddleja alternifolia</i>)	307
71	Buddleia à fleurs jaunes, Arbre aux papillons (<i>Buddleja polystachya</i>)	308
72	Buddleia à pompons (<i>Buddleja globosa</i>)	308
73	Buis 'Green Mountain' (<i>Buxus x sheridan 'Green Mountain'</i>)	308
74	Buisson taillé en 'coussin' (<i>Dumus indeterminatus</i>)	309
75	Cacaoyer (<i>Theobroma cacao</i>)	309
76	Caféier (<i>Coffea robusta</i>)	309
77	Callistemon de montagne- POHUTU (<i>Metrosideros collina</i>)	310
78	Callune fausse bruyère, brande (<i>Calluna vulgaris</i>)	310
79	Camélia du Japon (<i>Camellia japonica</i>)	310
80	Camphrier (<i>Cinnamum camphora</i>)	311
81	Canne de Provence (<i>Arundo donax</i>)	311
82	Caryer cordiforme (<i>Carya cordiformis</i>)	311
83	Cassie blanc (<i>Leucaena leucocephala</i>)	312
84	Catalpa commun (<i>Catalpa bignioïdes</i>)	312
85	Céanothe 'Gloire de Versailles' (<i>Ceanothus 'Gloire de Versailles'</i>)	312
86	Cèdre bleu (<i>Cedrus atlantica</i>)	313
87	Cèdre de l'est, arbovitae ou thuya américain (<i>Thuja occidentalis</i>)	313
88	Cèdre du Liban (<i>Cedrus libani</i>)	313
89	Cerisier à fleurs japonais-e (<i>Prunus x yedoensis</i>)	314
90	Cerisier à fleurs japonais-h (<i>Prunus jamasakura</i>)	314
91	Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais (<i>Prunus serrulata (lannesiana)</i>)	314
92	Charme (<i>Carpinus betula</i>)	315
93	Châtaignier-a (<i>Castanea sativa-a</i>)	315
94	Châtaignier-b (<i>Castanea sativa-b</i>)	315
95	Chêne des marais (<i>Quercus palustris</i>)	316
96	Chêne pédonculé (<i>Quercus Pedunculata (Robur)</i>)	316
97	Chêne Rouvre (<i>Quercus petrae</i>)	316
98	Chêne vert (<i>Quercus ilex</i>)	317

99	Chêne vert (forme cépée) (<i>Quercus ilex (bush shape)</i>)	317
100	Chêne vert (forme taillée) (<i>Quercus ilex (pruned shape)</i>)	317
101	Chèvrefeuille rampant (<i>Lonicera sp.</i>)	318
102	Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	318
103	Citronnelle (<i>Cymbopogon citratus</i>)	318
104	Clématite (<i>Clematis jackmanii 'Superba'</i>)	319
105	Cléome 'Color Fountain' (<i>Cleome hassleriana 'Colour Fountain'</i>)	319
106	Clérodendron du Japon (<i>Clerodendrum trichotomum</i>)	319
107	Cocotier (<i>Coco nucifera</i>)	320
108	Cognassier du Japon (<i>Chaenomeles japonica</i>)	320
109	Cognassier du Japon 'Moerloosii' (<i>Chaenomeles speciosa 'Moerloosii'</i>)	320
110	Coleus (<i>Coleus blumei 'sanguineum'</i>)	321
111	Coléus à feuilles larges (<i>Coleus blumei 'Brightness'</i>)	321
112	Commiphora (<i>Commiphora trothea</i>)	321
113	Copalme d'Amérique (<i>Liquidambar styraciflua</i>)	322
114	Cordia à feuilles ovales (<i>Cordia ovalis</i>)	322
115	Coréopsis à verticilles (<i>Coreopsis verticillata</i>)	322
116	Corète du Japon (<i>Kerria japonica</i>)	323
117	Cormier (<i>Sorbus domestica</i>)	323
118	Cormier ou maskouabina (<i>Sorbus americana</i>)	323
119	Cornouiller discuté (<i>Cornus controversa</i>)	324
120	Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	324
121	Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos 'Sensation'</i>)	324
122	Cotoneaster (<i>Cotoneaster franchetti</i>)	325
123	Crocus (<i>Crocus sp.</i>)	325
124	Crotalaria griffe de lion (<i>Crotalaria agatiflora</i>)	325
125	Croton à feuilles larges (<i>Croton macrostachyus</i>)	326
126	Cryptomère Sugi (<i>Cryptomeria japonica</i>)	326
127	Cyprès d'Italie (<i>Cupressus sempervirens</i>)	326
128	Cyprès de Lawson-a (<i>Chamaecyparis lawsonii-a</i>)	327
129	Cyprès de Lawson-b (<i>Chamaecyparis lawsonii-b</i>)	327
130	Cyprès de Provence pyramidal (<i>Cupressus sempervirens 'Horizontalis'</i>)	327
131	Cytise (<i>Laburnum x watereri 'Vossii'</i>)	328
132	Dattier des Canaries (<i>Phoenix canarensis</i>)	328
133	Dattier du désert (<i>Balanites aegyptiaca</i>)	328
134	Désespoir des singes (<i>Araucaria araucana</i>)	329
135	Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	329
136	Epicéa (<i>Picea abies</i>)	329
137	Epicéa 'pyramidalis' (<i>Picea abies var. pyramidalis</i>)	330
138	Epine du Christ ou arbre à chapeau (<i>Paliurus spinachristi</i>)	330
139	Épinette blanche (<i>Picea glauca</i>)	330
140	Erable à sucre (forêt) (<i>Acer saccharum-c</i>)	331
141	Erable à sucre (isolé) (<i>Acer saccharum-a</i>)	331
142	Erable argenté (forêt) (<i>Acer saccharinum-d</i>)	331
143	Erable argenté (isolé) (<i>Acer saccharinum-b</i>)	332
144	Erable champêtre (forme arbre) (<i>Acer campestre</i>)	332
145	Erable champêtre forme taillis (<i>Acer campestre forme taillis</i>)	332
146	Erable du Japon (<i>Acer palmatum</i>)	333
147	Erable glabre (<i>Acer glabrum</i>)	333
148	Erable negundo ou à feuilles de frêne (<i>Acer negundo</i>)	333
149	Erable plane (<i>Acer platanoides</i>)	334
150	Erable rouge (<i>Acer rubrum</i>)	334
151	Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	334
152	Eucalyptus (<i>Eucalyptus sp.</i>)	335
153	Eucalyptus commun (<i>Eucalyptus globulus</i>)	335
154	Euphorbe bussei (<i>Euphorbia bussei</i>)	335
155	Euphorbe candelabre (arbre) (<i>Euphorbia candelabrum</i>)	336
156	Faux manguier à parfum, Arbre à quinine (<i>Rauwolfia caffra</i>)	336
157	Févier d'Amérique (<i>Gleditsia triacanthos inermis 'Skyline'</i>)	336
158	Févier d'Amérique ou carouge à miel (<i>Gleditsia triacanthos inermis 'Sunburst'</i>)	337
159	Ficus à écorce jaune, ficus à feuilles de mûrier (<i>Ficus lutea</i>)	337




160	Ficus benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	337
161	Ficus benjamina (forme tropicale haie libre) (<i>Ficus benjamina (trop.)</i>)	338
162	Ficus sycomore (<i>Ficus sycomorus</i>)	338
163	Figuier étrangleur, figuier à petits fruits (<i>Ficus thonningii</i>)	338
164	Filaire à feuilles étroites ou à feuilles d'olivier (<i>Phyllirea angustifolia</i>)	339
165	Filao (<i>Casuarina equisetifolia</i>)	339
166	Fleurs à massifs (<i>Flos indeterminatus</i>)	339
167	Folle avoine rouge (<i>Themeda triandra</i>)	340
168	Forsythia ou mimosa de Paris (<i>Forsythia x intermedia</i>)	340
169	Fothergille (<i>Fothergilla major</i>)	340
170	Fougère arborescente de plaine - NAHE (<i>Angiopteris evecta</i>)	341
171	Fougère femelle (<i>Athyrium filix femina</i>)	341
172	Fougère mâle (<i>Dryopteris pseudomonas</i>)	341
173	Frêne à fleurs (<i>Fraxinus ornus</i>)	342
174	Frêne blanc (<i>Fraxinus americana</i>)	342
175	Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i>)	342
176	Frêne oxyphylle (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	343
177	Frêne taillé (<i>Fraxinus excelsior (trimmed)</i>)	343
178	Fromager (<i>Bombax ceiba</i>)	343
179	Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	344
180	Genévrier commun rampant (<i>Juniperus communis 'Prostrata'</i>)	344
181	Gingembre jaune (<i>Hedychium flavescens</i>)	344
182	Gingembre parfumé (<i>Hedychium gardnerianum</i>)	345
183	Gueule de loup (<i>Antirrhinum majus 'Wedding Bells'</i>)	345
184	Hamamélis (<i>Hamamelis mollis</i>)	345
185	Hélianthème faux alysse (<i>Helianthemum nummularium</i>)	346
186	Herbe à éléphant (<i>Panicum maximum</i>)	346
187	Herbe-a (<i>Herba indeterminata-a</i>)	346
188	Herbe-b (<i>Herba indeterminata-b</i>)	347
189	Herbe-c (<i>Herba indeterminata-c</i>)	347
190	Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	347
191	Hêtre commun-a (<i>Fagus sylvatica-a</i>)	348
192	Hêtre commun-b (<i>Fagus sylvatica-b</i>)	348
193	Hibiscus rose de Chine (<i>Hibiscus rosasinensis</i>)	348
194	Hinoki (<i>Chamaecyparis obtusa</i>)	349
195	Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	349
196	Hortensia grim pant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	349
197	Houx (<i>Ilex aquifolia</i>)	350
198	Houx du Japon (<i>Ilex rotundifolia</i>)	350
199	If des bois (<i>Taxus baccata</i>)	350
200	Immortelle de Virginie (<i>Anaphalis margaritacea</i>)	351
201	Ipomée spatulée (<i>Ipomoea spathulata</i>)	351
202	Iris hollandais (<i>Iris lusitanica x tingitana</i>)	351
203	Ixora, Arbuste corail (<i>Ixora coccinea</i>)	352
204	Jasmin d'hiver (<i>Jasminum nudiflorum</i>)	352
205	Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	352
206	Jujubier de la hyène, Jujubier à griffes (<i>Ziziphus mucronata</i>)	353
207	Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	353
208	Latanier rouge (<i>Latania lontaroides</i>)	353
209	Laurier cerise (<i>Prunus laurocerasus</i>)	354
210	Laurier des montagnes (<i>Kalmia latifolia</i>)	354
211	Laurier du Portugal ou laurier palme (<i>Prunus lusitanica</i>)	354
212	Laurier rose (<i>Nerium oleander</i>)	355
213	Laurier-tin (<i>Viburnum tinus</i>)	355
214	Lavande (<i>Lavandula angustifolia</i>)	355
215	Liane à lait (<i>Allamanda cathartica</i>)	356
216	Liard ou cotonnier (<i>Populus deltoides</i>)	356
217	Lierre rampant-a (<i>Hedera helix 'Glacier'</i>)	356
218	Lierre rampant-b (<i>Hedera helix var.</i>)	357
219	Lilas commun (<i>Syringa vulgaris</i>)	357
220	Lilas des Indes (<i>Melia azedarach</i>)	357




221	Lin de Narbonne (<i>Linum narbonense</i>)	358
222	Lin textile (<i>Linum usitatissimum</i>)	358
223	Luzerne cultivée (<i>Medicago sativa</i>)	358
224	Lys blanc (<i>Lilium candidum</i>)	359
225	Lys carnaval (<i>Lilium bulbiferum</i>)	359
226	Magnolia yulan (<i>Magnolia heptapeta</i> (syn. <i>denudata</i>))	359
227	Mahonia-c (<i>Mahonia x media</i> 'Charity')	360
228	Mahonia-m (<i>Mahonia aquifolium</i>)	360
229	Maïs cultivé (<i>Zea mays</i>)	360
230	Manguier - VI POPAA (<i>Mangifera indica</i>)	361
231	Marronnier du Japon (<i>Aesculus turbinata</i>)	361
232	Marronnier-a (<i>Aesculus x hippocastaneum-a</i>)	361
233	Marronnier-b (<i>Aesculus x hippocastaneum-b</i>)	362
234	Marronnier-c (<i>Aesculus x hippocastaneum-c</i>)	362
235	Marronnier-d (<i>Aesculus x hippocastaneum-d</i>)	362
236	Massette noire (<i>Typha latifolia</i>)	363
237	Mélèze d'Europe (<i>Larix decidua</i>)	363
238	Mélèze laricin ou d'Amérique (<i>Larix laricina</i>)	363
239	Merisier (<i>Prunus avium</i>)	364
240	Merisier (<i>Prunus avium</i>)	364
241	Micocoulier (<i>Celtis australis</i>)	364
242	Morinda - NONO (<i>Morinda citrifolia</i>)	365
243	Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	365
244	Mûrier à papier (<i>Broussonetia papyrifera</i>)	365
245	Myoporum (<i>Myoporum laetum</i>)	366
246	Myrtillier commun, myrtille, airelle, brimbelle (<i>Vaccinium myrtillum</i>)	366
247	Narthecium (<i>Narthecium sp.</i>)	366
248	Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	367
249	Nerprun (forme buisson) (<i>Rhamnus alaternus-a</i>)	367
250	Nerprun (forme tige) (<i>Rhamnus alaternus-b</i>)	367
251	Noisetier de Turquie (<i>Corylus colurna</i>)	368
252	Noyer commun (<i>Juglans regia</i>)	368
253	Noyer noir (<i>Juglans nigra</i>)	368
254	Noyer tendre (<i>Juglans cinerea</i>)	369
255	Olivier (Européen) (<i>Olea europaea</i>)	369
256	Olivier de Bohême, chalef (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)	369
257	Orme champêtre (<i>Ulmus campestris</i>)	370
258	Orme du Japon-a (<i>Zelkova serrata-a</i>)	370
259	Orme du Japon-b (<i>Zelkova serrata-b</i>)	370
260	Orpin géant (<i>Sedum telephium</i>)	371
261	Ortie brûlante géante (en arbre) (<i>Obetia pinnatifida</i>)	371
262	Pachysandra du Japon (<i>Pachysandra terminalis</i>)	371
263	Palette de peintre (<i>Caladium bicolor</i>)	372
264	Palétuvier rouge (<i>Rhizophora mangle</i>)	372
265	Palmier "bouteille" (<i>Hyophorbe lagenicaulis</i>)	372
266	Palmier (Phœnix) (<i>Phoenix sp.</i>)	373
267	Palmier à sucre (<i>Caryota urens</i>)	373
268	Palmier à tronc rouge (<i>Cyrtostachys renda</i>)	373
269	Palmier Arenga (<i>Arenga pinnata</i>)	374
270	Palmier chamaerops (<i>Chamaerops sp.</i>)	374
271	Palmier d'Arec (<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>)	374
272	Palmier d'intérieur-b (<i>Phoenix humilis</i>)	375
273	Palmier dattier sauvage (<i>Phoenix reclinata</i>)	375
274	Palmier de Chine (<i>Trachycarpus fortunei</i>)	375
275	Palmier de Guadeloupe (<i>Brahea edulis</i>)	376
276	Palmier de Roebelen, Palmier dattier nain (<i>Phoenix roebelinii</i>)	376
277	Palmier de Washington (<i>Washingtonia filifera</i>)	376
278	Palmier femelle nain (<i>Rhapis humilis</i>)	377
279	Palmier méditerranéen (<i>Chamaerops humilis</i>)	377
280	Palmier Royal (cocos) (<i>Arecastrum romanzoffianum</i>)	377
281	Palmier royal de Cuba (<i>Roystonea regia</i>)	378




282	Palmier Washingtonia (<i>Washingtonia robusta</i>)	378
283	Pandanus, baquois - FARA, HINANO (<i>Pandanus odoratissimus</i>)	378
284	Papyrus souchet (<i>Cyperus involucratus</i>)	379
285	Parasol chinois (<i>Firmiana simplex</i>)	379
286	Pâturin (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	379
287	Paulownia (<i>Paulownia tomentosa</i>)	380
288	Pavot d'Islande (<i>Papaver nudicaule</i>)	380
289	Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	380
290	Pavot épineux du Mexique (<i>Argemone mexicana</i>)	381
291	Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	381
292	Perce-neige (<i>Galanthus niva</i>)	381
293	Persea thunbergii (<i>Machilus thunbergii</i>)	382
294	Pervenche (<i>Vinca major</i>)	382
295	Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	382
296	Peuplier blanc (<i>Populus alba</i>)	383
297	Peuplier d'Italie (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	383
298	Peuplier de Chine, peuplier du Yunnan (<i>Populus yunnanensis</i>)	383
299	Peuplier hybride du Canada (<i>Populus deltoides x nigra</i>)	384
300	Peuplier noir (<i>Populus nigra</i>)	384
301	Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i>)	384
302	Pin argenté (<i>Pinus monticola</i>)	385
303	Pin blanc ou pin du Lord (<i>Pinus strobus</i>)	385
304	Pin d'Alep (<i>Pinus halepensis</i>)	385
305	Pin de l'Himalaya (<i>Pinus wallichiana</i>)	386
306	Pin de montagne, pin de Mongolie (<i>Pinus mugo (montana) 'Mungho'</i>)	386
307	Pin gris (<i>Pinus banksiana</i>)	386
308	Pin jaune des Montagnes Rocheuses (<i>Pinus ponderosa</i>)	387
309	Pin laricio (<i>Pinus nigra sp. laricio</i>)	387
310	Pin maritime (<i>Pinus pinaster</i>)	387
311	Pin noir d'Autriche (<i>Pinus nigra</i>)	388
312	Pin noir du Japon taillé (<i>Pinus thunbergii</i>)	388
313	Pin parasol, pin pignon (<i>Pinus pinea</i>)	388
314	Pin rouge (<i>Pinus resinosa</i>)	389
315	Pin rouge du Japon taillé (<i>Pinus densiflora</i>)	389
316	Pin sylvestre (<i>Pinus sylvestris</i>)	389
317	Plante à pétrole (<i>Euphorbia tirucalli</i>)	390
318	Platane taillé (<i>Platanus x acerifolia-c</i>)	390
319	Platane taillé (grand) (<i>Platanus x acerifolia-d</i>)	390
320	Platane-a (<i>Platanus x acerifolia-a</i>)	391
321	Polygonum rouge (<i>Polygonum affine 'Darjeeling red'</i>)	391
322	Pommetier à petits fruits (<i>Malus baccata 'Columnaris'</i>)	391
323	Pommetier Makamik (<i>Malus x 'Makamik'</i>)	392
324	Pruche du Canada (<i>Tsuga canadensis</i>)	392
325	Prunier (ou pêcher) décoratif (<i>Prunus x persica</i>)	392
326	Prunier décoratif-w (<i>Prunus x padus</i>)	393
327	Queue de lapin (<i>Pennisetum mezianum</i>)	393
328	Raisin d'ours, busserole (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)	393
329	Rince bouteille pleureur (<i>Callistemon viminalis</i>)	394
330	Riz (<i>Oryza sativa</i>)	394
331	Romarin commun (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	394
332	Ronce décorative (<i>Rubus calcynoides</i>)	395
333	Rosier ancien-c (<i>Rosa 'Golden Wings'</i>)	395
334	Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	395
335	Rosier grim pant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	396
336	Rosier polyantha (<i>Rosa 'Yesterday'</i>)	396
337	Sabal (<i>Sabal palmetto</i>)	396
338	Sapin baumier (<i>Abies balsamea</i>)	397
339	Sapin bleu (<i>Picea pungens 'Glauca'</i>)	397
340	Sapin de Douglas (<i>Pseudotsuga douglasii</i>)	397
341	Sapin de Vancouver (<i>Abies grandis</i>)	398
342	Sapin du Colorado (<i>Abies concolor</i>)	398




343	Sapin du Japon (<i>Abies firma</i>)	398
344	Sarcococca (<i>Sarcococca humilis</i>)	399
345	Saule argenté, saule blanc, saule vivier (<i>Salix alba-d</i>)	399
346	Saule pleureur (<i>Salix alba 'Chrysocoma'</i>)	399
347	Saule taillé (<i>Salix alba-b</i>)	400
348	Sawara (<i>Chamaecyparis pisifera</i>)	400
349	Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii 'Gaiety'</i>)	400
350	Senecio (Africain) Fleurs Jaunes (<i>Crassocephalum mannii</i>)	401
351	Séquoia côtier (<i>Sequoia sempervirens</i>)	401
352	Sisal sauvage, Sisal masaï, Sisal oldupai (<i>Sanseveria ehrenbergiana (syn. S. ehrenbergii)</i>)	401
353	Skimmia (<i>Skimmia japonica var.</i>)	402
354	Sorbier des oiseaux, sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i>)	402
355	Sorbier torminal, alisier (<i>Sorbus torminalis</i>)	402
356	Souchet géant (<i>Cyperus immensus</i>)	403
357	Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	403
358	Sporobolus ioclados (<i>Sporobolus ioclados</i>)	403
359	Sporobolus rouge (<i>Sporobolus festinus</i>)	404
360	Styrax du Japon (<i>Styrax japonica</i>)	404
361	Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana alata 'Domino'</i>)	404
362	Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana alata 'Sensation'</i>)	405
363	Tabebuia, Tecoma rose (<i>Tabebuia rosea</i>)	405
364	Taro géant - APE (<i>Alocasia macrorrhiza</i>)	405
365	Taro, Grande toyave - APE (<i>Alocasia esculanta</i>)	406
366	Teck (<i>Tectona grandis</i>)	406
367	Thuya géant (<i>Thuja plicata</i>)	406
368	Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	407
369	Tilleul à grandes feuilles, tilleul de Hollande (<i>Tilia platyphyllos</i>)	407
370	Tilleul-a (<i>Tilia cordata</i>)	407
371	Tilleul-b (<i>Tilia x europaea</i>)	408
372	Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	408
373	Trèfle blanc (<i>Trifolium pratense</i>)	408
374	Troène de Chine (<i>Ligustrum delavayanum</i>)	409
375	Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa 'x Darwin'</i>)	409
376	Tulipier (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	409
377	Valériane glauque (<i>Centranthus ruber 'Coccineus'</i>)	410
378	Vigne vraie (<i>Vitis vinifera</i>)	410
379	Viorne à feuilles de néflier (<i>Viburnum rhytidophyllum</i>)	410
380	Viorne lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	411
381	Weigélia (<i>Weigela 'B. Ruby'</i>)	411
382	Ylang Tlang - MOTOI (<i>Canaga odorata</i>)	411




Base Europe tempérée




Nom	Type	Description	Image
Abricotier japonais <i>(Prunus mume)</i>	Arbre	Petit arbre dressé à fleurs roses en début de printemps	
Agérate bleue <i>(Ageratum houstonianum)</i>	Fleur	Annuelle à masse arrondie de feuilles ovales, pointues. En été et en automne, capitules floraux en forme de brosse, plumeux, bleu lavande.	
Alchémille <i>(Alchemilla mollis)</i>	Herbe	Alchémille, plante de rocaille, couvre-sol à feuilles persistantes.	





Nom	Type	Description	Image
Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	Intérieur	Plante herbacée vivace originaire de Malaisie utilisée en ornement. Le gingembre rouge est cultivé en Asie pour ses fleurs qui durent très longtemps.	
Amélanchier-l (<i>Amelanchier laevis</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à floraison blanche en grappes au printemps, petits fruits bruns en été.	
Anthurium (<i>Anthurium andreanum</i>)	Intérieur	Poussent dans les forêts tropicales humides de montagne de l'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les fleurs sont petites (environ 3 mm) et se développent entassés dans un pic sur un axe charnu et nommé "spadix", une caractéristique des arums. Le spadix peut prendre différentes couleurs (blanc, vert, violet, rouge, rose, ou une combinaison). Le spadix fait partie d'une inflorescence. Certaines personnes aiment à appeler la partie extérieure de l'inflorescence une "fleur", mais c'est simplement une modification de la feuille. Elles peut être une seule couleur (jaune, vert ou blanc) ou, éventuellement, y compris multicolores bordeaux et rouge.	




Nom	Type	Description	Image
Arbre à papillons <i>(Buddleja davidii)</i>	Buisson	Arbuste à port évasé et feuillage caduc.	
Ardisia de Chine <i>(Ardisia crenata)</i>	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	
Ardisia du Japon <i>(Ardisia japonica)</i>	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	




Nom	Type	Description	Image
Aulne glutineux, verne, vergne (<i>Alnus glutinosa</i>)	Arbre	Arbre conique à croissance rapide mature à l'âge de 60 ans avec un long tronc. Demande beaucoup de lumière. Peut mesurer jusqu'à 20 mètres de haut.	
Avoine bleue (<i>Helictotrichon sempervirens</i>)	Herbe	Graminée à feuillage bleuté, inflorescence érigée, feuilles persistantes.	
Avoine cultivée (<i>Avena pratense</i>)	Herbe	Avoine cultivée	




Nom	Type	Description	Image
Bambou nain (<i>Arundinaria sp.</i>)	Intérieur	Petit bambou, plante d'intérieur.	
Bambou pubescent (<i>Phyllostachis edulis</i> ' <i>Heterocycla</i> ' (syn ' <i>Pubescens</i> '))	Indéterminé	Grand bambou cultivé pour son aspect décoratif et ses pousses comestibles.	
Bananier commun (<i>Musa domestica</i>)	Indéterminé	Bananier commun, grandes feuilles vert pale, inflorescence pendante terminée par un groupe de fleurs mâles pourpres.	




Nom	Type	Description	Image
Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	Intérieur	Plante à fleur originaire de l'Amérique tropicale et de certaines îles du Pacifique. De nombreuses espèces sont cultivées pour leur inflorescences de couleurs vives et voyantes.	
Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme. A planter en pot.	
Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme à floraison blanchâtre.	




Nom	Type	Description	Image
Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	Fleur	Aussi nommé "Bégonia à massifs".	
Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	Herbe		
Blé barbu (<i>Triticum sp.-a</i>)	Herbe		
Bois-joli ou bois-gentil (<i>Daphne mezereum</i>)	Arbuste	Arbuste buissonnant, fleurs blanches à blanc crémeux, fruits globuleux jaunes, feuillage caduc.	




Nom	Type	Description	Image
Boule de neige (<i>Viburnum plicatum</i> ' <i>Mariesii</i> ')	Buisson	Arbuste à port étagé, buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Bouleau commun, blanc ou verruqueux (<i>Betula pendula</i> (<i>verrucosa</i>))	Arbre	Arbre élégant à cime cylindrique ou conique. Mince rameaux souples, souvent pendants, écorce blanc argenté devenant noire et rugueuse à la base du tronc en vieillissant.	
Bouleau de l'Himalaya (<i>Betula utilis</i>)	Arbre	Port semi-pyramidal, écorce blanche.	




Nom	Type	Description	Image
Bruyère (<i>Erica carnea</i>)	Fleur	Bruyère d'hiver à feuilles persistantes.	
Bruyère 'Spring Cream' (<i>Calluna vulgaris</i> 'Spring Cream')	Fleur	Petite bruyère à floraison blanche.	
Buddleia à pompons (<i>Buddleja globosa</i>)	Buisson	Buddleia à feuillage glauque semi-persistant, floraison jaune abondante au printemps.	




Nom	Type	Description	Image
Buis 'Green Mountain' <i>(Buxus x sheridan 'Green Mountain')</i>	Arbuste	Buisson taillé en cône.	
Buisson taillé en 'coussin' <i>(Dumus indeterminatus)</i>	Buisson	Buisson taillé de forme hémisphérique.	
Callune fausse bruyère, brande <i>(Calluna vulgaris)</i>	Buisson	Sous-arbrisseau à feuilles persistantes. Donne de la mi-été à la fin de l'automne des grappes de fleurs.	




Nom	Type	Description	Image
Cèdre bleu (<i>Cedrus atlantica</i>)	Arbre	Arbre d'ornement. Parcs et jardins.	
Cerisier à fleurs japonais-e (<i>Prunus x yedoensis</i>)	Arbre	Arbre à feuillage caduc, cime arrondie, branches arquées, boutons roses suivis de fleurs blanches ou rose pâle au printemps.	
Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais (<i>Prunus serrulata lannesiana</i>)	Arbre	Arbre à port étalé, fleurs blanches ou roses de mi-à fin du printemps. Les feuilles caduques d'abord bronzées puis vert foncé, deviennent jaune brunâtre à l'automne.	




Nom	Type	Description	Image
Charme <i>(Carpinus betula)</i>	Arbre		
Châtaignier-a <i>(Castanea sativa-a)</i>	Arbre	Feuillu avec une couronne étalée. Version âgée de l'arbre simulable de 20 à 60 ans mais ne peut être simulé en dessous de 20 ans. Pour la version juvénile, merci de consulter le Châtaignier-b.	
Châtaignier-b <i>(Castanea sativa-b)</i>	Arbre	Arbre caduc à cime étalée. Version Juvénile de l'arbre simulable de 5 à 30 ans. Pour une version très âgée, merci consulter le Châtaignier-a.	




Nom	Type	Description	Image
Chêne pédonculé (<i>Quercus Pedunculata</i> (<i>Robur</i>))	Arbre	Grand arbre à port dressé puis étalé et feuillage caduc. Fleurit au printemps avec ensuite des fruits ovoïdes.	
Chêne Rouvre (<i>Quercus petrae</i>)	Arbre		
Chèvrefeuille rampant (<i>Lonicera sp.</i>)	Herbe	Arbuste grimpant à feuillage persistant ou semi-persistant.	




Nom	Type	Description	Image
Chlorophytum du Cap <i>(Chlorophytum capense)</i>	Intérieur	Plante vivace bulbeuse, cultivée pour son feuillage. Longues hampes florales portant de nombreuses fleurs blanches.	
Clématite <i>(Clematis jackmanii 'Superba')</i>	Grimpant	Plante grimpante à grandes fleurs pourpres violacées, et palissée sur une colonne.	
Coleus <i>(Coleus blumei 'sanguineum')</i>	Intérieur	plante ornementale originaire d'Asie du sud-est (Indonésie, Java). Feuilles tricolores, opposées ovales, à dominante verte tachetée de rouge vin -framboise et jaune.	

Nom	Type	Description	Image
Coléus à feuilles larges <i>(Coleus blumei 'Brightness')</i>	Fleur	Plante au feuillage coloré et au revers duveteux. Feuilles dentées.	
Coréopsis à verticilles <i>(Coreopsis verticillata)</i>	Fleur	Coréopsis à floraison jaune.	
Cormier <i>(Sorbus domestica)</i>	Arbre	On confond souvent le cormier avec le sorbier des oiseleurs. Le cormier a des besoins en lumière élevés (même s'il préfère un léger ombrage au plein soleil), c'est un arbre à forte croissance.	




Nom	Type	Description	Image
Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	Arbuste	Arbuste rameux et dense, feuillage vert devenant pourpre rougeâtre à l'automne, fleurs jaune soufre en fin d'hiver, début printemps, fruits rouges à maturité.	
Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos 'Sensation'</i>)	Fleur	Floraison rose violacé.	
Cotoneaster (<i>Cotoneaster franchetti</i>)	Buisson	Buisson semi-érigé, à port étalé, feuillage semi-persistant, buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	




Nom	Type	Description	Image
Crocus (<i>Crocus sp.</i>)	Fleur		
Cytise (<i>Laburnum x watereri 'Vossii'</i>)	Arbre	Petit arbre à port étalé et à feuilles caduques, originaire des régions méditerranéennes et d'Europe centrale, le cytise est surtout planté comme arbre d'ornement, Les fleurs en grappes pendantes, sont de couleur jaune vif en fin de printemps et été.	
Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	Intérieur	A planter en bacs.	




Nom	Type	Description	Image
Épicéa <i>(Picea abies)</i>	Arbre	Port élané, arbre de Noël.	
Épicéa 'pyramidalis' <i>(Picea abies var. pyramidalis)</i>	Arbre	Port étalé.	
Épinette blanche <i>(Picea glauca)</i>	Arbre	Épinette du Canada, épicéa vert argenté.	




Nom	Type	Description	Image
Erable champêtre (forme arbre) <i>(Acer campestre)</i>	Arbre	Arbre de couleur vert à croissance rapide souvent utilisé en coupe-vent.	
Erable champêtre forme taillis <i>(Acer campestre forme taillis)</i>	Arbre	C'est un arbre pouvant atteindre une vingtaine de mètres, à écorce grise, fissurée, à petites feuilles caduques, utilisé dans les parcs et les jardins , le bois en menuiserie est connu pour sa résistance aux insectes	
Erable plane <i>(Acer platanoides)</i>	Arbre	Arbre vigoureux à port étalé, grandes feuilles caduques lobées, vert vif, devenant jaunes ou oranges en automne.	




Nom	Type	Description	Image
Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	Arbre		
Ficus benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	Intérieur	Arbuste ornemental à port pleureur, feuilles ovales persistantes.	
Fleurs à massifs (<i>Flos indeterminatus</i>)	Fleur	Fleurs de massifs, la touffe se développe par rhizome.	




Nom	Type	Description	Image
Forsythia ou mimosa de Paris (<i>Forsythia x intermedia</i>)	Buisson	Arbuste touffu, taillé annuellement, fleurs jaunes au printemps.	
Fougère femelle (<i>Athyrium filix femina</i>)	Indéterminé	Fougère femelle, fougère de sous-bois ou talus ombragés.	
Fougère mâle (<i>Dryopteris pseudomonas</i>)	Indéterminé	Fougère mâle, fronde persistante, port élançé.	




Nom	Type	Description	Image
Frêne à fleurs (<i>Fraxinus ornus</i>)	Arbre	Frêne commun ou Grand frêne	
Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Arbre	Arbre vigoureux à port étalé. Les feuilles pennées, vert foncé deviennent parfois jaune en automne.	
Frêne oxyphylle (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Arbre	Petit frêne méditerranéen.	




Nom	Type	Description	Image
Frêne taillé (<i>Fraxinus excelsior</i> (<i>trimmed</i>))	Arbre	Rejet de souche de frêne.	
Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant fastigié. Fleurs jaune d'or au printemps.	
Genévrier commun rampant (<i>Juniperus communis</i> 'Prostrata')	Buisson	Conifère en buisson étalé utilisé en horticulture comme plante ornementale. On le trouve de l'Arctique jusqu'à la zone tempérée en Asie en Europe et en Amérique.	




Nom	Type	Description	Image
Gingembre parfumé (<i>Hedychium gardnerianum</i>)	Intérieur	"Plante que l'on trouve dans les régions tropicales, de la Martinique à Hawaï en passant par la Réunion. Dans ces îles, elle est l'espèce introduite la plus naturalisée, au point qu'elle en devient envahissante en certains endroits.	
Gueule de loup (<i>Antirrhinum majus 'Wedding Bells'</i>)	Fleur	Muflier à fleurs jaunes.	
Hamamélis (<i>Hamamelis mollis</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à floraison hivernale, limité en hauteur comme par une taille de conduite.	




Nom	Type	Description	Image
Hélianthème faux alysse (<i>Helianthemum nummularium</i>)	Herbe	Buisson à port étalé et feuillage persistant gris. Porte, en été, une succession de fleurs jaunes en forme de coupe.	
Herbe-a (<i>Herba indeterminata-a</i>)	Herbe	Herbe, touffe de graminées à grandes feuilles.	
Herbe-b (<i>Herba indeterminata-b</i>)	Herbe	Herbe, touffe de graminées à feuilles courtes.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-c (<i>Herba indeterminata-c</i>)	Herbe	Herbe, graminées à feuillage dense, alignées en bande.	
Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	Herbe	Graminée à épis.	
Hêtre commun-a (<i>Fagus sylvatica-a</i>)	Arbre	Jeune hêtre commun, densité de type forestier.	




Nom	Type	Description	Image
Hêtre commun-b (<i>Fagus sylvatica-b</i>)	Arbre	Grand hêtre de forêt en conditions de forte densité.	
Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à feuilles caduques, taillé, à inflorescences en dôme, blanches, rosées, pourpre ou bleues. On trouve des hortensias très couramment dans des jardins partout dans le monde, mais ils sont originaires de Chine.	
Hortensia grim pant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	Grimpant	Originaires de l'île russe Sakhaline, de Corée et du Japon. Plante grimpante qui s'accroche toute seule et parvient à couvrir des surfaces importantes. Feuilles caduques, fleurs blanches en été, plante palissée sur une colonne.	




Nom	Type	Description	Image
Houx (<i>Ilex aquifolia</i>)	Arbre	Arbre ou arbuste à feuillage persistant, vert foncé, très ramifié et dressé.	
If des bois (<i>Taxus baccata</i>)	Arbre	Conifère à croissance lente, à cime large.	
Immortelle de Virginie (<i>Anaphalis margaritacea</i>)	Fleur	Immortelle à fleurs blanches (toujours fleurie).	




Nom	Type	Description	Image
Iris hollandais (<i>Iris lusitanica x tingitana</i>)	Fleur	Iris bulbeux à floraison bleue.	
Jasmin d'hiver (<i>Jasminum nudiflorum</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à branches arquées, feuillage caduc vert sombre, fleurs jaune vif en fin d'hiver ou début de printemps, sur des pousses vertes.	
Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	Fleur	Jonquille, plante bulbeuse à floraison printanière.	




Nom	Type	Description	Image
Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	Herbe	Lamier argenté, plante tapissante à feuilles persistantes.	
Laurier cerise (<i>Prunus laurocerasus</i>)	Arbuste	Laurier cerise, arbuste à abondante floraison printanière blanche, feuilles persistantes.	
Laurier du Portugal ou laurier palme (<i>Prunus lusitanica</i>)	Buisson	Arbuste dense, buissonnant à port étalé, fleurs blanches au début de l'été suivies de fruits rouges.	




Nom	Type	Description	Image
Laurier rose (<i>Nerium oleander</i>)	Buisson	Buisson fleuri limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Laurier-tin (<i>Viburnum tinus</i>)	Arbuste	Arbuste dense, touffu et à feuillage persistant, vert sombre. En fin d'hiver et au printemps, il produit d'abondantes cymes terminales de petites fleurs blanches issues de boutons roses, un floraison automnale est parfois possible.	
Lierre rampant-a (<i>Hedera helix</i> 'Glacier')	Herbe	Plante couvre-sol retombante.	




Nom	Type	Description	Image
Lierre rampant-b <i>(Hedera helix var.)</i>	Herbe	Lierre anglais rampant.	
Lilas commun <i>(Syringa vulgaris)</i>	Arbuste	Arbuste ou petit arbre à feuilles ovales, au début de l'été panicules de fleurs blanches à violette.	
Lin textile <i>(Linum usitatissimum)</i>	Fleur		




Nom	Type	Description	Image
Luzerne cultivée <i>(Medicago sativa)</i>	Fleur		
Lys blanc <i>(Lilium candidum)</i>	Fleur	Lys à grandes fleurs blanches retombantes.	
Lys carnaval <i>(Lilium bulbiferum)</i>	Fleur	Lys carnaval, lys à floraison dressée très colorée.	




Nom	Type	Description	Image
Maïs cultivé (<i>Zea mays</i>)	Herbe		
Marronnier-a (<i>Aesculus x hippocastaneum-a</i>)	Arbre	Arbre jeune isolé au stade adulte sans taille souvent nécessite d'être taillé (voir marronnier b ou marronnier d).	
Marronnier-b (<i>Aesculus x hippocastaneum-b</i>)	Arbre	Plante simulant une taille périodique du Marronnier-a souvent présent en ville le long des avenues.	




Nom	Type	Description	Image
Marronnier-c (<i>Aesculus x hippocastaneum-c</i>)	Arbre	marronnier rouge simulant une taille périodique	
Marronnier-d (<i>Aesculus x hippocastaneum-d</i>)	Arbre	Grand arbre isolé simulant une taille périodique du Marronnier-a souvent trouvé en milieu urbain dans les parcs et jardins.	
Massette noire (<i>Typha latifolia</i>)	Indéterminé	Silhouette graminée, plante d'eau.	




Nom	Type	Description	Image
Mélèze d'Europe <i>(Larix decidua)</i>	Arbre	Conifère à feuillage caduc et à croissance rapide, port conique à l'état jeune, s'élargissant ensuite.	
Merisier <i>(Prunus avium)</i>	Arbre		
Merisier <i>(Prunus avium)</i>	Arbre		




Nom	Type	Description	Image
Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	Fleur		
Myrtillier commun, myrtille, airelle, brimbelle (<i>Vaccinium myrtillum</i>)	Herbe	Sous-arbrisseau traçant à feuilles caduques. Petites feuilles ovales, coriace, vert clair. Donne au début de l'été des fleurs en grelot pendant, rose pale, suivies de fruits globuleux, noirs à pruine bleutée.	
Narthecium (<i>Narthecium sp.</i>)	Fleur	Touffe de narthecium.	




Nom	Type	Description	Image
Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	Herbe	Nepeta, plante tapissante à floraison bleue.	
Noisetier de Turquie (<i>Corylus colurna</i>)	Arbre	Arbre conique à feuilles caduques ovales.	
Noyer commun (<i>Juglans regia</i>)	Arbre	Le noyer, est également appelé noyer commun ou noyer royal, en référence à son nom scientifique. C'est un arbre de grande taille à feuillage caduc, originaire d'Europe de l'Est, mais que l'on trouve poussant spontanément sur les contreforts de l'Himalaya, ou encore en Chine et en Iran. En Europe, cet arbre est cultivé depuis longtemps pour son bois et ses fruits.	




Nom	Type	Description	Image
Olivier de Bohême, chalef (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)	Arbre	C'est un arbuste souvent planté dans les jardins en Provence. Originaire d'Asie l'olivier de bohême est un grand arbrisseau à feuillage caduc qui peut atteindre 7 à 8 mètres. Arbuste touffu ou petit arbre étalé. Feuilles caduques étroites, gris argenté.	
Orme champêtre (<i>Ulmus campestris</i>)	Arbre	Arbre à port large et arrondi. Feuilles caduc en cymes globulaires au printemps, samares à aile large.	
Orpin géant (<i>Sedum telephium</i>)	Fleur	sedum vivace à souche ligneuse, feuilles persistantes en rosette basale; cymes de fleurs étoilées en été.	




Nom	Type	Description	Image
Palette de peintre (<i>Caladium bicolor</i>)	Intérieur	Plante commune vivace à tubercule. Feuilles sagittées. Feuillage aux couleurs brillantes. Apprécie une atmosphère chaude et humide.	
Palmier d'intérieur-b (<i>Phoenix humilis</i>)	Intérieur	Originaire d'Asie, très répandu au Viêt-Nam et le long des rives du fleuve Mékong au Laos, ce palmier ne dépasse pas 2 mètres de haut.	
Pâturin (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	Herbe	Pâturin, touffe de graminées décoratives.	




Nom	Type	Description	Image
Pavot d'Islande (<i>Papaver nudicaule</i>)	Fleur	Pavot vivace à floraison variée.	
Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	Fleur	Pavot de Californie à floraison orange vif.	
Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	Fleur		




Nom	Type	Description	Image
Perce-neige (<i>Galanthus niva</i>)	Fleur		
Pervenche (<i>Vinca major</i>)	Herbe	Plante tapissante à feuilles persistantes.	
Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	Fleur	Massifs, bordures mixtes ou jardinières.	




Nom	Type	Description	Image
Peuplier blanc (<i>Populus alba</i>)	Arbre	Usage : Parcs ou jardins.	
Peuplier d'Italie (<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> ')	Arbre	Arbre isolé ou d'alignement.	
Peuplier noir (<i>Populus nigra</i>)	Arbre	Plantations forestières, aires de repos.	




Nom	Type	Description	Image
Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i>)	Arbre	Parcs ou jardins.	
Pin de l'Himalaya (<i>Pinus wallichiana</i>)	Arbre	Originaire de la région de l'Himalaya, il pousse en haute altitude (1800-4300 m) rarement en dessous de 1200 m , il pousse dans des climats tempérés avec des hivers secs et des étés humides. Il est aussi utilisé en zones méditerranéennes pour sa rusticité.	
Pin de montagne, pin de Mongolie (<i>Pinus mugo (montana)</i> 'Mungho')	Arbuste	Conifère arbustif à taille variable. Feuilles en aiguilles de vert vif à vert foncé.	




Nom	Type	Description	Image
Pin laricio <i>(Pinus nigra sp. laricio)</i>	Arbre	Originare de Corse. Arbre parfaitement droit qui peut atteindre 40 m de haut et vieillir jusqu'à 600 ans.	
Pin maritime <i>(Pinus pinaster)</i>	Arbre	Conifère persistant à aiguilles longues et croissance lente.	
Pin noir d'Autriche <i>(Pinus nigra)</i>	Arbre	Parcs ou plantations.	




Nom	Type	Description	Image
Pin sylvestre <i>(Pinus sylvestris)</i>	Arbre	Arbre de plantation forestière.	
Platane taillé <i>(Platanus x acerifolia-c)</i>	Arbre	Arbre isolé taillé en gobelet, sur les places ou esplanades.	
Platane taillé (grand) <i>(Platanus x acerifolia-d)</i>	Arbre	Grand platane taillé.	




Nom	Type	Description	Image
Platane-a <i>(Platanus x acerifolia-a)</i>	Arbre	Usage : Arbre isolé ou d'alignement.	
Polygonum rouge <i>(Polygonum affine 'Darjeeling red')</i>	Herbe	Polygonum rouge, plante tapissante à feuilles caduques.	
Prunier (ou pêcher) décoratif <i>(Prunus x persica)</i>	Arbre	Prunier décoratif, arbre d'ornement.	




Nom	Type	Description	Image
Prunier décoratif-w (<i>Prunus x padus</i>)	Arbre	Arbre d'ornement non taillé.	
Raisin d'ours, busserole (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)	Buisson	Arbuste à feuillage persistant, rampant, parfois à branches arquées. Petites feuilles vert vif, en été fleurs blanches suivies de fruits globuleux rouges.	
Rosier ancien-c (<i>Rosa 'Golden Wings'</i>)	Buisson	Rosier ancien, rosier arbustif touffu et étalé. Fleurs jaunes très retombantes, fruits orangés en hiver. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	




Nom	Type	Description	Image
Rosier ancien-d <i>(Rosa 'Nevada')</i>	Buisson	Rosier ancien, buisson arbustif à floraison remontante blanche. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Rosier grimpant <i>(Rosa 'New Dawn')</i>	Grimpant	Rosier grimpant, feuilles caduques, bouquet de fleurs rose pale.	
Rosier polyantha <i>(Rosa 'Yesterday')</i>	Buisson	Rosier polyantha, buisson à végétation basse et compacte.	




Nom	Type	Description	Image
Sapin de Douglas (<i>Pseudotsuga douglasii</i>)	Arbre	"sapin" de Douglas, conifère érigé nord américain.	
Saule argenté, saule blanc, saule vivier (<i>Salix alba-d</i>)	Arbre	Arbre caduque à croissance rapide, à cime étalée, conique dans le jeune âge. Les feuilles étroites sont gris argenté vif.	
Saule pleureur (<i>Salix alba 'Chrysocoma'</i>)	Arbre	Parcs ou jardins.	




Nom	Type	Description	Image
Saule taillé (<i>Salix alba-b</i>)	Arbre	Arbre taillé par rapprochement.	
Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii 'Gaiety'</i>)	Herbe	Plante couvre-sol à feuillage compact.	
Skimmia (<i>Skimmia japonica var.</i>)	Buisson	Buisson à port compact étalé, feuillage persistant, buisson limité comme par une taille de conduite.	



Nom	Type	Description	Image
Sorbier des oiseaux, sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i>)	Arbre	Son aire de répartition naturelle couvre toute l'Europe et l'Asie tempérée. Répandu par la culture, il s'est naturalisé ailleurs, notamment en Amérique du Nord. Cet arbre, qui est le plus répandu des sorbiers, est souvent planté comme arbre d'alignement ou d'ornement dans les parcs et jardins. Arbre à feuillage caduc, port étalé. Feuilles à folioles vert moyen virant au rouge ou au jaune en automne. Fleurs printanières blanches, et fruits rouges à l'automne.	
Sorbier torminal, alisier (<i>Sorbus torminalis</i>)	Arbre	Arbre caduc.	
Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	Buisson	Arbuste à pousses minces et arquées, feuilles caduques. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	

Nom	Type	Description	Image
Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana glauca</i> 'Domino')	Fleur	Tabac ornemental à floraison blanche.	
Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana glauca</i> 'Sensation')	Fleur	Tabac ornemental à floraison rouge.	
Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	Herbe	Tiarella vigoureuse, plante vivace à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Tilleul à grandes feuilles, tilleul de Hollande (<i>Tilia platyphyllos</i>)	Arbre	Arbre à port étalé. Feuilles caduques, arrondies, vert vif.	
Tilleul-a (<i>Tilia cordata</i>)	Arbre	Jeune tilleul.	
Tilleul-b (<i>Tilia x europaea</i>)	Arbre	Tilleul taillé.	




Nom	Type	Description	Image
Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	Fleur	Plante annuelle.	
Trèfle blanc (<i>Trifolium pratense</i>)	Fleur		
Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa 'x Darwin'</i>)	Fleur	Plante bulbeuse à fleurs. Grandes fleurs simples, à fort pédoncule éclochant de la mi printemps à la fin de cette saison.	




Nom	Type	Description	Image
Valériane glauque (<i>Centranthus ruber</i> ' <i>Coccineus</i> ')	Fleur	Valériane à floraison rose.	
Vigne vraie (<i>Vitis vinifera</i>)	Arbuste	Plante sarmenteuse, taillée en gobelet pour la récolte du raisin. Le feuillage caduque est vert devenant jaune à pourpre en automne.	
Viorne à feuilles de néflier (<i>Viburnum rhytidophyllum</i>)	Buisson	Arbuste vigoureux, à port étalé, longues feuilles étroites, persistantes, cymes de fleurs blanc crème au printemps suivies de fruits rouges puis noirs.	




Nom	Type	Description	Image
Viorne lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	Buisson	Arbuste vigoureux, dressé, feuilles caduques ovales foncées, parfois rougeâtre à l'automne, cymes de fleurs blanc crème au printemps parfois suivies de fruits rouges puis noir bleuté.	
Weigélia (<i>Weigela 'B. Ruby'</i>)	Buisson	Buisson à port assez érigé, abondante floraison rouge.	




Base Méditerranée




Nom	Type	Description	Image
Abricotier japonais (<i>Prunus mume</i>)	Arbre	Petit arbre dressé à fleurs roses en début de printemps	
Albizia (<i>Albizia julibrissin</i>)	Arbre	Albizia, arbre de type albizia, méditerranéen ou tropical.	
Albizia gommier (<i>Albizia gummifera</i>)	Arbre	Arbre caduc qui préfère les lisières de forêts et les forêts-parcs des régions montagneuses de l'Afrique.	




Nom	Type	Description	Image
Alchémille (<i>Alchemilla mollis</i>)	Herbe	Alchémille, plante de rocaille, couvre-sol à feuilles persistantes.	
Aloès de Volken (<i>Aloe volkensii</i>)	Indéterminé	Rosettes molles vivaces d'Afrique de l'Est.	
Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	Intérieur	Plante herbacée vivace originaire de Malaisie utilisée en ornement. Le gingembre rouge est cultivé en Asie pour ses fleurs qui durent très longtemps.	




Nom	Type	Description	Image
Amélanchier-l (<i>Amelanchier laevis</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à floraison blanche en grappes au printemps, petits fruits bruns en été.	
Anthurium (<i>Anthurium andreanum</i>)	Intérieur	Poussent dans les forêts tropicales humides de montagne de l'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les fleurs sont petites (environ 3 mm) et se développent entassés dans un pic sur un axe charnu et nommé "spadix", une caractéristique des arums. Le spadix peut prendre différentes couleurs (blanc, vert, violet, rouge, rose, ou une combinaison). Le spadix fait partie d'une inflorescence. Certaines personnes aiment à appeler la partie extérieure de l'inflorescence une "fleur", mais c'est simplement une modification de la feuille. Elles peut être une seule couleur (jaune, vert ou blanc) ou, éventuellement, y compris multicolores bordeaux et rouge.	
Arbousier (forme buisson) (<i>Arbutus unedo-a</i>)	Buisson	Typique de la flore méditerranéenne avec des fleurs rouges.	




Nom	Type	Description	Image
Arbousier d'Amérique <i>(Arbutus menziesii)</i>	Arbre	Originaire de l'ouest des Etats Unis, le fruit comestible est appelé arbose. Cet arbre est aussi utilisé pour son aspect ornemental.	
Arbre de Judée <i>(Cercis silicestrum)</i>	Arbre	Petit arbre de 10-15 mètres, les fleurs sont pourpre, l'arbre est planté dans le jardin pour l'ornement. Selon la légende , c'est à cet arbre que Judas se serait pendu. Arbre/arbuste assez étalé, floraison printanière de boutons magenta suivis de fleurs roses avant l'apparition des feuilles ovales.	
Ardisia de Chine <i>(Ardisia crenata)</i>	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	




Nom	Type	Description	Image
Ardisia du Japon (<i>Ardisia japonica</i>)	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	
Bambou nain (<i>Arundinaria sp.</i>)	Intérieur	Petit bambou, plante d'intérieur.	
Bambou pubescent (<i>Phyllostachis edulis</i> ' <i>Heterocyclus</i> ' (syn ' <i>Pubescens</i> '))	Indéterminé	Grand bambou cultivé pour son aspect décoratif et ses pousses comestibles.	




Nom	Type	Description	Image
Bananier commun (<i>Musa domestica</i>)	Indéterminé	Bananier commun, grandes feuilles vert pale, inflorescence pendante terminée par un groupe de fleurs mâles pourpres.	
Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	Intérieur	Plante à fleur originaire de l'Amérique tropicale et de certaines îles du Pacifique. De nombreuses espèces sont cultivées pour leur inflorescences de couleurs vives et voyantes.	
Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme. A planter en pot.	




Nom	Type	Description	Image
Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme à floraison blanchâtre.	
Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	Fleur	Aussi nommé "Bégonia à massifs".	
Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	Herbe		




Nom	Type	Description	Image
Bois-joli ou bois-gentil <i>(Daphne mezereum)</i>	Arbuste	Arbuste buissonnant, fleurs blanches à blanc crémeux, fruits globuleux jaunes, feuillage caduc.	
Bouleau commun, blanc ou verruqueux <i>(Betula pendula (verrucosa))</i>	Arbre	Arbre élégant à cime cylindrique ou conique. Minces rameaux souples, souvent pendants, écorce blanc argenté devenant noire et rugueuse à la base du tronc en vieillissant.	
Bruyère <i>(Erica carnea)</i>	Fleur	Bruyère d'hiver à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Buis 'Green Mountain' <i>(Buxus x sheridan 'Green Mountain')</i>	Arbuste	Buisson taillé en cône.	
Buisson taillé en 'coussin' <i>(Dumus indeterminatus)</i>	Buisson	Buisson taillé de forme hémisphérique.	
Canne de Provence <i>(Arundo donax)</i>	Indéterminé	Plante à rhizomes, vivace. Tiges épaisses portant de larges feuilles. Donne en été des panicules denses, dressées.	




Nom	Type	Description	Image
Catalpa commun (<i>Catalpa bignioïdes</i>)	Arbre	Arbre à port étalé, à grandes feuilles, floraison estivale en panicules de fleurs blanches, suivie de fruits en longues gousses pendantes.	
Cèdre bleu (<i>Cedrus atlantica</i>)	Arbre	Arbre d'ornement. Parcs et jardins.	
Cèdre du Liban (<i>Cedrus libani</i>)	Arbre	Le cèdre du Liban est originaire du Moyen-orient : Liban, Syrie, Turquie. Le feuillage, persistant, est bleu-vert. L'arbre mature mesure de 20 à 40 m.	




Nom	Type	Description	Image
Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais <i>(Prunus serrulata lannesiana)</i>	Arbre	Arbre à port étalé, fleurs blanches ou roses de mi-à fin du printemps. Les feuilles caduques d'abord bronzées puis vert foncé, deviennent jaune brunâtre à l'automne.	
Châtaignier-a <i>(Castanea sativa-a)</i>	Arbre	Feuillu avec une couronne étalée. Version âgée de l'arbre simulable de 20 à 60 ans mais ne peut être simulé en dessous de 20 ans. Pour la version juvénile, merci de consulter le Châtaignier-b.	
Châtaignier-b <i>(Castanea sativa-b)</i>	Arbre	Arbre caduc à cime étalée. Version Juvénile de l'arbre simulable de 5 à 30 ans. Pour une version très âgée, merci consulter le Châtaignier-a.	




Nom	Type	Description	Image
Chêne vert <i>(Quercus ilex)</i>	Arbre	Arbre d'Europe du Sud-ouest et d'Afrique du Nord à port arrondi et feuillage persistant, un peu épineux.	
Chêne vert (forme cépée) <i>(Quercus ilex (bush shape))</i>	Arbre	Arbre d'Europe du Sud-ouest et d'Afrique du Nord en forme de buisson arrondi et feuillage persistant, un peu épineux.	
Chêne vert (forme taillée) <i>(Quercus ilex (pruned shape))</i>	Arbre	Arbre d'Europe du Sud-ouest et d'Afrique du Nord taillé pour la production de fruits à feuillage persistant, un peu épineux.	




Nom	Type	Description	Image
Chèvrefeuille rampant (<i>Lonicera sp.</i>)	Herbe	Arbuste grimpant à feuillage persistant ou semi-persistant.	
Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	Intérieur	Plante vivace bulbeuse, cultivée pour son feuillage. Longues hampes florales portant de nombreuses fleurs blanches.	
Clématite (<i>Clematis jackmanii</i> 'Superba')	Grimpant	Plante grimpante à grandes fleurs pourpres violacées, et palissée sur une colonne.	




Nom	Type	Description	Image
Coleus (<i>Coleus blumei</i> ' <i>sanguineum</i> ')	Intérieur	plante ornementale originaire d'Asie du sud-est (Indonésie, Java). Feuilles tricolores, opposées ovales, à dominante verte tachetée de rouge vin -framboise et jaune.	
Coléus à feuilles larges (<i>Coleus blumei</i> ' <i>Brightness</i> ')	Fleur	Plante au feuillage coloré et au revers duveteux. Feuilles dentées.	
Commiphora (<i>Commiphora</i> <i>trothea</i>)	Arbre	Petit arbre sempervirent d'Afrique et d'Asie.	




Nom	Type	Description	Image
Cordia à feuilles ovales (<i>Cordia ovalis</i>)	Arbuste	Arbuste typique d'Afrique.	
Coréopsis à verticilles (<i>Coreopsis verticillata</i>)	Fleur	Coréopsis à floraison jaune.	
Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	Arbuste	Arbuste rameux et dense, feuillage vert devenant pourpre rougeâtre à l'automne, fleurs jaune soufre en fin d'hiver, début printemps, fruits rouges à maturité.	




Nom	Type	Description	Image
Cosmos 'Sensation' <i>(Cosmos</i> <i>'Sensation')</i>	Fleur	Floraison rose violacé.	
Cotoneaster <i>(Cotoneaster</i> <i>franchetti)</i>	Buisson	Buisson semi-érigé, à port étalé, feuillage semi-persistant, buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Crotalaria griffe de lion <i>(Crotalaria</i> <i>agatiflora)</i>	Arbuste	Arbrisseau sempervirent de l'Afrique tropicale. Fleurs jaune-vert de l'été à l'automne.	




Nom	Type	Description	Image
Croton à feuilles larges (<i>Croton macrostachyus</i>)	Arbre	Arbre d'Afrique aux larges feuilles. Ecorce grise rugueuse. Fleurs jaunes-blanches au parfum sucré. Feuilles larges en forme de cœur.	
Cyprès d'Italie (<i>Cupressus sempervirens</i>)	Arbre	Conifère colonnaire dressé.	
Cyprès de Lawson-a (<i>Chamaecyparis lawsonii-a</i>)	Arbre	Conifère dressé à rameaux plagiotropes et ramilles orthotropes.	




Nom	Type	Description	Image
Cyprès de Lawson-b <i>(Chamaecyparis lawsonii-b)</i>	Arbre	Conifère à branches plagiotropes et rameaux orthotropes.	
Cyprès de Provence pyramidal <i>(Cupressus sempervirens 'Horizontalis')</i>	Arbre	Conifère dresse, pyramidal. Feuillage fonce gris-vert.	
Cytise <i>(Laburnum x watereri 'Vossii')</i>	Arbre	Petit arbre à port étalé et à feuilles caduques, originaire des régions méditerranéennes et d'Europe centrale, le cytise est surtout planté comme arbre d'ornement, Les fleurs en grappes pendantes, sont de couleur jaune vif en fin de printemps et été.	




Nom	Type	Description	Image
Dattier des Canaries (<i>Phoenix canarensis</i>)	Palmier		
Dattier du désert (<i>Balanites aegyptiaca</i>)	Arbre	Se trouve sur plusieurs types de sols en Afrique. Atteint une croissance maximale sur des sols alluviaux et se répand sur de larges zones géographiques. Bois jaune clair et branches épineuses.	
Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	Intérieur	A planter en bacs.	




Nom	Type	Description	Image
Epine du Christ ou arbre à chapeau (<i>Paliurus spinachristi</i>)	Arbuste	Arbuste à rameaux munis d'épines. Beau feuillage automnal. Grappes de fleurs jaune-verdâtre. Fruits en chapeaux chinois. Espèce méditerranéenne des garrigues.	
Eucalyptus (<i>Eucalyptus sp.</i>)	Arbre	Espèce la plus importante de couvert forestier en Australie. Généralement grand, avec un seul tronc, bien que certaines espèces en possèdent plusieurs.	
Eucalyptus commun (<i>Eucalyptus globulus</i>)	Arbre	Originaire d'Australie. Il est largement cultivé et peut croître jusqu'à 30-55 m de haut. Il s'est bien acclimatée dans d'autre partie du monde. Le gommier bleu a été proclamé comme emblème floral de Tasmanie.	




Nom	Type	Description	Image
Ficus benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	Intérieur	Arbuste ornemental à port pleureur, feuilles ovales persistantes.	
Ficus benjamina (forme tropicale haie libre) (<i>Ficus benjamina</i> (trop.))	Arbre	Ficus benjamina (forme tropicale haie libre)	
Filaire à feuilles étroites ou à feuilles d'olivier (<i>Phyllirea angustifolia</i>)	Arbuste	Arbuste parfois buissonnant, feuilles persistantes à face inférieure argentée rappelant celles de l'olivier, floraison discrète suivie de baies bleutées.	




Nom	Type	Description	Image
Fleurs à massifs <i>(Flos indeterminatus)</i>	Fleur	Fleurs de massifs, la touffe se développe par rhizome.	
Forsythia ou mimosa de Paris <i>(Forsythia x intermedia)</i>	Buisson	Arbuste touffu, taillé annuellement, fleurs jaunes au printemps.	
Frêne à fleurs <i>(Fraxinus ornus)</i>	Arbre	Frêne commun ou grand frêne	




Nom	Type	Description	Image
Frêne oxyphylle (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Arbre	Petit frêne méditerranéen.	
Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant fastigié. Fleurs jaune d'or au printemps.	
Gingembre parfumé (<i>Hedychium gardnerianum</i>)	Intérieur	"Plante que l'on trouve dans les régions tropicales, de la Martinique à Hawaii en passant par la Réunion. Dans ces îles, elle est l'espèce introduite la plus naturalisée, au point qu'elle en devient envahissante en certains endroits.	




Nom	Type	Description	Image
Gueule de loup (<i>Antirrhinum majus 'Wedding Bells'</i>)	Fleur	Mufler à fleurs jaunes.	
Hamamélis (<i>Hamamelis mollis</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à floraison hivernale, limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Hélianthème faux alysse (<i>Helianthemum nummularium</i>)	Herbe	Buisson à port étalé et feuillage persistant gris. Porte, en été, une succession de fleurs jaunes en forme de coupe.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-a (<i>Herba indeterminata-a</i>)	Herbe	Herbe, touffe de graminées à grandes feuilles.	
Herbe-b (<i>Herba indeterminata-b</i>)	Herbe	Herbe, touffe de graminées à feuilles courtes.	
Herbe-c (<i>Herba indeterminata-c</i>)	Herbe	Herbe, graminées à feuillage dense, alignées en bande.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	Herbe	Graminée à épis.	
Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à feuilles caduques, taillé, à inflorescences en dôme, blanches, rosées, pourpre ou bleues. On trouve des hortensias très couramment dans des jardins partout dans le monde, mais ils sont originaires de Chine.	
Hortensia grim pant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	Grimpant	Originaires de l'île russe Sakhaline, de Corée et du Japon. Plante grimpante qui s'accroche toute seule et parvient à couvrir des surfaces importantes. Feuilles caduques, fleurs blanches en été, plante palissée sur une colonne.	




Nom	Type	Description	Image
Houx (<i>Ilex aquifolia</i>)	Arbre	Arbre ou arbuste à feuillage persistant, vert foncé, très ramifié et dressé.	
Immortelle de Virginie (<i>Anaphalis margaritacea</i>)	Fleur	Immortelle à fleurs blanches (toujours fleurie).	
Iris hollandais (<i>Iris lusitanica x tingitana</i>)	Fleur	Iris bulbeux à floraison bleue.	




Nom	Type	Description	Image
Jasmin d'hiver (<i>Jasminum nudiflorum</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à branches arquées, feuillage caduc vert sombre, fleurs jaune vif en fin d'hiver ou début de printemps, sur des pousses vertes.	
Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	Fleur	Jonquille, plante bulbeuse à floraison printanière.	
Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	Herbe	Lamier argenté, plante tapissante à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Laurier cerise <i>(Prunus laurocerasus)</i>	Arbuste	Laurier cerise, arbuste à abondante floraison printanière blanche, feuilles persistantes.	
Laurier du Portugal ou laurier palme <i>(Prunus lusitanica)</i>	Buisson	Arbuste dense, buissonnant à port étalé, fleurs blanches au début de l'été suivies de fruits rouges.	
Laurier rose <i>(Nerium oleander)</i>	Buisson	Buisson fleuri limité en hauteur comme par une taille de conduite.	




Nom	Type	Description	Image
Laurier-tin (<i>Viburnum tinus</i>)	Arbuste	Arbuste dense, touffu et à feuillage persistant, vert sombre. En fin d'hiver et au printemps, il produit d'abondantes cymes terminales de petites fleurs blanches issues de boutons roses, un floraison automnale est parfois possible.	
Lavande (<i>Lavandula angustifolia</i>)	Fleur	Lavande, sous-arbrisseau à floraison estivale.	
Lierre rampant-a (<i>Hedera helix</i> 'Glacier')	Herbe	Plante couvre-sol retombante.	




Nom	Type	Description	Image
Lilas commun <i>(Syringa vulgaris)</i>	Arbuste	Arbuste ou petit arbre à feuilles ovales, au début de l'été panicules de fleurs blanches à violette.	
Lilas des Indes <i>(Melia azedarach)</i>	Arbre	Arbre à feuillage caduc, à port étalé. Feuilles vert foncé, au printemps, fleurs roses lilas, en étoile, suivies en automne par des fruits jaune orange pale.	
Lin de Narbonne <i>(Linum narbonense)</i>	Fleur	Plante semi-persistante formant des touffes, feuilles vert grisâtre, abondante floraison estivale bleu foncé.	




Nom	Type	Description	Image
Lin textile <i>(Linum usitatissimum)</i>	Fleur		
Lys blanc <i>(Lilium candidum)</i>	Fleur	Lys à grandes fleurs blanches retombantes.	
Lys carnaval <i>(Lilium bulbiferum)</i>	Fleur	Lys carnaval, lys à floraison dressée très colorée.	




Nom	Type	Description	Image
Mahonia-c (<i>Mahonia x media</i> 'Charity')	Buisson	Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Mahonia-m (<i>Mahonia aquifolium</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à feuillage persistant, feuilles rouges et baies bleues noires en hiver.	
Maïs cultivé (<i>Zea mays</i>)	Herbe		




Nom	Type	Description	Image
Marronnier-a (<i>Aesculus x hippocastaneum-a</i>)	Arbre	Arbre jeune isolé au stade adulte sans taille souvent nécessite d'être taillé (voir marronnier b ou marronnier d).	
Marronnier-b (<i>Aesculus x hippocastaneum-b</i>)	Arbre	Plante simulant une taille périodique du Marronnier-a souvent présent en ville le long des avenues.	
Marronnier-c (<i>Aesculus x hippocastaneum-c</i>)	Arbre	marronnier rouge simulant une taille périodique	




Nom	Type	Description	Image
Marronnier-d (<i>Aesculus x hippocastaneum-d</i>)	Arbre	Grand arbre isolé simulant une taille périodique du Marronnier-a souvent trouvé en milieu urbain dans les parcs et jardins.	
Mélèze d'Europe (<i>Larix decidua</i>)	Arbre	Conifère à feuillage caduc et à croissance rapide, port conique à l'état jeune, s'élargissant ensuite.	
Micocoulier (<i>Celtis australis</i>)	Arbre	Arbre méditerranéen à croissance lente.	




Nom	Type	Description	Image
Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	Fleur		
Mûrier à papier (<i>Broussonetia papyrifera</i>)	Arbuste	Arbre d'ornement à feuille caduc. Fleurit au printemps.	
Myoporum (<i>Myoporum laetum</i>)	Arbre	Originaire de Nouvelle Zélande, arbre persistant de 3 à 9 m de haut, il est intéressant pour la constitution de haie par sa croissance très rapide et son feuillage dense.	




Nom	Type	Description	Image
Narthecium (<i>Narthecium sp.</i>)	Fleur	Touffe de narthecium.	
Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	Herbe	Nepeta, plante tapissante à floraison bleue.	
Nerprun (forme buisson) (<i>Rhamnus alaternus-a</i>)	Buisson	Buisson feuillu, fourni, en forme d'arche, avec d'étroites feuilles argentées et des baies orange soutenu (usage courant).	




Nom	Type	Description	Image
Nerprun (forme tige) <i>(Rhamnus alaternus-b)</i>	Arbuste	Arbrisseau caractéristique des garrigues méditerranéennes, Ses minuscules fleurs jaunâtres apparaissent au mois de mars, parfois avant. Ses fruits sont des baies noires.	
Noisetier de Turquie <i>(Corylus colurna)</i>	Arbre	Arbre conique à feuilles caduques ovales.	
Noyer commun <i>(Juglans regia)</i>	Arbre	Le noyer, est également appelé noyer commun ou noyer royal, en référence à son nom scientifique. C'est un arbre de grande taille à feuillage caduc, originaire d'Europe de l'Est, mais que l'on trouve poussant spontanément sur les contreforts de l'Himalaya, ou encore en Chine et en Iran. En Europe, cet arbre est cultivé depuis longtemps pour son bois et ses fruits.	




Nom	Type	Description	Image
Olivier (Européen) <i>(Olea europaea)</i>	Arbre	Arbre fruitier méditerranéen simulant un vieille Olivier. Un olivier peu vivre très vieux, les unités d'âge sont donc des unités de dimensions et ne correspondent pas à l'âge physiologique réel.	
Olivier de Bohême, chalef <i>(Elaeagnus angustifolia)</i>	Arbre	C'est un arbuste souvent planté dans les jardins en Provence. Originaire d'Asie l'olivier de bohême est un grand arbrisseau à feuillage caduc qui peut atteindre 7 à 8 mètres. Arbuste touffu ou petit arbre étalé. Feuilles caduques étroites, gris argenté.	
Palette de peintre <i>(Caladium bicolor)</i>	Intérieur	Plante commune vivace à tubercule. Feuilles sagittées. Feuillage aux couleurs brillantes. Apprécie une atmosphère chaude et humide.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier (Phœnix) <i>(Phoenix sp.)</i>	Palmier	Palmier phœnix méditerranéen.	
Palmier Arenga <i>(Arenga pinnata)</i>	Palmier	Palmier à port unique de Malaisie.	
Palmier chamaerops <i>(Chamaerops sp.)</i>	Palmier	Arbre isolé.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier d'intérieur-b <i>(Phoenix humilis)</i>	Intérieur	Originaire d'Asie, très répandu au Viêt-Nam et le long des rives du fleuve Mékong au Laos, ce palmier ne dépasse pas 2 mètres de haut.	
Palmier de Guadeloupe <i>(Brahea edulis)</i>	Palmier	Originaire de la Guadeloupe. Atteint 10 m de haut. Grandes feuilles palmées vertes en éventail. Fruits jaunes ovoïdes.	
Palmier de Washington <i>(Washingtonia filifera)</i>	Palmier	Palmier à grandes feuilles palmées dont les extrémités des lobes forment des fils. Port érigé et stipe unique.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier du Mexique <i>(Washingtonia robusta)</i>	Palmier		
Palmier méditerranéen <i>(Chamaerops humilis)</i>	Palmier	<p>Le Chamaerops humilis est aujourd'hui l'un des palmiers les plus cultivés en Europe du Sud. Il résiste au froid et à la sécheresse. Plante ornementale très utilisée dans les parcs et jardins.</p>	
Pâturin <i>(Deschampsia caespitosa)</i>	Herbe	<p>Pâturin, touffe de graminées décoratives.</p>	




Nom	Type	Description	Image
Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	Fleur	Pavot de Californie à floraison orange vif.	
Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	Fleur		
Pervenche (<i>Vinca major</i>)	Herbe	Plante tapissante à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	Fleur	Massifs, bordures mixtes ou jardinières.	
Peuplier blanc (<i>Populus alba</i>)	Arbre	Usage : Parcs ou jardins.	
Peuplier d'Italie (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	Arbre	Arbre isolé ou d'alignement.	




Nom	Type	Description	Image
Peuplier de Chine, peuplier du Yunnan (<i>Populus yunnanensis</i>)	Arbre	Arbre érigé ou semi-étalé à branches souples. Feuillage lâche et clair devenant jaune à l'automne.	
Peuplier noir (<i>Populus nigra</i>)	Arbre	Plantations forestières, aires de repos.	
Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i>)	Arbre	Parcs ou jardins.	




Nom	Type	Description	Image
Pin d'Alep (<i>Pinus halepensis</i>)	Arbre	Conifère conique, à cime s'élargissant, avec des aiguilles vert parfois gris vert.	
Pin de l'Himalaya (<i>Pinus wallichiana</i>)	Arbre	Originaire de la région de l'Himalaya , il pousse en haute altitude (1800-4300 m) rarement en dessous de 1200 m , il pousse dans des climats tempérés avec des hivers secs et des étés humides. Il est aussi utilisé en zones méditerranéennes pour sa rusticité.	
Pin laricio (<i>Pinus nigra sp. laricio</i>)	Arbre	Originaire de Corse. Arbre parfaitement droit qui peut atteindre 40 m de haut et vieillir jusqu'à 600 ans.	




Nom	Type	Description	Image
Pin noir d'Autriche <i>(Pinus nigra)</i>	Arbre	Parcs ou plantations.	
Pin parasol, pin pignon <i>(Pinus pinea)</i>	Arbre	Conifère à cime arrondie, en parasol, tronc apparemment court.	
Platane taillé <i>(Platanus x acerifolia-c)</i>	Arbre	Arbre isolé taillé en gobelet, sur les places ou esplanades.	




Nom	Type	Description	Image
Platane taillé (grand) (<i>Platanus x acerifolia-d</i>)	Arbre	Grand platane taillé.	
Platane-a (<i>Platanus x acerifolia-a</i>)	Arbre	Usage : Arbre isolé ou d'alignement.	
Polygonum rouge (<i>Polygonum affine 'Darjeeling red'</i>)	Herbe	Polygonum rouge, plante tapissante à feuilles caduques.	




Nom	Type	Description	Image
Prunier (ou pêcher) décoratif (<i>Prunus x persica</i>)	Arbre	Prunier décoratif, arbre d'ornement.	
Prunier décoratif-w (<i>Prunus x padus</i>)	Arbre	Arbre d'ornement non taillé.	
Rince bouteille pleureur (<i>Callistemon viminalis</i>)	Arbre	Arbuste persistant à feuilles alternes, simples, entières et lancéolées. Ses fleurs forment des épis terminaux en forme de goupillon jusqu'à 12 cm de long. Il est originaire d'Australie, mais se cultive très bien.	



Nom	Type	Description	Image
Riz (<i>Oryza sativa</i>)	Herbe		
Romarin commun (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant, dense et touffu, à feuilles persistantes étroites. Petites fleurs, de bleu violacé à bleu, de la mi-printemps au début de l'été, et parfois en automne.	
Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	Buisson	Rosier ancien, buisson arbustif à floraison remontante blanche. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	

Nom	Type	Description	Image
Rosier grimpant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	Grimpant	Rosier grimpant, feuilles caduques, bouquet de fleurs rose pale.	
Sarcococca (<i>Sarcococca humilis</i>)	Buisson	Arbuste drageonnant à feuillage persistant, buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii 'Gaiety'</i>)	Herbe	Plante couvre-sol à feuillage compact.	




Nom	Type	Description	Image
Séquoia côtier (<i>Sequoia sempervirens</i>)	Arbre	Originaire de Californie, c'est un des arbres les plus grands du monde pouvant vivre jusqu'à 2000 ans : le plus haut spécimen mesure 112 mètres Le bois, d'excellente qualité, dépourvu de canaux résinifères, est imputrescible. Il résiste bien aux insectes et aux incendies. Il est utilisé en menuiserie.	
Skimmia (<i>Skimmia japonica</i> var.)	Buisson	Buisson à port compact étalé, feuillage persistant, buisson limité comme par une taille de conduite.	
Souchet géant (<i>Cyperus immensus</i>)	Herbe	Plante de marécage qui a besoin d'un sol humide à mouillé. Originaire de l'Afrique de l'Est, également connu sous le nom de plante ombrelle.	




Nom	Type	Description	Image
Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	Buisson	Arbuste à pousses minces et arquées, feuilles caduques. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana alata</i> 'Domino')	Fleur	Tabac ornemental à floraison blanche.	
Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana alata</i> 'Sensation')	Fleur	Tabac ornemental à floraison rouge.	




Nom	Type	Description	Image
Tiareelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	Herbe	Tiarelle vigoureuse, plante vivace à feuilles persistantes.	
Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	Fleur	Plante annuelle.	
Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa 'x Darwin'</i>)	Fleur	Plante bulbeuse à fleurs. Grandes fleurs simples, à fort pédoncule éclochant de la mi printemps à la fin de cette saison.	




Nom	Type	Description	Image
Valériane glauque (<i>Centranthus ruber</i> ' <i>Coccineus</i> ')	Fleur	Valériane à floraison rose.	
Vigne vraie (<i>Vitis vinifera</i>)	Arbuste	Plante sarmenteuse, taillée en gobelet pour la récolte du raisin. Le feuillage caduque est vert devenant jaune à pourpre en automne.	




Base Amérique du nord




Nom	Type	Description	Image
Abricotier japonais <i>(Prunus mume)</i>	Arbre	Petit arbre dressé à fleurs roses en début de printemps	
Acacia blanc <i>(Robinia pseudoacacia-r)</i>	Arbre	Arbre à croissance rapide, couronne ouverte, irrégulière.	
Acacia parasol <i>(Robinia pseudoacacia-t)</i>	Arbre	Parcs ou jardins.	




Nom	Type	Description	Image
Alchémille (<i>Alchemilla mollis</i>)	Herbe	Alchémille, plante de rocaille, couvre-sol à feuilles persistantes.	
Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	Intérieur	Plante herbacée vivace originaire de Malaisie utilisée en ornement. Le gingembre rouge est cultivé en Asie pour ses fleurs qui durent très longtemps.	
Amélanchier-a (<i>Amelanchier sp.</i>)	Arbuste	Cette espèce présente de nombreux intérêts ornementaux. Il s'agit d'un arbuste caduc, vigoureux (jusqu'à 4-5 m de hauteur) épargné par la plupart des parasites et relativement rustique vis à vis des conditions culturelles	




Nom	Type	Description	Image
Amélanchier-l (<i>Amelanchier laevis</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à floraison blanche en grappes au printemps, petits fruits bruns en été.	
Ananas (<i>Anans commosus</i> var. 'Cayenne')	Indéterminé	Fruit tropical	
Anthurium (<i>Anthurium andreanum</i>)	Intérieur	Poussent dans les forêts tropicales humides de montagne de l'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les fleurs sont petites (environ 3 mm) et se développent entassés dans un pic sur un axe charnu et nommé "spadix", une caractéristique des arums. Le spadix peut prendre différentes couleurs (blanc, vert, violet, rouge, rose, ou une combinaison). Le spadix fait partie d'une inflorescence. Certaines personnes aiment à appeler la partie extérieure de l'inflorescence une "fleur", mais c'est simplement une modification de la feuille. Elles peut être une seule couleur (jaune, vert ou blanc) ou, éventuellement, y compris multicolores bordeaux et rouge.	




Nom	Type	Description	Image
Arbousier d'Amérique (<i>Arbutus menziesii</i>)	Arbre	Originaire de l'ouest des Etats Unis, le fruit comestible est appelé arbose. Cet arbre est aussi utilisé pour son aspect ornemental.	
Ardisia de Chine (<i>Ardisia crenata</i>)	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultive pour son feuillage et ses fruits.	
Ardisia du Japon (<i>Ardisia japonica</i>)	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultive pour son feuillage et ses fruits.	




Nom	Type	Description	Image
Aubépine ergot de coq <i>(Crataegus crus-galli)</i>	Arbuste	Cenelle ergot de coq à floraison blanche.	
Bambou nain <i>(Arundinaria sp.)</i>	Intérieur	Petit bambou, plante d'intérieur.	
Bambou pubescent <i>(Phyllostachis edulis</i> <i>'Heterocycla' (syn</i> <i>'Pubescens'))</i>	Indéterminé	Grand bambou cultivé pour son aspect décoratif et ses pousses comestibles.	




Nom	Type	Description	Image
Bananier commun (<i>Musa domestica</i>)	Indéterminé	Bananier commun, grandes feuilles vert pale, inflorescence pendante terminée par un groupe de fleurs mâles pourpres.	
Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	Intérieur	Plante à fleur originaire de l'Amérique tropicale et de certaines îles du Pacifique. De nombreuses espèces sont cultivées pour leur inflorescences de couleurs vives et voyantes.	
Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme. A planter en pot.	




Nom	Type	Description	Image
Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme à floraison blanchâtre.	
Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	Fleur	Aussi nommé "Bégonia à massifs".	
Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	Herbe		




Nom	Type	Description	Image
Bois à levier ou bois de fer (<i>Ostrya virginiana</i>)	Arbre	Parcs, bordures de clairière d'érablières.	
Bois blanc (forêt) (<i>Tilia americana-d</i>)	Arbre	Tilleul d'Amérique, simulé en forêts.	
Bois blanc (isolé) ou tilleul d'Amérique (<i>Tilia americana-c</i>)	Arbre	Tilleul d'Amérique, observé en isolé.	




Nom	Type	Description	Image
Bouleau à papier (isolé) <i>(Betula papyrifera)</i>	Arbre	Bouleau à canoë, en futaies aérées ou en bosquets.	
Bouleau jaune (isolé) <i>(Betula alleghaniensis)</i>	Arbre	Bouleau merisier, en futaies aérées ou en bosquets.	
Bruyère <i>(Erica carnea)</i>	Fleur	Bruyère d'hiver à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Bruyère 'Spring Cream' <i>(Calluna vulgaris 'Spring Cream')</i>	Fleur	Petite bruyère à floraison blanche.	
Buddleia à feuilles étroites <i>(Buddleja alternifolia)</i>	Buisson	Buddleia à feuilles alternes, arbustes décoratifs.	
Buis 'Green Mountain' <i>(Buxus x sheridan 'Green Mountain')</i>	Arbuste	Buisson taillé en cône.	




Nom	Type	Description	Image
Buisson taillé en 'coussin' <i>(Dumus indeterminatus)</i>	Buisson	Buisson taillé de forme hémisphérique.	
Callune fausse bruyère, brande <i>(Calluna vulgaris)</i>	Buisson	Sous-arbrisseau à feuilles persistantes. Donne de la mi-été à la fin de l'automne des grappes de fleurs.	
Caryer cordiforme <i>(Carya cordiformis)</i>	Arbre	Originnaire d'Amérique du Nord, cet arbre atteint de 15 à 30 m de hauteur, a une forme ronde ou ovoïde. Son écorce est appliquée et rugueuse de couleur grise. Ses feuilles sont généralement composée de 7 à 11 folioles dentées.	




Nom	Type	Description	Image
Cassie blanc (<i>Leucaena leucocephala</i>)	Arbuste	Originnaire du Mexique et du nord de l'Amérique Centrale, cette plante est maintenant largement naturalisée sous les tropiques. C'est un arbuste de 0,8 à 5 mètres.	
Catalpa commun (<i>Catalpa bignioïdes</i>)	Arbre	Arbre à port étalé, à grandes feuilles, floraison estivale en panicules de fleurs blanches, suivie de fruits en longues gousses pendantes.	
Céanothe 'Gloire de Versailles' (<i>Ceanothus 'Gloire de Versailles'</i>)	Buisson	Buisson à abondante floraison bleue estivale.	




Nom	Type	Description	Image
Cèdre de l'est, arbovitae ou thuya américain <i>(Thuja occidentalis)</i>	Arbre	Arbovitae (arbre de vie) grand conifère à feuilles en écailles.	
Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais <i>(Prunus serrulata lannesiana)</i>	Arbre	Arbre à port étalé, fleurs blanches ou roses de mi-à fin du printemps. Les feuilles caduques d'abord bronzées puis vert foncé, deviennent jaune brunâtre à l'automne.	
Chêne des marais <i>(Quercus palustris)</i>	Arbre	Chêne à épingles, grand arbre à cime compacte, conique ou pyramidale.	




Nom	Type	Description	Image
Chêne Rouvre (<i>Quercus petrae</i>)	Arbre		
Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	Intérieur	Plante vivace bulbeuse, cultivée pour son feuillage. Longues hampes florales portant de nombreuses fleurs blanches.	
Clématite (<i>Clematis jackmanii</i> 'Superba')	Grimpant	Plante grimpante à grandes fleurs pourpres violacées, et palissée sur une colonne.	




Nom	Type	Description	Image
Cléome 'Color Fountain' <i>(Cleome hassleriana 'Colour Fountain')</i>	Fleur	Floraison rose.	
Coleus (Coleus blumei 'sanguineum')	Intérieur	plante ornementale originaire d'Asie du sud-est (Indonésie, Java). Feuilles tricolores, opposées ovales, à dominante verte tachetée de rouge vin-ramboise et jaune.	
Coléus à feuilles larges (Coleus blumei 'Brightness')	Fleur	Plante au feuillage coloré et au revers duveteux. Feuilles dentées.	




Nom	Type	Description	Image
Copalme d'Amérique <i>(Liquidambar styraciflua)</i>	Arbre	Arbre à port conique ou étalé. Les feuilles caduques vert luisant virent à l'automne au pourpre rougeâtre.	
Coréopsis à verticilles <i>(Coreopsis verticillata)</i>	Fleur	Coréopsis à floraison jaune.	
Cormier ou maskouabina <i>(Sorbus americana)</i>	Arbre	Sorbier d'Amérique (maska), arbuste de zones humides et des forêts de sapins.	




Nom	Type	Description	Image
Cosmos 'Sensation' <i>(Cosmos 'Sensation')</i>	Fleur	Floraison rose violacé.	
Cyprès de Lawson-a <i>(Chamaecyparis lawsonii-a)</i>	Arbre	Conifère dressé à rameaux plagiotropes et ramilles orthotropes.	
Cyprès de Lawson-b <i>(Chamaecyparis lawsonii-b)</i>	Arbre	Conifère à branches plagiotropes et rameaux orthotropes.	




Nom	Type	Description	Image
Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	Intérieur	A planter en bacs.	
Épinette blanche (<i>Picea glauca</i>)	Arbre	Épinette du Canada, épicéa vert argenté.	
Érable à sucre (forêt) (<i>Acer saccharum-c</i>)	Arbre	Érable franc, croissance en conditions forestières.	




Nom	Type	Description	Image
Erable à sucre (isolé) <i>(Acer saccharum-a)</i>	Arbre	Erable franc, en croissance isolée.	
Erable argenté (forêt) <i>(Acer saccharinum-d)</i>	Arbre	Plaine de France, croissance en conditions forestières.	
Erable argenté (isolé) <i>(Acer saccharinum-b)</i>	Arbre	Plaine de France, en croissance isolée.	




Nom	Type	Description	Image
Erable champêtre (forme arbre) <i>(Acer campestre)</i>	Arbre	Arbre de couleur vert à croissance rapide souvent utilisé en coupe-vent.	
Erable champêtre forme taillis <i>(Acer campestre forme taillis)</i>	Arbre	C'est un arbre pouvant atteindre une vingtaine de mètres, à écorce grise, fissurée, à petites feuilles caduques, utilisé dans les parcs et les jardins , le bois en menuiserie est connu pour sa résistance aux insectes	
Erable glabre <i>(Acer glabrum)</i>	Arbre	Petit arbre de forme arbustive. Jeunes rameaux érigés d'un rouge écarlate attractif. Branches assez denses. Coloration jaune clair en automne.	




Nom	Type	Description	Image
Erable negundo ou à feuilles de frêne (<i>Acer negundo</i>)	Arbre	Isolé ou parcs.	
Erable rouge (<i>Acer rubrum</i>)	Arbre	Isolé, bosquets, ombrage des maisons et jardins.	
Févier d'Amérique (<i>Gleditsia triacanthos inermis 'Skyline'</i>)	Arbre	Inerme doré.	




Nom	Type	Description	Image
Févier d'Amérique ou carouge à miel <i>(Gleditsia triacanthos inermis 'Sunburst')</i>	Arbre	Inerme doré.	
Ficus benjamina <i>(Ficus benjamina)</i>	Intérieur	Arbuste ornemental à port pleureur, feuilles ovales persistantes.	
Fleurs à massifs <i>(Flos indeterminatus)</i>	Fleur	Fleurs de massifs, la touffe se développe par rhizome.	




Nom	Type	Description	Image
Fothergille (<i>Fothergilla major</i>)	Buisson	Buisson à floraison blanche.	
Frêne blanc (<i>Fraxinus americana</i>)	Arbre	Frêne franc d'Amérique, en futaies aérées ou en bosquets.	
Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant fastigié. Fleurs jaune d'or au printemps.	




Nom	Type	Description	Image
Gingembre parfumé <i>(Hedychium gardnerianum)</i>	Intérieur	"Plante que l'on trouve dans les régions tropicales, de la Martinique à Hawaii en passant par la Réunion. Dans ces îles, elle est l'espèce introduite la plus naturalisée, au point qu'elle en devient envahissante en certains endroits.	
Gueule de loup <i>(Antirrhinum majus 'Wedding Bells')</i>	Fleur	Muflier à fleurs jaunes.	
Hélianthème faux alysse <i>(Helianthemum nummularium)</i>	Herbe	Buisson à port étalé et feuillage persistant gris. Porte, en été, une succession de fleurs jaunes en forme de coupe.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-a (<i>Herba indeterminata-a</i>)	Herbe	Herbe, touffe de graminées à grandes feuilles.	
Herbe-b (<i>Herba indeterminata-b</i>)	Herbe	Herbe, touffe de graminées à feuilles courtes.	
Herbe-c (<i>Herba indeterminata-c</i>)	Herbe	Herbe, graminées à feuillage dense, alignées en bande.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	Herbe	Graminée à épis.	
Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à feuilles caduques, taillé, à inflorescences en dôme, blanches, rosées, pourpre ou bleues. On trouve des hortensias très couramment dans des jardins partout dans le monde, mais ils sont originaires de Chine.	
Hortensia grim pant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	Grimpant	Originaires de l'île russe Sakhaline, de Corée et du Japon. Plante grimpante qui s'accroche toute seule et parvient à couvrir des surfaces importantes. Feuilles caduques, fleurs blanches en été, plante palissée sur une colonne.	




Nom	Type	Description	Image
Immortelle de Virginie <i>(Anaphalis margaritacea)</i>	Fleur	Immortelle à fleurs blanches (toujours fleurie).	
Iris hollandais <i>(Iris lusitanica x tingitana)</i>	Fleur	Iris bulbeux à floraison bleue.	
Jasmin d'hiver <i>(Jasminum nudiflorum)</i>	Buisson	Arbuste buissonnant à branches arquées, feuillage caduc vert sombre, fleurs jaune vif en fin d'hiver ou début de printemps, sur des pousses vertes.	




Nom	Type	Description	Image
Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	Fleur	Jonquille, plante bulbeuse à floraison printanière.	 A 3D digital rendering of several yellow jonquils (Narcissus jonquilla) with green leaves and bright yellow flowers, set against a plain white background.
Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	Herbe	Lamier argenté, plante tapissante à feuilles persistantes.	 A 3D digital rendering of a purple-flowered lamium (Lamium maculatum) with green leaves and small purple flowers, set against a plain white background.
Laurier des montagnes (<i>Kalmia latifolia</i>)	Buisson	Laurier rose américain, buisson d'altitude à floraison rose.	 A 3D digital rendering of a pink-flowered laurel (Kalmia latifolia) bush with green leaves and small pink flowers, set against a plain white background.




Nom	Type	Description	Image
Liane à lait (<i>Allamanda cathartica</i>)	Buisson		
Liard ou cotonnier (<i>Populus deltoides</i>)	Arbre	Liard (cotonnier), gros peuplier des berges de rivière et des plaines alluviales.	
Lierre rampant-a (<i>Hedera helix</i> 'Glacier')	Herbe	Plante couvre-sol retombante.	




Nom	Type	Description	Image
Lys blanc (<i>Lilium candidum</i>)	Fleur	Lys à grandes fleurs blanches retombantes.	
Lys carnaval (<i>Lilium bulbiferum</i>)	Fleur	Lys carnaval, lys à floraison dressée très colorée.	
Magnolia yulan (<i>Magnolia heptapeta</i> (syn. <i>denudata</i>))	Arbre	Arbre Japonais à port étalé, feuillage caduc, porte au printemps de nombreuses fleurs blanches.	




Nom	Type	Description	Image
Mahonia-m (<i>Mahonia aquifolium</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à feuillage persistant, feuilles rouges et baies bleues noires en hiver.	
Maïs cultivé (<i>Zea mays</i>)	Herbe		
Mélèze laricin ou d'Amérique (<i>Larix laricina</i>)	Arbre	Epinette rouge (violon), conifère à aiguilles caduques.	




Nom	Type	Description	Image
Merisier (<i>Prunus avium</i>)	Arbre	Merisier	
Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	Fleur		
Narthecium (<i>Narthecium sp.</i>)	Fleur	Touffe de narthecium.	




Nom	Type	Description	Image
Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	Herbe	Nepeta, plante tapissante à floraison bleue.	
Noyer commun (<i>Juglans regia</i>)	Arbre	Le noyer, est également appelé noyer commun ou noyer royal, en référence à son nom scientifique. C'est un arbre de grande taille à feuillage caduc, originaire d'Europe de l'Est, mais que l'on trouve poussant spontanément sur les contreforts de l'Himalaya, ou encore en Chine et en Iran. En Europe, cet arbre est cultivé depuis longtemps pour son bois et ses fruits.	
Noyer noir (<i>Juglans nigra</i>)	Arbre	Egalement appelé Noyer noir. Le plus caractéristique des arbres du Midwest américain. Arbre élevé avec un large couvert.	




Nom	Type	Description	Image
Noyer tendre (<i>Juglans cinerea</i>)	Arbre	Noyer à beurre en futaies.	
Palette de peintre (<i>Caladium bicolor</i>)	Intérieur	Plante commune vivace à tubercule. Feuilles sagittées. Feuillage aux couleurs brillantes. Apprécie une atmosphère chaude et humide.	
Palétuvier rouge (<i>Rhizophora mangle</i>)	Arbre	Cet arbre de 5 à 20 m constitue l'espèce pionnière de la mangrove. Elle se rencontre dans les zones inondées. Ses branches et tronc émettent de très nombreuses racines aériennes (racines-échasses) qui s'enfoncent dans la vase ce qui assure la stabilité de l'arbre. Les feuilles sont simples, épaisses et opposées. Les fleurs sont petites à calice jaune et pétales épais jaunâtres. Le fruit pend, la graine germe sur l'arbre même en émettant une longue radicule pointue.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier "bouteille" <i>(Hyophorbe lagenicaulis)</i>	Palmier	Palmier originaire des îles Mascareignes (océan Indien.	
Palmier Arenga <i>(Arenga pinnata)</i>	Palmier	Palmier à port unique de Malaisie.	
Palmier d'intérieur-b <i>(Phoenix humilis)</i>	Intérieur	Originaire d'Asie, très répandu au Viêt-Nam et le long des rives du fleuve Mékong au Laos, ce palmier ne dépasse pas 2 mètres de haut.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier de Guadeloupe (<i>Brahea edulis</i>)	Palmier	Originaire de la Guadeloupe. Atteint 10 m de haut. Grandes feuilles palmées vertes en éventail. Fruits jaunes ovoïdes.	
Palmier de Washington (<i>Washingtonia filifera</i>)	Palmier	Palmier à grandes feuilles palmées dont les extrémités des lobes forment des fils. Port érigé et stipe unique.	
Palmier du Mexique (<i>Washingtonia robusta</i>)	Palmier		




Nom	Type	Description	Image
Palmier royal de Cuba (<i>Roystonea regia</i>)	Palmier	Palmier à stipe unique originaire des Caraïbes.	
Pâturin (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	Herbe	Pâturin, touffe de graminées décoratives.	
Pavot d'Islande (<i>Papaver nudicaule</i>)	Fleur	Pavot vivace à floraison variée.	




Nom	Type	Description	Image
Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	Fleur	Pavot de Californie à floraison orange vif.	
Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	Fleur		
Pervenche (<i>Vinca major</i>)	Herbe	Plante tapissante à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	Fleur	Massifs, bordures mixtes ou jardinières.	
Peuplier hybride du Canada (<i>Populus deltoides x nigra</i>)	Arbre	Arbre à feuille caduc du Canada.	
Pin argenté (<i>Pinus monticola</i>)	Arbre	Originaire des montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord, en particulier dans les Montagnes Rocheuses, la chaîne des Cascades, la Sierra Nevada et les Chaînes côtières, il a une croissance régulière jusqu'à 30 à 50 m et peut atteindre exceptionnellement 70 m.	




Nom	Type	Description	Image
Pin blanc ou pin du Lord <i>(Pinus strobus)</i>	Arbre	Grand pin de plaine et basse montagne.	
Pin gris <i>(Pinus banksiana)</i>	Arbre	On le trouve dans la forêt boréale en Amérique du Nord à l'est des Montagnes rocheuses ce n'est pas un très grand pin il atteint la taille de 9 à 12 m.	
Pin jaune des Montagnes Rocheuses <i>(Pinus ponderosa)</i>	Arbre	Originnaire de l'ouest de l'Amérique, il peut atteindre une taille de 40 à 50 m. C'est la variété de pin la plus répandue dans l'ouest des Etats Unis	




Nom	Type	Description	Image
Pin rouge (<i>Pinus resinosa</i>)	Arbre	Originare du nord-est de l'Amérique du Nord. Ce pin peut atteindre 20 à 35 m avec un tronc de 1 m de diamètre.	
Polygonum rouge (<i>Polygonum affine 'Darjeeling red'</i>)	Herbe	Polygonum rouge, plante tapissante à feuilles caduques.	
Pometier à petits fruits (<i>Malus baccata 'Columnaris'</i>)	Arbuste	Pometier à petits fruits, à port érigé.	




Nom	Type	Description	Image
Pometier Makamik <i>(Malus x 'Makamik')</i>	Arbuste	Isolé, squares ou alignements urbains.	
Pruche du Canada <i>(Tsuga canadensis)</i>	Arbre	Pruche (haricot), conifère de 20-25 mètres à flèche retombante. il est employé dans la grosse charpente, la construction des ponts et des pavages, dans la fabrication des caisses, des lattes et du bardeau. L'industrie de la tannerie utilise l'écorce de la pruche, qui est très riche en tannin.	
Prunier (ou pêcher) décoratif <i>(Prunus x persica)</i>	Arbre	Prunier décoratif, arbre d'ornement.	




Nom	Type	Description	Image
Riz (<i>Oryza sativa</i>)	Herbe		 A photograph of a rice paddy field. The foreground shows tall, green rice stalks growing in shallow water. The background is a flat landscape under a blue sky with some clouds.
Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	Buisson	Rosier ancien, buisson arbustif à floraison remontante blanche. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	 A 3D rendered model of a bushy rose. The plant has dense green foliage and numerous small, pale yellow flowers. It is shown from a slightly elevated perspective against a white background.
Rosier grimpant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	Grimpant	Rosier grimpant, feuilles caduques, bouquet de fleurs rose pale.	 A 3D rendered model of a climbing rose. The plant has a more open, bushy structure with green leaves and clusters of small, pale pink flowers. It is shown from a slightly elevated perspective against a white background.




Nom	Type	Description	Image
Sabal (<i>Sabal palmetto</i>)	Palmier	Largement répandu aux Bahamas, à l'ouest de Cuba et au sud-est des Etats Unis, son tronc mesure de 8 à 20 mètres de hauteur et jusqu'à 35cm de diamètre, de couleur grise. Les bases fendues des anciens pétioles persistent longtemps sur le stipe et forment un motif réticulé caractéristique du genre. Sa couronne est composée de 15 à 30 feuilles très costapalmées, de 1 à 1,5 m de large, de couleur verte. Il pousse dans les sols humides près de la mer, mais également dans les dunes, le long des rivières ainsi que dans les zones humides et inondées.	
Sapin baumier (<i>Abies balsamea</i>)	Arbre	Originaire d'Amérique du Nord , ce sapin peut atteindre 15 à 20 mètres de hauteur. Le bois est utilisé pour la fabrication du papier et du bois de charpente. Les sapins baumiers servent aussi d'arbres de Noël.	
Sapin bleu (<i>Picea pungens</i> ' <i>Glauca</i> ')	Arbre	Sapin bleu du Colorado, conifère à jeunes aiguilles bleues argentées.	




Nom	Type	Description	Image
Sapin de Douglas <i>(Pseudotsuga douglasii)</i>	Arbre	"sapin" de Douglas, conifère érigé nord américain.	
Sapin de Vancouver <i>(Abies grandis)</i>	Arbre		
Sapin du Colorado <i>(Abies concolor)</i>	Arbre	Le sapin du Colorado est un conifère qui peut atteindre 55 m. L'écorce des jeunes troncs est lisse, grisâtre, à vésicules de résine ; elle devient épaisse, dure et crevassée avec des sillons en vieillissant.	



Nom	Type	Description	Image
Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii 'Gaiety'</i>)	Herbe	Plante couvre-sol à feuillage compact.	
Séquoia côtier (<i>Sequoia sempervirens</i>)	Arbre	Originaire de Californie, c'est un des arbres les plus grands du monde pouvant vivre jusqu'à 2000 ans : le plus haut spécimen mesure 112 mètres Le bois, d'excellente qualité, dépourvu de canaux résinifères, est imputrescible. Il résiste bien aux insectes et aux incendies. Il est utilisé en menuiserie.	
Skimmia (<i>Skimmia japonica var.</i>)	Buisson	Buisson à port compact étalé, feuillage persistant, buisson limité comme par une taille de conduite.	

Nom	Type	Description	Image
Sorbier des oiseaux, sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i>)	Arbre	Son aire de répartition naturelle couvre toute l'Europe et l'Asie tempérée. Répandu par la culture, il s'est naturalisé ailleurs, notamment en Amérique du Nord. Cet arbre, qui est le plus répandu des sorbiers, est souvent planté comme arbre d'alignement ou d'ornement dans les parcs et jardins. Arbre à feuillage caduc, port étalé. Feuilles à folioles vert moyen virant au rouge ou au jaune en automne. Fleurs printanières blanches, et fruits rouges à l'automne.	
Sorbier torminal, alisier (<i>Sorbus torminalis</i>)	Arbre	Arbre caduc.	
Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	Buisson	Arbuste à pousses minces et arquées, feuilles caduques. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	




Nom	Type	Description	Image
Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana glauca</i> 'Domino')	Fleur	Tabac ornemental à floraison blanche.	
Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana glauca</i> 'Sensation')	Fleur	Tabac ornemental à floraison rouge.	
Tabebuia, Tecoma rose (<i>Tabebuia rosea</i>)	Arbre	Originaire d'Amérique continentale, allant du sud du Mexique au Vénézuéla et à la partie côtière de l'Equateur, le tabebuia rosea est un grand arbre à feuillage caduc et à pousse rapide pouvant atteindre de 25 à 30 m de hauteur et 1 m de diamètre (tronc). La couronne est large, stratifiée et irrégulière, avec quelques branches horizontales épaisses. L'écorce est grise. Les feuilles sont composées de 5 lobes inégaux en taille, le lobe central étant le plus large.	




Nom	Type	Description	Image
Thuya géant (<i>Thuja plicata</i>)	Arbre	Cette espèce est originaire des régions occidentales d'Amérique du Nord, très cultivée comme arbre d'ornement, notamment dans les jardins sous forme de haies.	
Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	Herbe	Tiarella vigoureuse, plante vivace à feuilles persistantes.	
Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	Fleur	Plante annuelle.	




Nom	Type	Description	Image
Trèfle blanc (<i>Trifolium pratense</i>)	Fleur		
Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa 'x Darwin'</i>)	Fleur	Plante bulbeuse à fleurs. Grandes fleurs simples, à fort pédoncule éclochant de la mi printemps à la fin de cette saison.	
Tulipier (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	Arbre	Arbre vigoureux à feuilles caduques lobées, tronquées, vert foncé. En été, fleurs blanc verdâtre teinté d'orange.	




Nom	Type	Description	Image
Valériane glauque <i>(Centranthus ruber 'Coccineus')</i>	Fleur	Valériane à floraison rose.	
Vigne vraie <i>(Vitis vinifera)</i>	Arbuste	Plante sarmenteuse, taillée en gobelet pour la récolte du raisin. Le feuillage caduque est vert devenant jaune à pourpre en automne.	




Base Tropicque




Nom	Type	Description	Image
Acacia parasol de savane <i>(Acacia tortilis)</i>	Arbre	Une des espèces de futaie des déserts d'Arabie. De 4 à 15 m de haut, plusieurs troncs, réduit à un petit arbuste dans des conditions arides extrêmes.	
Acacia siffleur <i>(Acacia drepanolobium)</i>	Arbuste	Correspond à l'acacia siffleur que l'on trouve en Afrique. Arbrisseau vivace dont la croissance est favorisée dans des sols d'argile noire périodiquement humides.	
Albizia <i>(Albizia julibrissin)</i>	Arbre	Albizia, arbre de type albizia, méditerranéen ou tropical.	




Nom	Type	Description	Image
Albizia (Mimosa) de montagne <i>(Albizzia falcata)</i>	Arbre	Arbre d'Indonésie à croissance rapide. Un individu a poussé de 10,75 mètres en 13 mois.	
Albizia gommier <i>(Albizzia gummifera)</i>	Arbre	Arbre caduc qui préfère les lisières de forêts et les forêts-parcs des régions montagneuses de l'Afrique.	
Alchémille <i>(Alchemilla mollis)</i>	Herbe	Alchémille, plante de rocaille, couvre-sol à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	Intérieur	Plante herbacée vivace originaire de Malaisie utilisée en ornement. Le gingembre rouge est cultivé en Asie pour ses fleurs qui durent très longtemps.	
Ananas (<i>Anans commosus</i> var. 'Cayenne')	Indéterminé	Fruit tropical	
Anthurium (<i>Anthurium andreanum</i>)	Intérieur	Poussent dans les forêts tropicales humides de montagne de l'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les fleurs sont petites (environ 3 mm) et se développent entassés dans un pic sur un axe charnu et nommé "spadix", une caractéristique des arums. Le spadix peut prendre différentes couleurs (blanc, vert, violet, rouge, rose, ou une combinaison). Le spadix fait partie d'une inflorescence. Certaines personnes aiment à appeler la partie extérieure de l'inflorescence une "fleur", mais c'est simplement une modification de la feuille. Elles peut être une seule couleur (jaune, vert ou blanc) ou, éventuellement, y compris multicolores bordeaux et rouge.	




Nom	Type	Description	Image
Arbousier d'Amérique <i>(Arbutus menziesii)</i>	Arbre	Originaire de l'ouest des Etats Unis, le fruit comestible est appelé arbose. Cet arbre est aussi utilisé pour son aspect ornemental.	
Arbre à cochonnets - ATI, TAMANU <i>(Calophyllum inophyllum)</i>	Arbre	Arbre pan tropical que l'on trouve sur de nombreux rivages de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Biologiquement lié à la mer (il aime les terrains salés et sablonneux, meubles et frais). Il peut atteindre 20 à 30 m de haut et possède un tronc tortueux, couvert d'une écorce rugueuse et crevassée.	
Arbre à pluie, arbre de 5 heures - MARU MARU <i>(Samanea saman)</i>	Arbre	Natif de la région Tropicale d'Amérique, planté pour son ombrage et son bois, il est aussi présent dans les îles du Pacifique, c'est un arbre présentant une couronne large et régulière.	




Nom	Type	Description	Image
Arbre à saucisses <i>(Kigelia africana)</i>	Arbre	Arbre à croissance rapide, avec un couvert s'étalant largement, procurant ainsi beaucoup d'ombre. Des fleurs parmi les plus grandes de toutes les fleurs indigènes. Situé en Afrique, il peut atteindre 10 m de haut mais peut aussi avoir la taille d'un bonsaï.	
Arbre du voyageur (Palmier) <i>(Ravenala madagascarensis)</i>	Indéterminé	Originaire de Madagascar. appelé arbre du voyageur parce que l'eau de pluie qui glisse le long de la gaine des feuilles s'accumule à leur base et permet au voyageur de se désaltérer. Ses feuilles gigantesques forment un éventail et rappellent celles du bananier.	
Ardisia de Chine <i>(Ardisia crenata)</i>	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	




Nom	Type	Description	Image
Ardisia du Japon <i>(Ardisia japonica)</i>	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	
Aréquier <i>(Areca catechu)</i>	Palmier	Originaire de l'Inde et de Malaisie, l'aréquier pousse en climat tropical, il est vert dans sa partie jeune. Il peut atteindre 25 mètres de hauteur.	
Bambou nain <i>(Arundinaria sp.)</i>	Intérieur	Petit bambou, plante d'intérieur.	




Nom	Type	Description	Image
Bambou pubescent <i>(Phyllostachis edulis</i> <i>'Heterocykla' (syn</i> <i>'Pubescens'))</i>	Indéterminé	Grand bambou cultivé pour son aspect décoratif et ses pousses comestibles.	
Bambou Sasa panaché <i>(Sasa veitchii</i> <i>'Albomarginata')</i>	Indéterminé	Cette espèce de bambou est développée pour ses feuilles qui se défraîchissent aux marges du bord, de ce fait lui donnant un aspect très peu commun avec les feuilles vert foncé avec un bord blanc. Il est souvent employé comme couvre sols dans un secteur ombragé où ses couleurs sont les plus contrastées. Il supporte le plein soleil dans le nord-ouest Pacifique. Le veitchii de Sasa grandit de 3 à 5 pieds, mais il peut être maintenu plus court en le coupant à ras la terre après ses premiers croissances.	
Bananier commun <i>(Musa domestica)</i>	Indéterminé	Bananier commun, grandes feuilles vert pale, inflorescence pendante terminée par un groupe de fleurs mâles pourpres.	




Nom	Type	Description	Image
Bancoulier (<i>Aleurites moluccana</i>)	Arbre	arbre emblème de Hawaï, originaire de Polynésie, l' <i>Aleurites moluccana</i> est un arbre à feuillage pérenne qui peut atteindre 30 m de haut. L'écorce est vert-gris. Les feuilles ont des formes diverses allant de pointues et anguleuse ou lobées (érable) à ovale étroite (oeuf). Elles sont vert brillant.	
Bancoulier de plaine (<i>Aleurites moluccana - tree type</i>)	Arbre	Arbre originaire de Malaisie, Polynésie, Philippines et des Iles des Mers du Sud, désormais largement répandu dans les tropiques. Cet arbre pousse en forêt dense et humide jusqu'à 1 200 m d'altitude. Il est cultivé pour ses noix dont on extrait l'huile.	
Bec de perroquet (<i>Heliconia psittacorum</i>)	Intérieur	Plante à fleur originaire de l'Amérique tropicale et de certaines îles du Pacifique. De nombreuses espèces sont cultivées pour leur inflorescences de couleurs vives et voyantes.	




Nom	Type	Description	Image
Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme. A planter en pot.	
Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme à floraison blanchâtre.	
Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	Fleur	Aussi nommé "Bégonia à massifs".	




Nom	Type	Description	Image
Blé <i>(Triticum sp.-b)</i>	Herbe		
Bois à piquet <i>(Cassipourea malosana)</i>	Arbre	Arbre des montagnes élevées (1800-2700 m d'altitude) qui pousse en Afrique. Atteint 33 m de haut et pousse particulièrement droit.	
Bois de fer <i>(Casuarina collina)</i>	Arbre	Originaire de Nouvelle Calédonie, arbre à feuillage caduc nommé ""bois de fer"" en raison de son bois dur.	




Nom	Type	Description	Image
Bois-joli - TOU (<i>Cordia subcordata</i>)	Arbre	Espèce présente dans les régions indo-malaises, en Indonésie, dans le Pacifique et sur la côte est de l'Afrique tropicale. Arbre côtier au tronc court et trapu dont le bois très dur est utilisé en ébénisterie et dans l'artisanat. Autrefois, ses écorces, feuilles et fruits étaient employés dans la confection de nombreux médicaments.	
Brachychiton à feuille étroite (<i>Brachychiton acerifolius</i>)	Arbre	Arbre originaire d'Australie à feuillage caduc ou semi persistant, peut supporter de longues périodes de sécheresse. Cultivé, il mesure 10 à 15 m et jusqu'à 30 m et plus dans la nature. Il porte de larges feuilles brillantes composées de 3 à 7 lobes.	
Bruyère (<i>Erica carnea</i>)	Fleur	Bruyère d'hiver à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Buis 'Green Mountain' <i>(Buxus x sheridan 'Green Mountain')</i>	Arbuste	Buisson taillé en cône.	
Buisson taillé en 'coussin' <i>(Dumus indeterminatus)</i>	Buisson	Buisson taillé de forme hémisphérique.	
Cacaoyer <i>(Theobroma cacao)</i>	Arbre	<p>Le cacaoyer est un arbre tropical originaire d'Amérique du Sud. Il pousse naturellement dans le bassin de l'Orénoque et de l'Amazonie à basse altitude au pied de la cordillère des Andes sur des collines de basse altitude (entre 200 et 400 m). Ses fruits, les " cabosses ", sont de grosses baies allongées dont la pulpe contient de nombreuses graines (entre 25 et 75) appelées fèves de cacao, elles sont utilisées pour la fabrication du cacao et du chocolat.</p>	




Nom	Type	Description	Image
Caféier <i>(Coffea robusta)</i>	Arbuste	Le caféier robusta est originaire d'Afrique de l'Ouest. Le caféier robusta et les autres espèces, qui supportent mal les périodes de sécheresse, croissent mieux en basse altitude dans des régions chaudes et humides.	
Callistemon de montagne-POHUTU <i>(Metrosideros collina)</i>	Arbre	Plante originaire de Hawaii à feuillage persistant et floraison spectaculaire	
Cassie blanc <i>(Leucaena leucocephala)</i>	Arbuste	Originaire du Mexique et du nord de l'Amérique Centrale, cette plante est maintenant largement naturalisée sous les tropiques. C'est un arbuste de 0,8 à 5 mètres.	




Nom	Type	Description	Image
Catalpa commun <i>(Catalpa bignioïdes)</i>	Arbre	Arbre à port étalé, à grandes feuilles, floraison estivale en panicules de fleurs blanches, suivie de fruits en longues gousses pendantes.	
Chlorophytum du Cap <i>(Chlorophytum capense)</i>	Intérieur	Plante vivace bulbeuse, cultivée pour son feuillage. Longues hampes florales portant de nombreuses fleurs blanches.	
Citronnelle <i>(Cymbopogon citratus)</i>	Herbe	Plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques (à goût de citron).	




Nom	Type	Description	Image
Clématite (<i>Clematis jackmanii</i> 'Superba')	Grimpant	Plante grimpante à grandes fleurs pourpres violacées, et palissée sur une colonne.	
Clérodendron du Japon (<i>Clerodendrum trichotomum</i>)	Buisson	Buisson ou arbrisseau dressé, feuillage caduc, vert moyen, fleurs blanches et odorantes issues de boutons rose foncé, suivies de baies décoratives bleues de la fin d'été à la mi-automne.	
Cocotier (<i>Coco nucifera</i>)	Palmier	Jardins tropicaux, bord de plage.	




Nom	Type	Description	Image
Coleus <i>(Coleus blumei 'sanguineum')</i>	Intérieur	plante ornementale originaire d'Asie du sud-est (Indonésie, Java). Feuilles tricolores, opposées ovales, à dominante verte tachetée de rouge vin -framboise et jaune.	
Coléus à feuilles larges <i>(Coleus blumei 'Brightness')</i>	Fleur	Plante au feuillage coloré et au revers duveteux. Feuilles dentées.	
Coréopsis à verticilles <i>(Coreopsis verticillata)</i>	Fleur	Coréopsis à floraison jaune.	




Nom	Type	Description	Image
Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos 'Sensation'</i>)	Fleur	Floraison rose violacé.	
Dattier des Canaries (<i>Phoenix canarensis</i>)	Palmier		
Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	Intérieur	A planter en bacs.	




Nom	Type	Description	Image
Euphorbe bussei <i>(Euphorbia bussei)</i>	Arbre		
Euphorbe candelabre (arbre) <i>(Euphorbia candelabrum)</i>	Arbre		
Faux manguier à parfum, Arbre à reserpine, Arbre à quinine <i>(Rauvolfia caffra)</i>	Arbre	Arbre sempervirent élevé de l'Afrique du Sud. Fleurs parfumées. Croissance rapide.	




Nom	Type	Description	Image
Ficus à écorce jaune, ficus à feuilles de mûrier <i>(Ficus lutea)</i>	Arbre	Originaire de la forêt basse littorale à l'Est du Cap et au nord de l'Afrique tropicale, le Figuier pousse jusqu'à 15 m. De tous les figuiers indigènes, le <i>Ficus lutea</i> est celui qui a les plus grandes feuilles.	
Ficus benjamina <i>(Ficus benjamina)</i>	Intérieur	Arbuste ornemental à port pleureur, feuilles ovales persistantes.	
Ficus benjamina (forme tropicale haie libre) <i>(Ficus benjamina (trop.))</i>	Arbre	Ficus benjamina (forme tropicale haie libre)	




Nom	Type	Description	Image
Ficus sycomore <i>(Ficus sycomorus)</i>	Arbre	Apprécie les endroits humides comme les marais, les rivières et les cours d'eau, mais s'adapte aussi à la savane. Arbre à contrefort, qui porte de grands glomérules de succulentes et grosses figes.	
Figuier étrangleur, figuier à petits fruits <i>(Ficus thonningii)</i>	Arbre	Tout d'abord sous forme d'une petite liane sur de grands arbres, elle épaissit et laisse apparaître des branches avec des racines d'appui qui étranglent éventuellement l'arbre hôte.	
Filao <i>(Casuarina equisetifolia)</i>	Arbre		




Nom	Type	Description	Image
Fleurs à massifs <i>(Flos indeterminatus)</i>	Fleur	Fleurs de massifs, la touffe se développe par rhizome.	
Folle avoine rouge <i>(Themeda triandra)</i>	Herbe	La plus commune des herbes graminiformes de la savane africaine. Plante vivace touffetée. De 30 à 90 cm de haut. Feuilles duveteuses à lisses, bleues ou vertes.	
Fougère arborescente de plaine - NAHE <i>(Angiopteris evecta)</i>	Indéterminé	Native de la Polynésie, le rhizome forme un tronc massif et en quelque sorte sphérique pouvant atteindre jusqu'à 60-90 cm de haut et 45 cm de diamètre. Les tiges peuvent atteindre jusqu'à 2m.	




Nom	Type	Description	Image
Fromager <i>(Bombax ceiba)</i>	Arbre	Les fromagers sont de grands arbres pouvant atteindre une hauteur de 70 mètres, ce qui les fait émerger au dessus des forêts tropicales.	
Genêt purgatif <i>(Cytisus purgans)</i>	Buisson	Arbuste buissonnant fastigié. Fleurs jaune d'or au printemps.	
Gingembre jaune <i>(Hedychium flavescens)</i>	Indéterminé	Plante au parfum délicieux, très sucré, originaire de l'Inde Himalayenne, elle a maintenant colonisé diverses régions tropicales dont l'île de la Réunion où elle envahit les sous-bois humides et les ravines, et prenant la place des espèces indigènes.	




Nom	Type	Description	Image
Gingembre parfumé <i>(Hedychium gardnerianum)</i>	Intérieur	"Plante que l'on trouve dans les régions tropicales, de la Martinique à Hawaii en passant par la Réunion. Dans ces îles, elle est l'espèce introduite la plus naturalisée, au point qu'elle en devient envahissante en certains endroits.	
Gueule de loup <i>(Antirrhinum majus 'Wedding Bells')</i>	Fleur	Muflier à fleurs jaunes.	
Hélianthème faux alysse <i>(Helianthemum nummularium)</i>	Herbe	Buisson à port étalé et feuillage persistant gris. Porte, en été, une succession de fleurs jaunes en forme de coupe.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-a <i>(Herba indeterminata-a)</i>	Herbe	Herbe, touffe de graminées à grandes feuilles.	
Herbe-b <i>(Herba indeterminata-b)</i>	Herbe	Herbe, touffe de graminées à feuilles courtes.	
Herbe-c <i>(Herba indeterminata-c)</i>	Herbe	Herbe, graminées à feuillage dense, alignées en bande.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	Herbe	Graminée à épis.	
Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à feuilles caduques, taillé, à inflorescences en dôme, blanches, rosées, pourpre ou bleues. On trouve des hortensias très couramment dans des jardins partout dans le monde, mais ils sont originaires de Chine.	
Hortensia grim pant (<i>Hydrangea petiolaris</i>)	Grimpant	Originaires de l'île russe Sakhaline, de Corée et du Japon. Plante grimpante qui s'accroche toute seule et parvient à couvrir des surfaces importantes. Feuilles caduques, fleurs blanches en été, plante palissée sur une colonne.	




Nom	Type	Description	Image
Immortelle de Virginie <i>(Anaphalis margaritacea)</i>	Fleur	Immortelle à fleurs blanches (toujours fleurie).	
Iris hollandais <i>(Iris lusitanica x tingitana)</i>	Fleur	Iris bulbeux à floraison bleue.	
Ixora, Arbuste corail <i>(Ixora coccinea)</i>	Buisson	Arbrisseau touffu qui produit des fleurs jaune, rose, orange ou rouge. Fleur nationale du Suriname.	




Nom	Type	Description	Image
Jasmin d'hiver <i>(Jasminum nudiflorum)</i>	Buisson	Arbuste buissonnant à branches arquées, feuillage caduc vert sombre, fleurs jaune vif en fin d'hiver ou début de printemps, sur des pousses vertes.	
Jonquille <i>(Narcissus jonquilla)</i>	Fleur	Jonquille, plante bulbeuse à floraison printanière.	
Lamier argenté <i>(Lamium maculatum)</i>	Herbe	Lamier argenté, plante tapissante à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Latanier rouge <i>(Latania lontaroides)</i>	Palmier	Palmier présent autrefois dans plusieurs îles des Mascareignes et qui ne l'est plus aujourd'hui de façon naturelle qu'à la Réunion. Pouvant atteindre 12 mètres de haut.	
Liane à lait <i>(Allamanda cathartica)</i>	Buisson		
Lierre rampant-a <i>(Hedera helix 'Glacier')</i>	Herbe	Plante couvre-sol retombante.	




Nom	Type	Description	Image
Lilas des Indes <i>(Melia azedarach)</i>	Arbre	Arbre à feuillage caduc, à port étalé. Feuilles vert foncé, au printemps, fleurs roses lilas, en étoile, suivies en automne par des fruits jaune orange pale.	
Lys blanc <i>(Lilium candidum)</i>	Fleur	Lys à grandes fleurs blanches retombantes.	
Lys carnaval <i>(Lilium bulbiferum)</i>	Fleur	Lys carnaval, lys à floraison dressée très colorée.	




Nom	Type	Description	Image
Maïs cultivé <i>(Zea mays)</i>	Herbe		
Manguier - VI POPAA <i>(Mangifera indica)</i>	Arbre		
Morinda - NONO <i>(Morinda citrifolia)</i>	Arbuste	Cultivé en Polynésie l'arbuste, <i>Morinda citrifolia</i> , appartient à l'une des familles comportant le plus de plantes médicinales.	




Nom	Type	Description	Image
Mûrier à papier <i>(Broussonetia papyrifera)</i>	Arbuste	Arbre d'ornement à feuille caduc. Fleurit au printemps.	
Myoporum <i>(Myoporum laetum)</i>	Arbre	Originnaire de Nouvelle Zélande, arbre persistant de 3 à 9 m de haut, il est intéressant pour la constitution de haie par sa croissance très rapide et son feuillage dense.	
Nartheccium <i>(Nartheccium sp.)</i>	Fleur	Touffe de nartheccium.	




Nom	Type	Description	Image
Nepeta <i>(Nepeta mussini)</i>	Herbe	Nepeta, plante tapissante à floraison bleue.	
Nerprun (forme buisson) <i>(Rhamnus alaternus-a)</i>	Buisson	Buisson feuillu, fourni, en forme d'arche, avec d'étroites feuilles argentées et des baies orange soutenu (usage courant).	
Palette de peintre <i>(Caladium bicolor)</i>	Intérieur	Plante commune vivace à tubercule. Feuilles sagittées. Feuillage aux couleurs brillantes. Apprécie une atmosphère chaude et humide.	




Nom	Type	Description	Image
Palétuvier rouge (<i>Rhizophora mangle</i>)	Arbre	Cet arbre de 5 à 20 m constitue l'espèce pionnière de la mangrove. Elle se rencontre dans les zones inondées. Ses branches et tronc émettent de très nombreuses racines aériennes (racines-échasses) qui s'enfoncent dans la vase ce qui assure la stabilité de l'arbre. Les feuilles sont simples, épaisses et opposées. Les fleurs sont petites à calice jaune et pétales épais jaunâtres. Le fruit pend, la graine germe sur l'arbre même en émettant une longue radicule pointue.	
Palmier "bouteille" (<i>Hyophorbe lagenicaulis</i>)	Palmier	Palmier originaire des îles Mascareignes (océan Indien.	
Palmier (Phœnix) (<i>Phoenix sp.</i>)	Palmier	Palmier phœnix méditerranéen.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier à sucre <i>(Caryota urens)</i>	Palmier	Originaire de l'Asie du sud-est (Birmanie, sud de l'Inde , Malaisie, Philippines), il pousse isolé. Sa sève est utilisée pour la confection du sucre de palme.	
Palmier à tronc rouge <i>(Cyrtostachys renda)</i>	Palmier	Petit palmier à touffe érigée originaire de Malaisie.	
Palmier Arenga <i>(Arenga pinnata)</i>	Palmier	Palmier à port unique de Malaisie.	


Nom	Type	Description	Image
Palmier chamaerops <i>(Chamaerops sp.)</i>	Palmier	Arbre isolé.	
Palmier d'Arec <i>(Chrysalidocarpus lutescens)</i>	Palmier	Persistant, feuilles pennées arquées	
Palmier d'intérieur-b <i>(Phoenix humilis)</i>	Intérieur	Originaire d'Asie, très répandu au Viêt-Nam et le long des rives du fleuve Mékong au Laos, ce palmier ne dépasse pas 2 mètres de haut.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier dattier sauvage <i>(Phoenix reclinata)</i>	Palmier	Situé en Afrique équatoriale. Palmier à croissance rapide qui peut atteindre 7.5 mètres de haut. Feuilles pennées et tronc orange à sa base.	
Palmier de Guadeloupe <i>(Brahea edulis)</i>	Palmier	Originaire de la Guadeloupe. Atteint 10 m de haut. Grandes feuilles palmées vertes en éventail. Fruits jaunes ovoïdes.	
Palmier de Roebelen, Palmier dattier nain <i>(Phoenix roebelinii)</i>	Palmier	Originaire de l'Inde et de l'Asie du Sud-est, c'est un petit palmier décoratif qui ne dépasse pas 2 mètres de haut. La faible taille et la fragilité de ce Phoenix le destine particulièrement aux intérieurs et vérandas.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier de Washington <i>(Washingtonia filifera)</i>	Palmier	Palmier à grandes feuilles palmées dont les extrémités des lobes forment des fils. Port érigé et stipe unique.	
Palmier du Mexique <i>(Washingtonia robusta)</i>	Palmier		
Palmier femelle nain <i>(Rhaps humilis)</i>	Palmier	Originaire du sud de la Chine, palmier arbustif comparable à du bambou, pourvu de nombreuses grappes, de 5 ou 6 m de haut. Ses feuilles empalmées peuvent soutenir jusqu'à 25 segments.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier Royal (cocos) <i>(Arecastrum romanzoffianum)</i>	Palmier		
Palmier royal de Cuba <i>(Roystonea regia)</i>	Palmier	Palmier à stipe unique originaire des Caraïbes.	
Pandanus, baquois - FARA, HINANO <i>(Pandanus odoratissimus)</i>	Indéterminé	Le Fara, Pandanus odoratissimus, arbre indigène du sud-est asiatique est le plus utilisé en Polynésie après le cocotier. Il pousse surtout sur les plages et terrains sablonneux de bord de mer, mais également, de manière moins alambiquée, en montagne, jusqu'à 800 m d'altitude. Il est aisément reconnaissable par ses racines aériennes qui poussent sur le tronc en un faisceau pyramidal, et ses feuilles qui tombent en grappes touffues à l'extrémité des branches.	




Nom	Type	Description	Image
Papyrus souchet <i>(Cyperus involucratus)</i>	Herbe		
Pâturin <i>(Deschampsia caespitosa)</i>	Herbe	Pâturin, touffe de graminées décoratives.	
Pavot de Californie <i>(Eschscholtzia californica)</i>	Fleur	Pavot de Californie à floraison orange vif.	




Nom	Type	Description	Image
Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	Fleur		
Pervenche (<i>Vinca major</i>)	Herbe	Plante tapissante à feuilles persistantes.	
Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	Fleur	Massifs, bordures mixtes ou jardinières.	




Nom	Type	Description	Image
Plante à pétrole <i>(Euphorbia tirucalli)</i>	Buisson	Arbrisseau commun succulent d'Afrique, qui s'adapte à de nombreux endroits, y compris sur les rives, ou les plaines sèches. Souvent utilisé comme barrage naturel pour le bétail.	
Polygonum rouge <i>(Polygonum affine 'Darjeeling red')</i>	Herbe	Polygonum rouge, plante tapissante à feuilles caduques.	
Queue de lapin <i>(Pennisetum mezianum)</i>	Herbe	Herbe graminiforme touffetée qui atteint environ 1 mètre. Fleurit dans un sol sec et pauvre en plein soleil. Souvent trouvée dans la savane africaine.	




Nom	Type	Description	Image
Riz <i>(Oryza sativa)</i>	Herbe		
Rosier ancien-d <i>(Rosa 'Nevada')</i>	Buisson	Rosier ancien, buisson arbustif à floraison remontante blanche. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Rosier grimpant <i>(Rosa 'New Dawn')</i>	Grimpant	Rosier grimpant, feuilles caduques, bouquet de fleurs rose pale.	




Nom	Type	Description	Image
Sabal (<i>Sabal palmetto</i>)	Palmier	Largement répandu aux Bahamas, à l'ouest de Cuba et au sud-est des Etats Unis, son tronc mesure de 8 à 20 mètres de hauteur et jusqu'à 35cm de diamètre, de couleur grise. Les bases fendues des anciens pétioles persistent longtemps sur le stipe et forment un motif réticulé caractéristique du genre. Sa couronne est composée de 15 à 30 feuilles très costapalmées, de 1 à 1,5 m de large, de couleur verte. Il pousse dans les sols humides près de la mer, mais également dans les dunes, le long des rivières ainsi que dans les zones humides et inondées.	
Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii</i> 'Gaiety')	Herbe	Plante couvre-sol à feuillage compact.	
Senecio (Africain) Fleurs Jaunes (<i>Crassocephalum mannii</i>)	Arbuste	Mauvaise herbe succulente avec une tige duveteuse. Larges feuilles. Fleurs jaunes.	

Nom	Type	Description	Image
Sisal sauvage, Sisal masai, Sisal oldupai <i>(Sanseveria ehrenbergiana (syn. S. ehrenbergii))</i>	Indéterminé	Plante succulente qui pousse dans la gorge de l'Oldupai au Serengeti.	
Skimmia <i>(Skimmia japonica var.)</i>	Buisson	Buisson à port compact étalé, feuillage persistant, buisson limité comme par une taille de conduite.	
Spirée blanche <i>(Spirea x vanhouttei)</i>	Buisson	Arbuste à pousses minces et arquées, feuilles caduques. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	




Nom	Type	Description	Image
Sporobolus ioclados (<i>Sporobolus ioclados</i>)	Herbe	Herbe graminiforme commune des savanes africaines.	
Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana alata</i> 'Domino')	Fleur	Tabac ornemental à floraison blanche.	
Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana alata</i> 'Sensation')	Fleur	Tabac ornemental à floraison rouge.	




Nom	Type	Description	Image
Tabebuia, Tecoma rose <i>(Tabebuia rosea)</i>	Arbre	Originare d'Amérique continentale, allant du sud du Mexique au Vénézuéla et à la partie côtière de l'Equateur, le tabebuia rosea est un grand arbre à feuillage caduc et à pousse rapide pouvant atteindre de 25 à 30 m de hauteur et 1 m de diamètre (tronc). La couronne est large, stratifiée et irrégulière, avec quelques branches horizontales épaisses. L'écorce est grise. Les feuilles sont composées de 5 lobes inégaux en taille, le lobe central étant le plus large.	
Taro géant - APE <i>(Alocasia macrorrhiza)</i>	Indéterminé	Plante originaire de Malaisie, Sri Lanka, Inde et poussant tout autour du Pacifique Sud. Les Polynésiens l'appellent Ape. Elle est aussi nommée "oreille d'éléphant" en raison de la taille de ses feuilles. Les feuilles poussent à partir du centre de la plante et peuvent avoir une longueur de 3 à 4 mètres.	
Taro, Grande toyave - APE <i>(Alocasia esculanta)</i>	Indéterminé	Native de la Malaisie, du Sri-Lanka et de l'Inde, cette plante a de larges feuilles qui poussent sur des pétioles en forme de tubes.	




Nom	Type	Description	Image
Teck <i>(Tectona grandis)</i>	Arbre	Situé en Inde, aux Philippines et à Java. Atteint environ 30 mètres de haut. Fleurs bleuâtres-blanches en glomérules. Connue pour sa résistance.	
Tiarelle vigoureuse <i>(Tiarella cordifolia)</i>	Herbe	Tiarella vigoureuse, plante vivace à feuilles persistantes.	
Tournesol <i>(Helianthus annuus)</i>	Fleur	Plante annuelle.	




Nom	Type	Description	Image
Tulipe hybride de Darwin <i>(Tulipa 'x Darwin')</i>	Fleur	Plante bulbeuse à fleurs. Grandes fleurs simples, à fort pédoncule éclochant de la mi printemps à la fin de cette saison.	
Valériane glauque <i>(Centranthus ruber 'Coccineus')</i>	Fleur	Valériane à floraison rose.	
Ylang Tlang - MOTOI <i>(Canaga odorata)</i>	Arbre	Originare d'Asie du Sud-est (Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines en zone tropicale humide). On le cultive pour ses fleurs dont on extrait par distillation une huile essentielle très utilisée en parfumerie.	




Base Asie tempérée




Nom	Type	Description	Image
Abricotier japonais (<i>Prunus mume</i>)	Arbre	Petit arbre dressé à fleurs roses en début de printemps	
Albizia (<i>Albizia julibrissin</i>)	Arbre	Albizia, arbre de type albizia, méditerranéen ou tropical.	
Albizia (Mimosa) de montagne (<i>Albizia falcata</i>)	Arbre	Arbre d'Indonésie à croissance rapide. Un individu a poussé de 10,75 mètres en 13 mois.	




Nom	Type	Description	Image
Alchémille <i>(Alchemilla mollis)</i>	Herbe	Alchémille, plante de rocaille, couvre-sol à feuilles persistantes.	
Alpinia rouge, Gingembre rouge <i>(Alpinia purpurata)</i>	Intérieur	Plante herbacée vivace originaire de Malaisie utilisée en ornement. Le gingembre rouge est cultivé en Asie pour ses fleurs qui durent très longtemps.	
Anthurium <i>(Anthurium andreaeanum)</i>	Intérieur	Poussent dans les forêts tropicales humides de montagne de l'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les fleurs sont petites (environ 3 mm) et se développent entassés dans un pic sur un axe charnu et nommé "spadix", une caractéristique des arums. Le spadix peut prendre différentes couleurs (blanc, vert, violet, rouge, rose, ou une combinaison). Le spadix fait partie d'une inflorescence. Certaines personnes aiment à appeler la partie extérieure de l'inflorescence une "fleur", mais c'est simplement une modification de la feuille. Elles peut être une seule couleur (jaune, vert ou blanc) ou, éventuellement, y compris multicolores bordeaux et rouge.	




Nom	Type	Description	Image
Arbre à cochonnets - ATI, TAMANU <i>(Calophyllum inophyllum)</i>	Arbre	Arbre pan tropical que l'on trouve sur de nombreux rivages de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Biologiquement lié à la mer (il aime les terrains salés et sablonneux, meubles et frais). Il peut atteindre 20 à 30 m de haut et possède un tronc tortueux, couvert d'une écorce rugueuse et crevassée.	
Arbre à papillons <i>(Buddleja davidii)</i>	Buisson	Arbuste à port évasé et feuillage caduc.	
Arbre aux quarante écus taillé <i>(Ginkgo biloba)</i>	Arbre	Taillé à port conique.	




Nom	Type	Description	Image
Arbre aux quarante écus-a (<i>Ginkgo biloba-a</i>)	Arbre	Arbre proche des conifères, à port dressé puis étalé, aux feuilles caractéristiques en éventail.	
Arbre aux quarante écus-b (<i>Ginkgo biloba-b</i>)	Arbre	Conduit sur trois branches maîtresses.	
Ardisia de Chine (<i>Ardisia crenata</i>)	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	




Nom	Type	Description	Image
Ardisia du Japon (<i>Ardisia japonica</i>)	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	
Aréquier (<i>Areca catechu</i>)	Palmier	Originaire de l'Inde et de Malaisie, l'aréquier pousse en climat tropical, il est vert dans sa partie jeune. Il peut atteindre 25 mètres de hauteur.	
Arundinaria chino (<i>Pleioblastus chino</i>)	Indéterminé	Bambou à branches assez longues.	




Nom	Type	Description	Image
Bambou <i>(Phyllostachis viridiglaucescens)</i>	Indéterminé	Bosquet de plusieurs individus.	
Bambou nain <i>(Arundinaria sp.)</i>	Intérieur	Petit bambou, plante d'intérieur.	
Bambou pubescent <i>(Phyllostachis edulis 'Heterocykla' (syn 'Pubescens'))</i>	Indéterminé	Grand bambou cultivé pour son aspect décoratif et ses pousses comestibles.	




Nom	Type	Description	Image
Bambou Sasa panaché <i>(Sasa veitchii 'Albomarginata')</i>	Indéterminé	Cette espèce de bambou est développée pour ses feuilles qui se défraîchissent aux marges du bord, de ce fait lui donnant un aspect très peu commun avec les feuilles vert foncé avec un bord blanc. Il est souvent employé comme couvre sols dans un secteur ombragé où ses couleurs sont les plus contrastées. Il supporte le plein soleil dans le nord-ouest Pacifique. Le veitchii de Sasa grandit de 3 à 5 pieds, mais il peut être maintenu plus court en le coupant à ras la terre après ses premiers croissances.	
Bananier commun <i>(Musa domestica)</i>	Indéterminé	Bananier commun, grandes feuilles vert pale, inflorescence pendante terminée par un groupe de fleurs mâles pourpres.	
Bancoulier <i>(Aleurites moluccana)</i>	Arbre	arbre emblème de Hawaï, originaire de Polynésie, l'Aleurites moluccana est un arbre à feuillage pérenne qui peut atteindre 30 m de haut. L'écorce est vert-gris. Les feuilles ont des formes diverses allant de pointues et anguleuse ou lobées (érable) à ovale étroite (oeuf). Elles sont vert brillant.	




Nom	Type	Description	Image
Bancoulier de plaine <i>(Aleurites moluccana - tree type)</i>	Arbre	Arbre originaire de Malaisie, Polynésie, Philippines et des Iles des Mers du Sud, désormais largement répandu dans les tropiques. Cet arbre pousse en forêt dense et humide jusqu'à 1 200 m d'altitude. Il est cultivé pour ses noix dont on extrait l'huile.	
Bec de perroquet <i>(Heliconia psittacorum)</i>	Intérieur	Plante à fleur originaire de l'Amérique tropicale et de certaines îles du Pacifique. De nombreuses espèces sont cultivées pour leur inflorescences de couleurs vives et voyantes.	
Bégonia <i>(Begonia corallina)</i>	Intérieur	Bégonia bambusiforme. A planter en pot.	




Nom	Type	Description	Image
Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme à floraison blanchâtre.	
Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	Fleur	Aussi nommé "Bégonia à massifs".	
Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	Herbe		




Nom	Type	Description	Image
Bois porte-bonheur (<i>Corylopsis spicata</i>)	Buisson	Arbuste caduc étalé, grappes pendantes de fleurs jaunes au printemps.	
Bois-joli - TOU (<i>Cordia subcordata</i>)	Arbre	Espèce présente dans les régions indo-malaises, en Indonésie, dans le Pacifique et sur la côte est de l'Afrique tropicale. Arbre côtier au tronc court et trapu dont le bois très dur est utilisé en ébénisterie et dans l'artisanat. Autrefois, ses écorces, feuilles et fruits étaient employés dans la confection de nombreux médicaments.	
Boule de neige (<i>Viburnum plicatum 'Mariesii'</i>)	Buisson	Arbuste à port étagé, buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	




Nom	Type	Description	Image
Bouleau de l'Himalaya (<i>Betula utilis</i>)	Arbre	Port semi-pyramidal, écorce blanche.	
Bruyère (<i>Erica carnea</i>)	Fleur	Bruyère d'hiver à feuilles persistantes.	
Bruyère 'Spring Cream' (<i>Calluna vulgaris</i> 'Spring Cream')	Fleur	Petite bruyère à floraison blanche.	




Nom	Type	Description	Image
Buis 'Green Mountain' <i>(Buxus x sheridan 'Green Mountain')</i>	Arbuste	Buisson taillé en cône.	
Buisson taillé en 'coussin' <i>(Dumus indeterminatus)</i>	Buisson	Buisson taillé de forme hémisphérique.	
Callune fausse bruyère, brande <i>(Calluna vulgaris)</i>	Buisson	Sous-arbrisseau à feuilles persistantes. Donne de la mi-été à la fin de l'automne des grappes de fleurs.	




Nom	Type	Description	Image
Camélia du Japon (<i>Camellia japonica</i>)	Arbuste	Camélia à floraison rouge rosé.	
Camphrier (<i>Cinnamum camphora</i>)	Arbre	Camphrier, arbre à cime large et feuillage persistant, feuilles jaunes cuivrées ou rougeâtres.	
Canne de Provence (<i>Arundo donax</i>)	Indéterminé	Plante à rhizomes, vivace. Tiges épaisses portant de larges feuilles. Donne en été des panicules denses, dressées.	




Nom	Type	Description	Image
Cerisier à fleurs japonais-e (<i>Prunus x yedoensis</i>)	Arbre	Arbre à feuillage caduc, cime arrondie, branches arquées, boutons roses suivis de fleurs blanches ou rose pâle au printemps.	
Cerisier à fleurs japonais-h (<i>Prunus jamasakura</i>)	Arbre	Grand arbre dressé à fleurs blanches qui apparaissent au printemps avec de jeunes feuilles rouges.	
Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais (<i>Prunus serrulata lannesiana</i>)	Arbre	Arbre à port étalé, fleurs blanches ou roses de mi-à fin du printemps. Les feuilles caduques d'abord bronzées puis vert foncé, deviennent jaune brunâtre à l'automne.	




Nom	Type	Description	Image
Châtaignier-a (<i>Castanea sativa-a</i>)	Arbre	Feuillu avec une couronne étalée. Version âgée de l'arbre simulable de 20 à 60 ans mais ne peut être simulé en dessous de 20 ans. Pour la version juvénile, merci de consulter le Châtaignier-b.	
Châtaignier-b (<i>Castanea sativa-b</i>)	Arbre	Arbre caduc à cime étalée. Version Juvénile de l'arbre simulable de 5 à 30 ans. Pour une version très âgée, merci consulter le Châtaignier-a.	
Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	Intérieur	Plante vivace bulbeuse, cultivée pour son feuillage. Longues hampes florales portant de nombreuses fleurs blanches.	



Nom	Type	Description	Image
Citronnelle (<i>Cymbopogon citratus</i>)	Herbe	Plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques (à goût de citron).	
Clématite (<i>Clematis jackmanii</i> 'Superba')	Grimpant	Plante grimpante à grandes fleurs pourpres violacées, et palissée sur une colonne.	
Clérodendron du Japon (<i>Clerodendrum trichotomum</i>)	Buisson	Buisson ou arbrisseau dressé, feuillage caduc, vert moyen, fleurs blanches et odorantes issues de boutons rose foncé, suivies de baies décoratives bleues de la fin d'été à la mi-automne.	




Nom	Type	Description	Image
Cognassier du Japon <i>(Chaenomeles japonica)</i>	Buisson	Arbuste étalé, épineux, abondante floraison printanière rouge à rouge orangé, fruits jaunes.	
Cognassier du Japon 'Moerloosii' <i>(Chaenomeles speciosa 'Moerloosii')</i>	Buisson	cognassier du Japon, plante buissonnante à floraison rose et blanche.	
Coleus <i>(Coleus blumei 'sanguineum')</i>	Intérieur	plante ornementale originaire d'Asie du sud-est (Indonésie, Java). Feuilles tricolores, opposées ovales, à dominante verte tachetée de rouge vin -framboise et jaune.	




Nom	Type	Description	Image
Coléus à feuilles larges <i>(Coleus blumei 'Brightness')</i>	Fleur	Plante au feuillage coloré et au revers duveteux. Feuilles dentées.	
Coréopsis à verticilles <i>(Coreopsis verticillata)</i>	Fleur	Coréopsis à floraison jaune.	
Corète du Japon <i>(Kerria japonica)</i>	Buisson	Kerria, arbuste élégant à branches arquées à feuillage caduc vert vif, floraison jaune d'or au printemps.	




Nom	Type	Description	Image
Cornouiller discuté (<i>Cornus controversa</i>)	Arbre	Cornouiller à feuilles caduques, à rameaux établis horizontalement, floraison blanche en été, feuilles devenant pourpres en automne.	
Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	Arbuste	Arbuste rameux et dense, feuillage vert devenant pourpre rougeâtre à l'automne, fleurs jaune soufre en fin d'hiver, début printemps, fruits rouges à maturité.	
Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos 'Sensation'</i>)	Fleur	Floraison rose violacé.	




Nom	Type	Description	Image
Cryptomère Sugi (<i>Cryptomeria japonica</i>)	Arbre	Conifère à croissance rapide, à port colonnaire ou conique.	
Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	Intérieur	A planter en bacs.	
Erable du Japon (<i>Acer palmatum</i>)	Arbre	Erable du Japon à port étalé, remarquable pour la coloration de ses feuilles au printemps et en automne.	




Nom	Type	Description	Image
Ficus benjamina (<i>Ficus benjamina</i>)	Intérieur	Arbuste ornemental à port pleureur, feuilles ovales persistantes.	
Ficus benjamina (forme tropicale haie libre) (<i>Ficus benjamina</i> (trop.))	Arbre	Ficus benjamina (forme tropicale haie libre)	
Fleurs à massifs (<i>Flos</i> <i>indeterminatus</i>)	Fleur	Fleurs de massifs, la touffe se développe par rhizome.	




Nom	Type	Description	Image
Fromager <i>(Bombax ceiba)</i>	Arbre	Les fromagers sont de grands arbres pouvant atteindre une hauteur de 70 mètres, ce qui les fait émerger au dessus des forêts tropicales.	
Genêt purgatif <i>(Cytisus purgans)</i>	Buisson	Arbuste buissonnant fastigié. Fleurs jaune d'or au printemps.	
Gingembre parfumé <i>(Hedychium gardnerianum)</i>	Intérieur	"Plante que l'on trouve dans les régions tropicales, de la Martinique à Hawaï en passant par la Réunion. Dans ces îles, elle est l'espèce introduite la plus naturalisée, au point qu'elle en devient envahissante en certains endroits.	




Nom	Type	Description	Image
Gueule de loup <i>(Antirrhinum majus</i> <i>'Wedding Bells')</i>	Fleur	Muflier à fleurs jaunes.	
Hamamélis <i>(Hamamelis mollis)</i>	Buisson	Arbuste buissonnant à floraison hivernale, limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Hélianthème faux alysse <i>(Helianthemum nummularium)</i>	Herbe	Buisson à port étalé et feuillage persistant gris. Porte, en été, une succession de fleurs jaunes en forme de coupe.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-a <i>(Herba indeterminata-a)</i>	Herbe	Herbe, touffe de graminées à grandes feuilles.	
Herbe-b <i>(Herba indeterminata-b)</i>	Herbe	Herbe, touffe de graminées à feuilles courtes.	
Herbe-c <i>(Herba indeterminata-c)</i>	Herbe	Herbe, graminées à feuillage dense, alignées en bande.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-e (<i>Herba indeterminata-e</i>)	Herbe	Graminée à épis.	
Hibiscus rose de Chine (<i>Hibiscus rosasinensis</i>)	Arbuste		
Hinoki (<i>Chamaecyparis obtusa</i>)	Arbre	Faux cyprès "Hinoki", conifère de forme conique régulière. Espèce couramment cultivée comme plante d'ornement dans les parcs et jardins et en Asie autour des temples.	




Nom	Type	Description	Image
Hortensia <i>(Hydrangea macrophylla)</i>	Buisson	Arbuste buissonnant à feuilles caduques, taillé, à inflorescences en dôme, blanches, rosées, pourpre ou bleues. On trouve des hortensias très couramment dans des jardins partout dans le monde, mais ils sont originaires de Chine.	
Hortensia grimpant <i>(Hydrangea petiolaris)</i>	Grimpant	Originaires de l'île russe Sakhaline, de Corée et du Japon. Plante grimpante qui s'accroche toute seule et parvient à couvrir des surfaces importantes. Feuilles caduques, fleurs blanches en été, plante palissée sur une colonne.	
Houx du Japon <i>(Ilex rotundifolia)</i>	Arbre	Arbre à feuillage persistant. Les feuilles sont vert sombre, les fruits rouges apparaissent en automne et hiver.	




Nom	Type	Description	Image
Immortelle de Virginie <i>(Anaphalis margaritacea)</i>	Fleur	Immortelle à fleurs blanches (toujours fleurie).	
Iris hollandais <i>(Iris lusitanica x tingitana)</i>	Fleur	Iris bulbeux à floraison bleue.	
Ixora, Arbuste corail <i>(Ixora coccinea)</i>	Buisson	Arbrisseau touffu qui produit des fleurs jaune, rose, orange ou rouge. Fleur nationale du Suriname.	




Nom	Type	Description	Image
Jasmin d'hiver (<i>Jasminum nudiflorum</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à branches arquées, feuillage caduc vert sombre, fleurs jaune vif en fin d'hiver ou début de printemps, sur des pousses vertes.	
Jonquille (<i>Narcissus jonquilla</i>)	Fleur	Jonquille, plante bulbeuse à floraison printanière.	
Lamier argenté (<i>Lamium maculatum</i>)	Herbe	Lamier argenté, plante tapissante à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Laurier cerise (<i>Prunus laurocerasus</i>)	Arbuste	Laurier cerise, arbuste à abondante floraison printanière blanche, feuilles persistantes.	
Lierre rampant-a (<i>Hedera helix</i> 'Glacier')	Herbe	Plante couvre-sol retombante.	
Lilas des Indes (<i>Melia azedarach</i>)	Arbre	Arbre à feuillage caduc, à port étalé. Feuilles vert foncé, au printemps, fleurs roses lilas, en étoile, suivies en automne par des fruits jaune orange pale.	




Nom	Type	Description	Image
Lys blanc (<i>Lilium candidum</i>)	Fleur	Lys à grandes fleurs blanches retombantes.	
Lys carnaval (<i>Lilium bulbiferum</i>)	Fleur	Lys carnaval, lys à floraison dressée très colorée.	
Magnolia yulan (<i>Magnolia heptapeta</i> (syn. <i>denudata</i>))	Arbre	Arbre Japonais à port étalé, feuillage caduc, porte au printemps de nombreuses fleurs blanches.	




Nom	Type	Description	Image
Maïs cultivé <i>(Zea mays)</i>	Herbe		
Manguier - VI POPAA <i>(Mangifera indica)</i>	Arbre		
Marronnier du Japon <i>(Aesculus turbinata)</i>	Arbre	Arbre à inflorescences blanches en "pain de sucre".	




Nom	Type	Description	Image
Marronnier-a (<i>Aesculus x hippocastaneum-a</i>)	Arbre	Arbre jeune isolé au stade adulte sans taille souvent nécessite d'être taillé (voir marronnier b ou marronnier d).	
Marronnier-b (<i>Aesculus x hippocastaneum-b</i>)	Arbre	Plante simulant une taille périodique du Marronnier-a souvent présent en ville le long des avenues.	
Marronnier-c (<i>Aesculus x hippocastaneum-c</i>)	Arbre	marronnier rouge simulant une taille périodique	




Nom	Type	Description	Image
Marronnier-d (<i>Aesculus x hippocastaneum-d</i>)	Arbre	Grand arbre isolé simulant une taille périodique du Marronnier-a souvent trouvé en milieu urbain dans les parcs et jardins.	
Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	Fleur		
Mûrier à papier (<i>Broussonetia papyrifera</i>)	Arbuste	Arbre d'ornement à feuille caduc. Fleurit au printemps.	




Nom	Type	Description	Image
Narthecium (<i>Narthecium sp.</i>)	Fleur	Touffe de narthecium.	
Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	Herbe	Nepeta, plante tapissante à floraison bleue.	
Noisetier de Turquie (<i>Corylus colurna</i>)	Arbre	Arbre conique à feuilles caduques ovales.	




Nom	Type	Description	Image
Olivier de Bohême, chalef <i>(Elaeagnus angustifolia)</i>	Arbre	C'est un arbuste souvent planté dans les jardins en Provence. Originaire d'Asie l'olivier de bohême est un grand arbrisseau à feuillage caduc qui peut atteindre 7 à 8 mètres. Arbuste touffu ou petit arbre étalé. Feuilles caduques étroites, gris argenté.	
Orme du Japon-a <i>(Zelkova serrata-a)</i>	Arbre	Arbre à feuillage caduc à port étalé, les feuilles devenant jaunes ou oranges en automne. Arbre adulte à vieux.	
Orme du Japon-b <i>(Zelkova serrata-b)</i>	Arbre	Arbre à feuillage caduc à port étalé, les feuilles deviennent jaunes ou oranges en automne. Arbre jeune à adulte.	




Nom	Type	Description	Image
Pachysandra du Japon <i>(Pachysandra terminalis)</i>	Herbe	Petit arbuste vivace à port rampant, les feuilles sont groupées à l'extrémité des rameaux. En début d'été, grappes de petites fleurs blanches.	
Palette de peintre <i>(Caladium bicolor)</i>	Intérieur	Plante commune vivace à tubercule. Feuilles sagittées. Feuillage aux couleurs brillantes. Apprécie une atmosphère chaude et humide.	
Palmier à sucre <i>(Caryota urens)</i>	Palmier	Originaire de l'Asie du sud-est (Birmanie, sud de l'Inde, Malaisie, Philippines), il pousse isolé. Sa sève est utilisée pour la confection du sucre de palme.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier à tronc rouge <i>(Cyrtostachys renda)</i>	Palmier	Petit palmier à touffe érigée originaire de Malaisie.	
Palmier Arenga <i>(Arenga pinnata)</i>	Palmier	Palmier à port unique de Malaisie.	
Palmier d'intérieur-b <i>(Phoenix humilis)</i>	Intérieur	Originaire d'Asie, très répandu au Viêt-Nam et le long des rives du fleuve Mékong au Laos, ce palmier ne dépasse pas 2 mètres de haut.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier de Chine (<i>Trachycarpus fortunei</i>)	Palmier	C'est l'espèce la plus commune parmi les palmiers rustiques, elle peut résister à des températures négatives jusqu'à -15/-20°C. S'adapte à une grande diversité de climats, mais préfère les régions humides. Il craint le manque d'eau et les grosses chaleurs, plus que le froid.	
Palmier de Roebelen, Palmier dattier nain (<i>Phoenix roebelinii</i>)	Palmier	Originnaire de l'Inde et de l'Asie du Sud-est, c'est un petit palmier décoratif qui ne dépasse pas 2 mètres de haut. La faible taille et la fragilité de ce Phœnix le destine particulièrement aux intérieurs et vérandas.	
Palmier femelle nain (<i>Rhapis humilis</i>)	Palmier	Originnaire du sud de la Chine, palmier arbustif comparable à du bambou, pourvu de nombreuses grappes, de 5 ou 6 m de haut. Ses feuilles empalmées peuvent soutenir jusqu'à 25 segments.	




Nom	Type	Description	Image
Pandanus, baquois - FARA, HINANO <i>(Pandanus odoratissimus)</i>	Indéterminé	Le Fara, <i>Pandanus odoratissimus</i> , arbre indigène du sud-est asiatique est le plus utilisé en Polynésie après le cocotier. Il pousse surtout sur les plages et terrains sablonneux de bord de mer, mais également, de manière moins alambiquée, en montagne, jusqu'à 800 m d'altitude. Il est aisément reconnaissable par ses racines aériennes qui poussent sur le tronc en un faisceau pyramidal, et ses feuilles qui tombent en grappes touffues à l'extrémité des branches.	
Parasol chinois <i>(Firmiana simplex)</i>	Arbre	Arbre robuste à grandes feuilles caduques lobées, écorce verte.	
Pâturin <i>(Deschampsia caespitosa)</i>	Herbe	Pâturin, touffe de graminées décoratives.	




Nom	Type	Description	Image
Paulownia (<i>Paulownia tomentosa</i>)	Arbre	Originnaire du Nord de la Chine, c'est un arbre à croissance rapide qui est utilisé pour son bois en Chine, où il peut se rencontrer dans les décombres. Le Paulownia s'utilise en alignement ou en isolé et il supporte bien la taille et la pollution.	
Pavot d'Islande (<i>Papaver nudicaule</i>)	Fleur	Pavot vivace à floraison variée.	
Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	Fleur	Pavot de Californie à floraison orange vif.	




Nom	Type	Description	Image
Pensée cultivée (<i>Viola x wittrockiana</i>)	Fleur		
Persea thunbergii (<i>Machilus thunbergii</i>)	Arbre	Grand arbre persistant situé en Chine, Japon et Corée. N'aime pas l'ombre. Provient des forêts chaudes du Japon.	
Pervenche (<i>Vinca major</i>)	Herbe	Plante tapissante à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Pétunia bleu <i>(Petunia 'Resisto')</i>	Fleur	Massifs, bordures mixtes ou jardinières.	
Peuplier de Chine, peuplier du Yunnan <i>(Populus yunnanensis)</i>	Arbre	Arbre érigé ou semi-étalé à branches souples. Feuillage lâche et clair devenant jaune à l'automne.	
Pin de l'Himalaya <i>(Pinus wallichiana)</i>	Arbre	Originaire de la région de l'Himalaya, il pousse en haute altitude (1800-4300 m) rarement en dessous de 1200 m, il pousse dans des climats tempérés avec des hivers secs et des étés humides. Il est aussi utilisé en zones méditerranéennes pour sa rusticité.	




Nom	Type	Description	Image
Pin de montagne, pin de Mongolie <i>(Pinus mugo (montana) 'Mungho')</i>	Arbuste	Conifère arbustif à taille variable. Feuilles en aiguilles de vert vif à vert foncé.	
Pin noir du Japon taillé <i>(Pinus thunbergii)</i>	Arbre	Pin taillé "à la japonaise".	
Pin rouge du Japon taillé <i>(Pinus densiflora)</i>	Arbre	Pin taillé "à la japonaise".	




Nom	Type	Description	Image
Polygonum rouge <i>(Polygonum affine</i> <i>'Darjeeling red')</i>	Herbe	Polygonum rouge, plante tapissante à feuilles caduques.	
Pometier à petits fruits <i>(Malus baccata</i> <i>'Columnaris')</i>	Arbuste	Pometier à petits fruits, à port érigé.	
Prunier (ou pêcher) décoratif <i>(Prunus x persica)</i>	Arbre	Prunier décoratif, arbre d'ornement.	




Nom	Type	Description	Image
Prunier décoratif w (<i>Prunus x padus</i>)	Arbre	Arbre d'ornement non taillé.	 A 3D rendered image of a Prunus x padus tree, showing a dense, rounded canopy of green leaves and a dark trunk, set against a white background.
Riz (<i>Oryza sativa</i>)	Herbe		 A photograph of rice plants (Oryza sativa) growing in a field. The plants are tall and green, with some brown seed heads visible. The background shows a blue sky with light clouds and a distant horizon.
Ronce décorative (<i>Rubus calcynoides</i>)	Buisson	Plante sarmenteuse à feuillage semi-persistant, floraison rose au printemps.	 A 3D rendered image of a Rubus calcynoides bush, showing a dense, rounded canopy of green leaves and a dark trunk, set against a white background.




Nom	Type	Description	Image
Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	Buisson	Rosier ancien, buisson arbustif à floraison remontante blanche. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Rosier grimpant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	Grimpant	Rosier grimpant, feuilles caduques, bouquet de fleurs rose pale.	
Sapin du Japon (<i>Abies firma</i>)	Arbre	Sapin "Momi", conifère à branches fortes, étalées et à rameaux semi-érigés.	




Nom	Type	Description	Image
Sarcococca <i>(Sarcococca humilis)</i>	Buisson	Arbuste drageonnant à feuillage persistant, buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Saule taillé <i>(Salix alba-b)</i>	Arbre	Arbre taillé par rapprochement.	
Sawara <i>(Chamaecyparis pisifera)</i>	Arbre	Conifère à branches assez étalées.	




Nom	Type	Description	Image
Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii 'Gaiety'</i>)	Herbe	Plante couvre-sol à feuillage compact.	
Skimmia (<i>Skimmia japonica var.</i>)	Buisson	Buisson à port compact étalé, feuillage persistant, buisson limité comme par une taille de conduite.	
Spirée blanche (<i>Spirea x vanhouttei</i>)	Buisson	Arbuste à pousses minces et arquées, feuilles caduques. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	

Nom	Type	Description	Image
Styrax du Japon (<i>Styrax japonica</i>)	Arbuste	Arbre à feuillage caduc, port étalé, portant en début d'été, parmi les feuilles luisantes vert foncé, une profusion de fleurs blanches pendantes en forme de cloche.	
Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana glauca</i> 'Domino')	Fleur	Tabac ornemental à floraison blanche.	
Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana glauca</i> 'Sensation')	Fleur	Tabac ornemental à floraison rouge.	




Nom	Type	Description	Image
Taro géant - APE (<i>Alocasia macrorrhiza</i>)	Indéterminé	Plante originaire de Malaisie, Sri Lanka, Inde et poussant tout autour du Pacifique Sud. Les Polynésiens l'appellent Ape. Elle est aussi nommée ""oreille d'éléphant"" en raison de la taille de ses feuilles. Les feuilles poussent à partir du centre de la plante et peuvent avoir une longueur de 3 à 4 mètres.	 A photograph of a large, green, heart-shaped leaf of the taro géant (Alocasia macrorrhiza) plant. The leaf is broad and has a prominent central vein. A circular inset in the top left corner shows a close-up of the leaf's texture.
Taro, Grande toyave - APE (<i>Alocasia esculanta</i>)	Indéterminé	Native de la Malaisie, du Sri-Lanka et de l'Inde, cette plante a de larges feuilles qui poussent sur des pétioles en forme de tubes.	 A photograph of a taro plant (Alocasia esculanta) showing several large, heart-shaped leaves on thick, tubular petioles. The leaves are green and have a slightly wavy edge. A circular inset in the bottom left corner shows a close-up of the leaf's surface.
Teck (<i>Tectona grandis</i>)	Arbre	Situé en Inde, aux Philippines et à Java. Atteint environ 30 mètres de haut. Fleurs bleuâtres-blanches en glomérules. Connu pour sa résistance.	 A photograph of a tall, slender tree (Tectona grandis) with a dense canopy of green leaves. The tree is shown against a white background. A circular inset in the bottom left corner shows a close-up of the tree's foliage.




Nom	Type	Description	Image
Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	Herbe	Tiarelle vigoureuse, plante vivace à feuilles persistantes.	 A 3D digital rendering of the Tiarella cordifolia plant. It shows a cluster of green, heart-shaped leaves with prominent veins, topped with several upright, branched inflorescences bearing small, light-colored flowers. The plant is shown from a slightly elevated perspective against a plain white background.
Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	Fleur	Plante annuelle.	 A close-up photograph of several bright yellow sunflowers (Helianthus annuus). The flowers have large, dark brown centers and are surrounded by lush green leaves. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a field or garden setting.
Troène de Chine (<i>Ligustrum delavayanum</i>)	Buisson	Arbuste dense, buissonnant à feuillage semi-persistant.	 A 3D digital rendering of the Ligustrum delavayanum shrub. It is a dense, bushy plant with numerous small, dark green, needle-like or scale-like leaves. The shrub has a somewhat upright but spreading growth habit and is shown against a white background with a soft shadow cast on the ground below.




Nom	Type	Description	Image
Tulipe hybride de Darwin <i>(Tulipa 'x Darwin')</i>	Fleur	Plante bulbeuse à fleurs. Grandes fleurs simples, à fort pédoncule éclochant de la mi printemps à la fin de cette saison.	
Tulipier <i>(Liriodendron tulipifera)</i>	Arbre	Arbre vigoureux à feuilles caduques lobées, tronquées, vert foncé. En été, fleurs blanc verdâtre teinté d'orange.	
Valériane glauque <i>(Centranthus ruber 'Coccineus')</i>	Fleur	Valériane à floraison rose.	




Nom	Type	Description	Image
Vigne vraie (<i>Vitis vinifera</i>)	Arbuste	Plante sarmenteuse, taillée en gobelet pour la récolte du raisin. Le feuillage caduque est vert devenant jaune à pourpre en automne.	
Viorne à feuilles de néflier (<i>Viburnum rhytidophyllum</i>)	Buisson	Arbuste vigoureux, à port étalé, longues feuilles étroites, persistantes, cymes de fleurs blanc crème au printemps suivies de fruits rouges puis noirs.	
Ylang Tlang - MOTOI (<i>Canaga odorata</i>)	Arbre	Originaire d'Asie du Sud-est (Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines en zone tropicale humide). On le cultive pour ses fleurs dont on extrait par distillation une huile essentielle très utilisée en parfumerie.	




Nurserie complète




Nom	Type	Description	Image
Abricotier japonais (<i>Prunus mume</i>)	Arbre	Petit arbre dressé à fleurs roses en début de printemps	
Acacia à écorce jaune (<i>Acacia xanthophloea</i>)	Arbre	Arbre caducifolié à croissance rapide qui atteint 12 m de haut et 10 m de large. Tronc et branches gris jaune.	
Acacia à épines rouges (<i>Acacia lahai</i>)	Arbre	Espèce vivace au sommet aplati que l'on trouve en Afrique.	




Nom	Type	Description	Image
Acacia blanc (<i>Robinia pseudoacacia-r</i>)	Arbre	Arbre à croissance rapide, couronne ouverte, irrégulière.	
Acacia parasol (<i>Robinia pseudoacacia-t</i>)	Arbre	Parcs ou jardins.	
Acacia parasol de savane (<i>Acacia tortilis</i>)	Arbre	Une des espèces de futaie des déserts d'Arabie. De 4 à 15 m de haut, plusieurs troncs, réduit à un petit arbuste dans des conditions arides extrêmes.	




Nom	Type	Description	Image
Acacia siffleur (<i>Acacia drepanolobium</i>)	Arbuste	Correspond à l'acacia siffleur que l'on trouve en Afrique. Arbrisseau vivace dont la croissance est favorisée dans des sols d'argile noire périodiquement humides.	
Agérate bleue (<i>Ageratum houstonianum</i>)	Fleur	Annuelle à masse arrondie de feuilles ovales, pointues. En été et en automne, capitules floraux en forme de brosse, plumeux, bleu lavande.	
Albizia (<i>Albizia julibrissin</i>)	Arbre	Albizia, arbre de type albizia, méditerranéen ou tropical.	




Nom	Type	Description	Image
Albizia (Mimosa) de montagne (<i>Albizzia falcata</i>)	Arbre	Arbre d'Indonésie à croissance rapide. Un individu a poussé de 10,75 mètres en 13 mois.	
Albizia gommier (<i>Albizzia gummifera</i>)	Arbre	Arbre caduc qui préfère les lisières de forêts et les forêts-parcs des régions montagneuses de l'Afrique.	
Alchémille (<i>Alchemilla mollis</i>)	Herbe	Alchémille, plante de rocaille, couvre-sol à feuilles persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Aloès de Volken (<i>Aloe volkensii</i>)	Indéfini	Rosettes molles vivaces d'Afrique de l'Est.	 A 3D rendered image of an Aloe volkensii plant. It features a thick, vertical, fibrous stem that tapers towards the top. At the apex, there is a cluster of green, pointed leaves. From the top of the stem, a single stalk rises, bearing several small, reddish-brown flowers.
Alpinia rouge, Gingembre rouge (<i>Alpinia purpurata</i>)	Intérieur	Plante herbacée vivace originaire de Malaisie utilisée en ornement. Le gingembre rouge est cultivé en Asie pour ses fleurs qui durent très longtemps.	 A 3D rendered image of an Alpinia purpurata plant. It is a bushy herb with multiple upright stems. The leaves are dark green, lanceolate, and have prominent parallel veins. The plant is covered with clusters of bright red, tubular flowers. A yellow circular highlight is drawn around a portion of the lower stems and leaves.
Amélanchier-a (<i>Amelanchier sp.</i>)	Arbuste	Cette espèce présente de nombreux intérêts ornementaux. Il s'agit d'un arbuste caduc, vigoureux (jusqu'à 4-5 m de hauteur) épargné par la plupart des parasites et relativement rustique vis à vis des conditions culturelles	 A 3D rendered image of an Amelanchier shrub. It is a dense, rounded bush with many small, dark green leaves. Interspersed among the foliage are numerous small, bright orange or reddish flowers. The shrub has a thick, woody stem and casts a soft shadow on the ground below.




Nom	Type	Description	Image
Amélanhier-l (<i>Amelanchier laevis</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à floraison blanche en grappes au printemps, petits fruits bruns en été.	
Ananas (<i>Anans commosus</i> var. 'Cayenne')	Indéfini	Fruit tropical	
Anthurium (<i>Anthurium andreanum</i>)	Intérieur	Milieu exotique où poussent des plantes tropicales à fleurs.	




Nom	Type	Description	Image
Arbousier (forme buisson) <i>(Arbutus unedo-a)</i>	Buisson	Typique de la flore méditerranéenne avec des fleurs rouges.	
Arbousier d'Amérique <i>(Arbutus menziesii)</i>	Arbre	Originaire de l'ouest des Etats Unis, le fruit comestible est appelé arbose. Cet arbre est aussi utilisé pour son aspect ornemental.	
Arbre à cochonnets - ATI, TAMANU <i>(Calophyllum inophyllum)</i>	Arbre	Arbre pan tropical que l'on trouve sur de nombreux rivages de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Biologiquement lié à la mer (il aime les terrains salés et sablonneux, meubles et frais). Il peut atteindre 20 à 30 m de haut et possède un tronc tortueux, couvert d'une écorce rugueuse et crevassée.	




Nom	Type	Description	Image
Arbre à laque, butée <i>(Butia capitata)</i>	Palmier		
Arbre à papillons <i>(Buddleja davidii)</i>	Buisson	Arbuste à port évasé et feuillage caduc.	
Arbre à pluie, arbre de 5 heures - MARU MARU <i>(Samanea saman)</i>	Arbre	Natif de la région Tropicale d'Amérique, planté pour son ombrage et son bois, il est aussi présent dans les îles du Pacifique, c'est un arbre présentant une couronne large et régulière.	




Nom	Type	Description	Image
Arbre à saucisses <i>(Kigelia africana)</i>	Arbre	Arbre à croissance rapide, avec un couvert s'étalant largement, procurant ainsi beaucoup d'ombre. Des fleurs parmi les plus grandes de toutes les fleurs indigènes. Situé en Afrique, il peut atteindre 10 m de haut mais peut aussi avoir la taille d'un bonsaï.	
Arbre aux quarante écus taillé <i>(Ginkgo biloba)</i>	Arbre	Taillé à port conique.	
Arbre aux quarante écus-a <i>(Ginkgo biloba-a)</i>	Arbre	Arbre proche des conifères, à port dressé puis étalé, aux feuilles caractéristiques en éventail.	




Nom	Type	Description	Image
Arbre aux quarante écus-b <i>(Ginkgo biloba-b)</i>	Arbre	Conduit sur trois branches maîtresses.	
Arbre brosse à dents, moutardier <i>(Salvadora persica)</i>	Buisson	Arbre de petite taille ou arbrisseau avec un tronc tordu d'un diamètre de 30 cm environ.	
Arbre de Judée <i>(Cercis silicestrum)</i>	Arbre	Petit arbre de 10-15 mètres, les fleurs sont pourpre, l'arbre est planté dans le jardin pour l'ornement. Selon la légende , c'est à cet arbre que Judas se serait pendu. Arbre/arbuste assez étalé, floraison printanière de boutons magenta suivis de fleurs roses avant l'apparition des feuilles ovales.	




Nom	Type	Description	Image
Arbre du voyageur (Palmier) <i>(Ravenala madagascarensis)</i>	Indéfini	Originaire de Madagascar. appelé arbre du voyageur parce que l'eau de pluie qui glisse le long de la gaine des feuilles s'accumule à leur base et permet au voyageur de se désaltérer. Ses feuilles gigantesques forment un éventail et rappellent celles du bananier.	
Ardisia de Chine <i>(Ardisia crenata)</i>	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	
Ardisia du Japon <i>(Ardisia japonica)</i>	Arbuste	Arbuste à feuilles persistantes cultivé pour son feuillage et ses fruits.	




Nom	Type	Description	Image
Aréquier <i>(Areca catechu)</i>	Palmier	Originaire de l'Inde et de Malaisie, l'aréquier pousse en climat tropical, il est vert dans sa partie jeune. Il peut atteindre 25 mètres de hauteur.	
Arundinaria chino <i>(Pleiblastus chino)</i>	Indéfini	Bambou à branches assez longues.	
Aubépine ergot de coq <i>(Crataegus crus-galli)</i>	Arbuste	Cenelle ergot de coq à floraison blanche.	





Nom	Type	Description	Image
Aulne glutineux, verne, vergne <i>(Alnus glutinosa)</i>	Arbre	Arbre conique à croissance rapide mature à l'âge de 60 ans avec un long tronc. Demande beaucoup de lumière. Peut mesurer jusqu'à 20 mètres de haut.	
Avoine bleue <i>(Helictotrichon sempervirens)</i>	Herbe	Graminée à feuillage bleuté, inflorescence érigée, feuilles persistantes.	
Avoine cultivée <i>(Avena pratense)</i>	Herbe	Avoine cultivée	




Nom	Type	Description	Image
Bambou <i>(Phyllostachis viridiglaucescens)</i>	Indéfini	Bosquet de plusieurs individus.	
Bambou nain <i>(Arundinaria sp.)</i>	Intérieur	Petit bambou, plante d'intérieur.	
Bambou pubescent <i>(Phyllostachis edulis 'Heterocykla' (syn 'Pubescens'))</i>	Indéfini	Grand bambou cultivé pour son aspect décoratif et ses pousses comestibles.	




Nom	Type	Description	Image
Bambou Sasa panaché <i>(Sasa veitchii 'Albomarginata')</i>	Indéfini	Cette espèce de bambou est développée pour ses feuilles qui se rafraîchissent aux marges du bord, de ce fait lui donnant un aspect très peu commun avec les feuilles vert-foncé avec un bord blanc. Il est souvent employé comme couvre sols dans un secteur ombragé où ses couleurs sont les plus contrastées. Il supporte le plein soleil dans le nord-ouest Pacifique. Le veitchii de Sasa grandit de 3 à 5 pieds, mais il peut être maintenu plus court en le coupant à ras la terre après ses premiers croissances.	
Bananier commun <i>(Musa domestica)</i>	Indéfini	Bananier commun, grandes feuilles vert pale, inflorescence pendante terminée par un groupe de fleurs mâles pourpres.	
Bancoulier <i>(Aleurites moluccana)</i>	Arbre	arbre emblème de Hawaï, originaire de Polynésie, l'Aleurites moluccana est un arbre à feuillage pérenne qui peut atteindre 30 m de haut. L'écorce est vert-gris. Les feuilles ont des formes diverses allant de pointues et anguleuse ou lobées (érable) à ovale étroite (oeuf). Elles sont vert brillant.	




Nom	Type	Description	Image
Bancoulier de plaine <i>(Aleurites moluccana - tree type)</i>	Arbre	Arbre originaire de Malaisie, Polynésie, Philippines et des Iles des Mers du Sud, désormais largement répandu dans les tropiques. Cet arbre pousse en forêt dense et humide jusqu'à 1 200 m d'altitude. Il est cultivé pour ses noix dont on extrait l'huile.	
Baobab, pain de singe <i>(Adansonia digitata)</i>	Arbre	Baobab qui peut vivre 2000 ans et plus. Son tronc peut atteindre 10 m de diamètre et 17 m de haut. Arbre capable de recréer de l'écorce directement à partir d'une surface de bois apparent.	
Bec de perroquet <i>(Heliconia psittacorum)</i>	Intérieur	Plante à fleur originaire de l'Amérique tropicale et de certaines îles du Pacifique. De nombreuses espèces sont cultivées pour leur inflorescences de couleurs vives et voyantes.	




Nom	Type	Description	Image
Bégonia (<i>Begonia corallina</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme. A planter en pot.	
Bégonia 'Elithe' (<i>Begonia 'Elithe'</i>)	Intérieur	Bégonia bambusiforme à floraison blanchâtre.	
Bégonia à massifs (<i>Begonia x semperflorens</i>)	Fleur	Aussi nommé "Bégonia à massifs".	




Nom	Type	Description	Image
Blé (<i>Triticum sp.-b</i>)	Herbe		
Blé barbu (<i>Triticum sp.-a</i>)	Herbe		
Bois à levier ou bois de fer (<i>Ostrya virginiana</i>)	Arbre	Parcs, bordures de clairière d'érablières.	
Bois à piquet (<i>Cassipourea malosana</i>)	Arbre	Arbre des montagnes élevées (1800-2700 m d'altitude) qui pousse en Afrique. Atteint 33 m de haut et pousse particulièrement droit.	




Nom	Type	Description	Image
Bois blanc (forêt) <i>(Tilia americana-d)</i>	Arbre	Tilleul d'Amérique, simulé en forêts.	
Bois blanc (isolé) ou tilleul d'Amérique <i>(Tilia americana-c)</i>	Arbre	Tilleul d'Amérique, observé en isolé.	
Bois de fer <i>(Casuarina collina)</i>	Arbre	Originnaire de Nouvelle Calédonie, arbre à feuillage caduc nommé ""bois de fer"" en raison de son bois dur.	




Nom	Type	Description	Image
Bois porte-bonheur (<i>Corylopsis spicata</i>)	Buisson	Arbuste caduc étalé, grappes pendantes de fleurs jaunes au printemps.	
Bois-joli - TOU (<i>Cordia subcordata</i>)	Arbre	Espèce présente dans les régions indomalaises, en Indonésie, dans le Pacifique et sur la côte est de l'Afrique tropicale. Arbre côtier au tronc court et trapu dont le bois très dur est utilisé en ébénisterie et dans l'artisanat. Autrefois, ses écorces, feuilles et fruits étaient employés dans la confection de nombreux médicaments.	
Bois-joli ou bois-gentil (<i>Daphne mezereum</i>)	Arbuste	Arbuste buissonnant, fleurs blanches à blanc crémeux, fruits globuleux jaunes, feuillage caduc.	




Nom	Type	Description	Image
Boule de neige (<i>Viburnum plicatum</i> ' <i>Mariesii</i> ')	Buisson	Arbuste à port étagé, buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Bouleau à papier (isolé) (<i>Betula papyrifera</i>)	Arbre	Bouleau à canoë, en futaies aérées ou en bosquets.	
Bouleau commun, blanc ou verruqueux (<i>Betula pendula</i> (<i>verrucosa</i>))	Arbre	Arbre élégant à cime cylindrique ou conique. Minces rameaux souples, souvent pendants, écorce blanc argenté devenant noire et rugueuse à la base du tronc en vieillissant.	




Nom	Type	Description	Image
Bouleau de l'Himalaya <i>(Betula utilis)</i>	Arbre	Port semi-pyramidal, écorce blanche.	
Bouleau jaune (isolé) <i>(Betula alleghaniensis)</i>	Arbre	Bouleau merisier, en futaies aérées ou en bosquets.	
Brachychiton à feuille étroite <i>(Brachychiton acerifolius)</i>	Arbre	Arbre originaire d'Australie à feuillage caduc ou semi persistant, peut supporter de longues périodes de sécheresse. Cultivé, il mesure 10 à 15 m et jusqu'à 30 m et plus dans la nature. Il porte de larges feuilles brillantes composées de 3 à 7 lobes.	




Nom	Type	Description	Image
Bruyère <i>(Erica carnea)</i>	Fleur	Bruyère d'hiver à feuilles persistantes.	
Bruyère 'Spring Cream' <i>(Calluna vulgaris 'Spring Cream')</i>	Fleur	Petite bruyère à floraison blanche.	
Buddleia à feuilles étroites <i>(Buddleja alternifolia)</i>	Buisson	Buddleia à feuilles alternes, arbustes décoratifs.	




Nom	Type	Description	Image
Buddleia à fleurs jaunes, Arbre aux papillons <i>(Buddleja polystachya)</i>	Arbuste	Arbuste aux branches retombantes. Feuilles ressemblant à celles du saule. Petits pétales de fleurs violet-lilas en été.	
Buddleia à pompons <i>(Buddleja globosa)</i>	Buisson	Buddleia à feuillage glauque semi-persistant, floraison jaune abondante au printemps.	
Buis 'Green Mountain' <i>(Buxus x sheridan 'Green Mountain')</i>	Arbuste	Buisson taillé en cône.	




Nom	Type	Description	Image
Buisson taillé en 'coussin' <i>(Dumus indeterminatus)</i>	Buisson	Buisson taillé de forme hémisphérique.	
Cacaoyer <i>(Theobroma cacao)</i>	Arbre	Le cacaoyer est un arbre tropical originaire d'Amérique du Sud. Il pousse naturellement dans le bassin de l'Orénoque et de l'Amazonie à basse altitude au pied de la cordillère des Andes sur des collines de basse altitude (entre 200 et 400 m). Ses fruits, les " cabosses ", sont de grosses baies allongées dont la pulpe contient de nombreuses graines (entre 25 et 75) appelées fèves de cacao, elles sont utilisées pour la fabrication du cacao et du chocolat.	
Caféier <i>(Coffea robusta)</i>	Arbuste	Le caféier robusta est originaire d'Afrique de l'Ouest. Le caféier robusta et les autres espèces, qui supportent mal les périodes de sécheresse, croissent mieux en basse altitude dans des régions chaudes et humides.	




Nom	Type	Description	Image
Callistemon de montagne-POHUTU <i>(Metrosideros collina)</i>	Arbre	Plante originaire de Hawaii à feuillage persistant et floraison spectaculaire	
Callune fausse bruyère, brande <i>(Calluna vulgaris)</i>	Buisson	Sous-arbrisseau à feuilles persistantes. Donne de la mi-été à la fin de l'automne des grappes de fleurs.	
Camélia du Japon <i>(Camellia japonica)</i>	Arbuste	Camélia à floraison rouge rosé.	




Nom	Type	Description	Image
Camphrier (<i>Cinnamum camphora</i>)	Arbre	Camphrier, arbre à cime large et feuillage persistant, feuilles jaunes cuivrées ou rougeâtres.	
Canne de Provence (<i>Arundo donax</i>)	Indéfini	Plante à rhizomes, vivace. Tiges épaisses portant de larges feuilles. Donne en été des panicules denses, dressées.	
Caryer cordiforme (<i>Carya cordiformis</i>)	Arbre	Originnaire d'Amérique du Nord, cet arbre atteint de 15 à 30 m de hauteur, a une forme ronde ou ovoïde. Son écorce est appliquée et rugueuse de couleur grise. Ses feuilles sont généralement composée de 7 à 11 folioles dentées.	




Nom	Type	Description	Image
Cassie blanc (<i>Leucaena leucocephala</i>)	Arbuste	Originaire du Mexique et du nord de l'Amérique Centrale, cette plante est maintenant largement naturalisée sous les tropiques. C'est un arbuste de 0,8 à 5 mètres.	
Catalpa commun (<i>Catalpa bignioïdes</i>)	Arbre	Arbre à port étalé, à grandes feuilles, floraison estivale en panicules de fleurs blanches, suivie de fruits en longues gousses pendantes.	
Céanothe 'Gloire de Versailles' (<i>Ceanothus 'Gloire de Versailles'</i>)	Buisson	Buisson à abondante floraison bleue estivale.	




Nom	Type	Description	Image
Cèdre bleu (<i>Cedrus atlantica</i>)	Arbre	Arbre d'ornement. Parcs et jardins.	
Cèdre de l'est, arbovitae ou thuya américain (<i>Thuja occidentalis</i>)	Arbre	Arbovitae (arbre de vie) grand conifère à feuilles en écailles.	
Cèdre du Liban (<i>Cedrus libani</i>)	Arbre	Le cèdre du Liban est originaire du Moyen-orient : Liban, Syrie, Turquie. Le feuillage, persistant, est bleu-vert. L'arbre mature mesure de 20 à 40 m. Ne pas dépasser 35 ans en 3D, pas de limite dans les autres modes.	




Nom	Type	Description	Image
Cerisier à fleurs japonais-e (<i>Prunus x yedoensis</i>)	Arbre	Arbre à feuillage caduc, cime arrondie, branches arquées, boutons roses suivis de fleurs blanches ou rose pâle au printemps.	
Cerisier à fleurs japonais-h (<i>Prunus jamasakura</i>)	Arbre	Grand arbre dressé à fleurs blanches qui apparaissent au printemps avec de jeunes feuilles rouges.	
Cerisier de Chine, cerisier à fleurs japonais (<i>Prunus serrulata lannesiana</i>)	Arbre	Arbre à port étalé, fleurs blanches ou roses de mi-à fin du printemps. Les feuilles caduques d'abord bronzées puis vert foncé, deviennent jaune brunâtre à l'automne.	




Nom	Type	Description	Image
Charme <i>(Carpinus betula)</i>	Arbre		
Châtaignier-a <i>(Castanea sativa-a)</i>	Arbre	Feuillu avec une couronne étalée. Version âgée de l'arbre simulable de 20 à 60 ans mais ne peut être simulé en dessous de 20 ans. Pour la version juvénile, merci de consulter le Châtaignier-b.	
Châtaignier-b <i>(Castanea sativa-b)</i>	Arbre	Arbre caduc à cime étalée. Version Juvénile de l'arbre simulable de 5 à 30 ans. Pour une version très âgée, merci consulter le Châtaignier-a.	




Nom	Type	Description	Image
Chêne des marais (<i>Quercus palustris</i>)	Arbre	Chêne à épingles, grand arbre à cime compacte, conique ou pyramidale.	
Chêne pédonculé (<i>Quercus Pedunculata</i> (<i>Robur</i>))	Arbre	Grand arbre à port dressé puis étalé et feuillage caduc. Fleurit au printemps avec ensuite des fruits ovoïdes.	
Chêne Rouvre (<i>Quercus petrae</i>)	Arbre		




Nom	Type	Description	Image
Chêne vert <i>(Quercus ilex)</i>	Arbre	Arbre d'Europe du Sud-ouest et d'Afrique du Nord à port arrondi et feuillage persistant, un peu épineux.	
Chêne vert (forme cépée) <i>(Quercus ilex (bush shape))</i>	Arbre	Arbre d'Europe du Sud-ouest et d'Afrique du Nord en forme de buisson arrondi et feuillage persistant, un peu épineux.	
Chêne vert (forme taillée) <i>(Quercus ilex (pruned shape))</i>	Arbre	Arbre d'Europe du Sud-ouest et d'Afrique du Nord taillé pour la production de fruits à feuillage persistant, un peu épineux.	




Nom	Type	Description	Image
Chèvrefeuille rampant (<i>Lonicera sp.</i>)	Herbe	Arbuste grimpant à feuillage persistant ou semi-persistant.	
Chlorophytum du Cap (<i>Chlorophytum capense</i>)	Intérieur	Plante vivace bulbeuse, cultivée pour son feuillage. Longues hampes florales portant de nombreuses fleurs blanches.	
Citronnelle (<i>Cymbopogon citratus</i>)	Herbe	Plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques (à goût de citron).	




Nom	Type	Description	Image
Clématite (<i>Clematis jackmanii</i> ' <i>Superba</i> ')	Grimpant	Plante grimpante à grandes fleurs pourpres violacées, et palissée sur une colonne.	
Cléome 'Color Fountain' (<i>Cleome hassleriana</i> ' <i>Colour Fountain</i> ')	Fleur	Floraison rose.	
Clérodendron du Japon (<i>Clerodendrum trichotomum</i>)	Buisson	Buisson ou arbrisseau dressé, feuillage caduc, vert moyen, fleurs blanches et odorantes issues de boutons rose foncé, suivies de baies décoratives bleues de la fin d'été à la mi-automne.	




Nom	Type	Description	Image
Cocotier <i>(Coco nucifera)</i>	Palmier	Jardins tropicaux, bord de plage.	
Cognassier du Japon <i>(Chaenomeles japonica)</i>	Buisson	Arbuste étalé, épineux, abondante floraison printanière rouge à rouge orangé, fruits jaunes.	
Cognassier du Japon 'Moerloosii' <i>(Chaenomeles speciosa 'Moerloosii')</i>	Buisson	cognassier du Japon, plante buissonnante à floraison rose et blanche.	




Nom	Type	Description	Image
Coleus <i>(Coleus blumei 'sanguineum')</i>	Intérieur	plante ornementale originaire d'Asie du sud-est (Indonésie, Java). Feuilles tricolores, opposées ovales, à dominante verte tachetée de rouge vin-framboise et jaune.	
Coléus à feuilles larges <i>(Coleus blumei 'Brightness')</i>	Fleur	Plante au feuillage coloré et au revers duveteux. Feuilles dentées.	
Commiphora <i>(Commiphora trothea)</i>	Arbre	Petit arbre sempervirent d'Afrique et d'Asie.	




Nom	Type	Description	Image
Copalme d'Amérique <i>(Liquidambar styraciflua)</i>	Arbre	Arbre à port conique ou étalé. Les feuilles caduques vert luisant virent à l'automne au pourpre rougeâtre.	
Cordia à feuilles ovales <i>(Cordia ovalis)</i>	Arbuste	Arbuste typique d'Afrique.	
Coréopsis à verticilles <i>(Coreopsis verticillata)</i>	Fleur	Coréopsis à floraison jaune.	




Nom	Type	Description	Image
Corète du Japon (<i>Kerria japonica</i>)	Buisson	Kerria, arbuste élégant à branches arquées à feuillage caduc vert vif, floraison jaune d'or au printemps.	
Cormier (<i>Sorbus domestica</i>)	Arbre	On confond souvent le cormier avec le sorbier des oiseleurs. Le cormier a des besoins en lumière élevés (même s'il préfère un léger ombrage au plein soleil), c'est un arbre à forte croissance.	
Cormier ou maskouabina (<i>Sorbus americana</i>)	Arbre	Sorbier d'Amérique (maska), arbuste de zones humides et des forêts de sapins.	




Nom	Type	Description	Image
Cornouiller discuté (<i>Cornus controversa</i>)	Arbre	Cornouiller à feuilles caduques, à rameaux établis horizontalement, floraison blanche en été, feuilles devenant pourpres en automne.	
Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	Arbuste	Arbuste rameux et dense, feuillage vert devenant pourpre rougeâtre à l'automne, fleurs jaune soufre en fin d'hiver, début printemps, fruits rouges à maturité.	
Cosmos 'Sensation' (<i>Cosmos 'Sensation'</i>)	Fleur	Floraison rose violacé.	




Nom	Type	Description	Image
Cotoneaster (<i>Cotoneaster franchetti</i>)	Buisson	Buisson semi-érigé, à port étalé, feuillage semi-persistant, buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Crocus (<i>Crocus sp.</i>)	Fleur		
Crotalaria griffe de lion (<i>Crotalaria agatiflora</i>)	Arbuste	Arbrisseau sempervirent de l'Afrique tropicale. Fleurs jaune-vert de l'été à l'automne.	




Nom	Type	Description	Image
Croton à feuilles larges <i>(Croton macrostachyus)</i>	Arbre	Arbre d'Afrique aux larges feuilles. Ecorce grise rugueuse. Fleurs jaunes-blanches au parfum sucré. Feuilles larges en forme de cœur.	
Cryptomère Sugi <i>(Cryptomeria japonica)</i>	Arbre	Conifère à croissance rapide, à port colonnaire ou conique.	
Cyprès d'Italie <i>(Cupressus sempervirens)</i>	Arbre	Conifère colonnaire dressé.	




Nom	Type	Description	Image
Cyprès de Lawson-a <i>(Chamaecyparis lawsonii-a)</i>	Arbre	Conifère dressé à rameaux plagiotropes et ramilles orthotropes.	
Cyprès de Lawson-b <i>(Chamaecyparis lawsonii-b)</i>	Arbre	Conifère à branches plagiotropes et rameaux orthotropes.	
Cyprès de Provence pyramidal <i>(Cupressus sempervirens 'Horizontalis')</i>	Arbre	Conifère dressé, pyramidal. Feuillage fonce gris-vert.	




Nom	Type	Description	Image
Cytise <i>(Laburnum x watereri 'Vossii')</i>	Arbre	Petit arbre à port étalé et à feuilles caduques, originaire des régions méditerranéennes et d'Europe centrale, le cytise est surtout planté comme arbre d'ornement, Les fleurs en grappes pendantes, sont de couleur jaune vif en fin de printemps et été.	
Dattier des Canaries <i>(Phoenix canarensis)</i>	Palmier		
Dattier du désert <i>(Balanites aegyptiaca)</i>	Arbre	Se trouve sur plusieurs types de sols en Afrique. Atteint une croissance maximale sur des sols alluviaux et se répand sur de larges zones géographiques. Bois jaune clair et branches épineuses.	




Nom	Type	Description	Image
Désespoir des singes (<i>Araucaria araucana</i>)	Arbre	Originaire du Chili et d'Argentine, c'est un curieux grand arbre persistant et épineux qui serait âgé de 60 millions d'années. Son nom provient d'un commentaire fait par un Anglais en 1880 qui lança qu'il serait un véritable désespoir pour les singes qui voudraient grimper au sommet.	
Draceana (<i>Draceana sp.</i>)	Intérieur	A planter en bacs.	
Épicéa (<i>Picea abies</i>)	Arbre	Port élancé, arbre de Noël.	




Nom	Type	Description	Image
Épicéa 'pyramidalis' <i>(Picea abies var. pyramidalis)</i>	Arbre	Port étalé.	
Épine du Christ ou arbre à chapeau <i>(Paliurus spinachristi)</i>	Arbuste	Arbuste à rameaux munis d'épines. Beau feuillage automnal. Grappes de fleurs jaune-verdâtre. Fruits en chapeaux chinois. Espèce méditerranéenne des garrigues.	
Épinette blanche <i>(Picea glauca)</i>	Arbre	Épinette du Canada, épicéa vert argenté.	




Nom	Type	Description	Image
Erable à sucre (forêt) <i>(Acer saccharum-c)</i>	Arbre	Erable franc, croissance en conditions forestières.	
Erable à sucre (isolé) <i>(Acer saccharum-a)</i>	Arbre	Erable franc, en croissance isolée.	
Erable argenté (forêt) <i>(Acer saccharinum-d)</i>	Arbre	Plaine de France, croissance en conditions forestières.	




Nom	Type	Description	Image
Erable argenté (isolé) <i>(Acer saccharinum-b)</i>	Arbre	Plaine de France, en croissance isolée.	
Erable champêtre (forme arbre) <i>(Acer campestre)</i>	Arbre	Arbre de couleur vert à croissance rapide souvent utilisé en coupe-vent.	
Erable champêtre forme taillis <i>(Acer campestre forme taillis)</i>	Arbre	C'est un arbre pouvant atteindre une vingtaine de mètres, à écorce grise, fissurée, à petites feuilles caduques, utilisé dans les parcs et les jardins , le bois en menuiserie est connu pour sa résistance aux insectes	




Nom	Type	Description	Image
Erable du Japon (<i>Acer palmatum</i>)	Arbre	Erable du Japon à port étalé, remarquable pour la coloration de ses feuilles au printemps et en automne.	
Erable glabre (<i>Acer glabrum</i>)	Arbre	Petit arbre de forme arbustive. Jeunes rameaux érigés d'un rouge écarlate attractif. Branches assez denses. Coloration jaune clair en automne.	
Erable negundo ou à feuilles de frêne (<i>Acer negundo</i>)	Arbre	Isolé ou parcs.	




Nom	Type	Description	Image
Erable plane (<i>Acer platanoides</i>)	Arbre	Arbre vigoureux à port étalé, grandes feuilles caduques lobées, vert vif, devenant jaunes ou oranges en automne.	
Erable rouge (<i>Acer rubrum</i>)	Arbre	Isolé, bosquets, ombrage des maisons et jardins.	
Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	Arbre		




Nom	Type	Description	Image
Eucalyptus (<i>Eucalyptus sp.</i>)	Arbre	Espèce la plus importante de couvert forestier en Australie. Généralement grand, avec un seul tronc, bien que certaines espèces en possèdent plusieurs.	
Eucalyptus commun (<i>Eucalyptus globulus</i>)	Arbre	Originaire d'Australie. Il est largement cultivé et peut croître jusqu'à 30-55 m de haut. Il s'est bien acclimatée dans d'autre partie du monde. Le gommier bleu a été proclamé comme emblème floral de Tasmanie. Ne pas dépasser 38 ans en 3D, pas de limite dans les autres modes.	
Euphorbe bussei (<i>Euphorbia bussei</i>)	Arbre		




Nom	Type	Description	Image
Euphorbe candelabre (arbre) <i>(Euphorbia candelabrum)</i>	Arbre		
Faux manguier à parfum, Arbre à reserpine, Arbre à quinine <i>(Rauvolfia caffra)</i>	Arbre	Arbre sempervirent élevé de l'Afrique du Sud. Fleurs parfumées. Croissance rapide.	
Févier d'Amérique <i>(Gleditsia triacanthos inermis 'Skyline')</i>	Arbre	Inerme doré.	




Nom	Type	Description	Image
Févier d'Amérique ou carouge à miel <i>(Gleditsia triacanthos inermis 'Sunburst')</i>	Arbre	Inerme doré.	
Ficus à écorce jaune, ficus à feuilles de mûrier <i>(Ficus lutea)</i>	Arbre	Originnaire de la forêt basse littorale à l'Est du Cap et au nord de l'Afrique tropicale, le Figuier pousse jusqu'à 15 m. De tous les figuiers indigènes, le Ficus lutea est celui qui a les plus grandes feuilles.	
Ficus benjamina <i>(Ficus benjamina)</i>	Intérieur	Arbuste ornemental à port pleureur, feuilles ovales persistantes.	




Nom	Type	Description	Image
Ficus benjamina (forme tropicale haie libre) <i>(Ficus benjamina</i> <i>(trop.))</i>	Arbre	Ficus benjamina (forme tropicale haie libre)	
Ficus sycamore <i>(Ficus sycomorus)</i>	Arbre	Apprécie les endroits humides comme les marais, les rivières et les cours d'eau, mais s'adapte aussi à la savane. Arbre à contrefort, qui porte de grands glomérules de succulentes et grosses figes.	
Figuier étrangleur, figuier à petits fruits <i>(Ficus thonningii)</i>	Arbre	Tout d'abord sous forme d'une petite liane sur de grands arbres, elle épaissit et laisse apparaître des branches avec des racines d'appui qui étranglent éventuellement l'arbre hôte.	




Nom	Type	Description	Image
Filaire à feuilles étroites ou à feuilles d'olivier (<i>Phyllirea angustifolia</i>)	Arbuste	Arbuste parfois buissonnant, feuilles persistantes à face inférieure argentée rappelant celles de l'olivier, floraison discrète suivie de baies bleutées.	
Filao (<i>Casuarina equisetifolia</i>)	Arbre		
Fleurs à massifs (<i>Flos indeterminatus</i>)	Fleur	Fleurs de massifs, la touffe se développe par rhizome.	




Nom	Type	Description	Image
Folle avoine rouge (<i>Themeda triandra</i>)	Herbe	La plus commune des herbes graminiformes de la savane africaine. Plante vivace touffetée. De 30 à 90 cm de haut. Feuilles duveteuses à lisses, bleues ou vertes.	
Forsythia ou mimosa de Paris (<i>Forsythia x intermedia</i>)	Buisson	Arbuste touffu, taillé annuellement, fleurs jaunes au printemps.	
Fothergille (<i>Fothergilla major</i>)	Buisson	Buisson à floraison blanche.	




Nom	Type	Description	Image
Fougère arborescente de plaine - NAHE <i>(Angiopteris evecta)</i>	Indéfini	Native de la Polynésie, le rhizome forme un tronc massif et en quelque sorte sphérique pouvant atteindre jusqu'à 60-90 cm de haut et 45 cm de diamètre. Les tiges peuvent atteindre jusqu'à 2m.	
Fougère femelle <i>(Athyrium filix femina)</i>	Indéfini	Fougère femelle, fougère de sous-bois ou talus ombragés.	
Fougère mâle <i>(Dryopteris pseudomonas)</i>	Indéfini	Fougère mâle, fronde persistante, port élané.	




Nom	Type	Description	Image
Frêne à fleurs (<i>Fraxinus ornus</i>)	Arbre	Frêne commun ou Grand frêne	
Frêne blanc (<i>Fraxinus americana</i>)	Arbre	Frêne franc d'Amérique, en futaies aérées ou en bosquets.	
Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Arbre	Arbre vigoureux à port étalé. Les feuilles pennées, vert foncé deviennent parfois jaune en automne.	


Nom	Type	Description	Image
Frêne oxyphylle (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Arbre	Petit frêne méditerranéen.	
Frêne taillé (<i>Fraxinus excelsior</i> (<i>trimmed</i>))	Arbre	Rejet de souche de frêne.	
Fromager (<i>Bombax ceiba</i>)	Arbre	Les fromagers sont de grands arbres pouvant atteindre une hauteur de 70 mètres, ce qui les fait émerger au dessus des forêts tropicales.	




Nom	Type	Description	Image
Genêt purgatif (<i>Cytisus purgans</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant fastigié. Fleurs jaune d'or au printemps.	
Genévrier commun rampant (<i>Juniperus communis 'Prostrata'</i>)	Buisson	Conifère en buisson étalé utilisé en horticulture comme plante ornementale. On le trouve de l'Arctique jusqu'à la zone tempérée en Asie en Europe et en Amérique.	
Gingembre jaune (<i>Hedychium flavescens</i>)	Indéfini	Plante au parfum délicieux, très sucré, originaire de l'Inde Himalayenne, elle a maintenant colonisé diverses régions tropicales dont l'île de la Réunion où elle envahit les sous-bois humides et les ravines, et prenant la place des espèces indigènes.	




Nom	Type	Description	Image
Gingembre parfumé (<i>Hedychium gardnerianum</i>)	Intérieur	"Plante que l'on trouve dans les régions tropicales, de la Martinique à Hawaii en passant par la Réunion. Dans ces îles, elle est l'espèce introduite la plus naturalisée, au point qu'elle en devient envahissante en certains endroits.	
Gueule de loup (<i>Antirrhinum majus</i> 'Wedding Bells')	Fleur	Muflier à fleurs jaunes.	
Hamamélis (<i>Hamamelis mollis</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à floraison hivernale, limité en hauteur comme par une taille de conduite.	




Nom	Type	Description	Image
Hélianthème faux alysse <i>(Helianthemum nummularium)</i>	Herbe	Buisson à port étalé et feuillage persistant gris. Porte, en été, une succession de fleurs jaunes en forme de coupe.	
Herbe à éléphant <i>(Panicum maximum)</i>	Herbe	Herbe à éléphant, grande graminée tropicale décorative à panicules étalées.	
Herbe-a <i>(Herba indeterminata-a)</i>	Herbe	Herbe, touffe de graminées à grandes feuilles.	




Nom	Type	Description	Image
Herbe-b <i>(Herba indeterminata-b)</i>	Herbe	Herbe, touffe de graminées à feuilles courtes.	
Herbe-c <i>(Herba indeterminata-c)</i>	Herbe	Herbe, graminées à feuillage dense, alignées en bande.	
Herbe-e <i>(Herba indeterminata-e)</i>	Herbe	Graminée à épis.	




Nom	Type	Description	Image
Hêtre commun-a (<i>Fagus sylvatica-a</i>)	Arbre	Jeune hêtre commun, densité de type forestier.	
Hêtre commun-b (<i>Fagus sylvatica-b</i>)	Arbre	Grand hêtre de forêt en conditions de forte densité.	
Hibiscus rose de Chine (<i>Hibiscus rosasinensis</i>)	Arbuste		




Nom	Type	Description	Image
Hinoki <i>(Chamaecyparis obtusa)</i>	Arbre	Faux cyprès "Hinoki", conifère de forme conique régulière. Espèce couramment cultivée comme plante d'ornement dans les parcs et jardins et en Asie autour des temples.	
Hortensia <i>(Hydrangea macrophylla)</i>	Buisson	Arbuste buissonnant à feuilles caduques, taillé, à inflorescences en dôme, blanches, rosées, pourpre ou bleues. On trouve des hortensias très couramment dans des jardins partout dans le monde, mais ils sont originaires de Chine.	
Hortensia grim pant <i>(Hydrangea petiolaris)</i>	Grimpant	Originaires de l'île russe Sakhaline, de Corée et du Japon. Plante grimpante qui s'accroche toute seule et parvient à couvrir des surfaces importantes. Feuilles caduques, fleurs blanches en été, plante palissée sur une colonne.	




Nom	Type	Description	Image
Houx <i>(Ilex aquifolia)</i>	Arbre	Arbre ou arbuste à feuillage persistant, vert foncé, très ramifié et dressé.	
Houx du Japon <i>(Ilex rotundifolia)</i>	Arbre	Arbre à feuillage persistant. Les feuilles sont vert sombre, les fruits rouges apparaissent en automne et hiver.	
If des bois <i>(Taxus baccata)</i>	Arbre	Conifère à croissance lente, à cime large.	




Nom	Type	Description	Image
Immortelle de Virginie (<i>Anaphalis margaritacea</i>)	Fleur	Immortelle à fleurs blanches (toujours fleurie).	
Ipomée spatulée (<i>Ipomoea spathulata</i>)	Buisson		
Iris hollandais (<i>Iris lusitanica x tingitana</i>)	Fleur	Iris bulbeux à floraison bleue.	




Nom	Type	Description	Image
Ixora, Arbuste corail <i>(Ixora coccinea)</i>	Buisson	Arbrisseau touffu qui produit des fleurs jaune, rose, orange ou rouge. Fleur nationale du Suriname.	
Jasmin d'hiver <i>(Jasminum nudiflorum)</i>	Buisson	Arbuste buissonnant à branches arquées, feuillage caduc vert sombre, fleurs jaune vif en fin d'hiver ou début de printemps, sur des pousses vertes.	
Jonquille <i>(Narcissus jonquilla)</i>	Fleur	Jonquille, plante bulbeuse à floraison printanière.	



Nom	Type	Description	Image
Jujubier de la hyène, Jujubier à griffes <i>(Ziziphus mucronata)</i>	Arbre	Arbre qui mesure entre 5 et 10 m. Branches couvertes de nombreuses petite épines. Se trouve au bord des cours d'eau.	
Lamier argenté <i>(Lamium maculatum)</i>	Herbe	Lamier argenté, plante tapissante à feuilles persistantes.	
Latanier rouge <i>(Latania lontaroides)</i>	Palmier	Palmier présent autrefois dans plusieurs îles des Mascareignes et qui ne l'est plus aujourd'hui de façon naturelle qu'à la Réunion. Pouvant atteindre 12 mètres de haut.	




Nom	Type	Description	Image
Laurier cerise (<i>Prunus laurocerasus</i>)	Arbuste	Laurier cerise, arbuste à abondante floraison printanière blanche, feuilles persistantes.	 A 3D rendered image of a Laurier cerise shrub, showing a dense, rounded bush of dark green, glossy leaves against a plain white background.
Laurier des montagnes (<i>Kalmia latifolia</i>)	Buisson	Laurier rose américain, buisson d'altitude à floraison rose.	 A photograph of a Laurier des montagnes bush in full bloom. The bush is covered in numerous small, light pink flowers. It is situated in a garden bed with a grey wooden fence in the foreground and a green lawn in the background.
Laurier du Portugal ou laurier palme (<i>Prunus lusitanica</i>)	Buisson	Arbuste dense, buissonnant à port étalé, fleurs blanches au début de l'été suivies de fruits rouges.	 A 3D rendered image of a Laurier du Portugal shrub, showing a dense, rounded bush of dark green, glossy leaves against a plain white background.




Nom	Type	Description	Image
Laurier rose (<i>Nerium oleander</i>)	Buisson	Buisson fleuri limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Laurier-tin (<i>Viburnum tinus</i>)	Arbuste	Arbuste dense, touffu et à feuillage persistant, vert sombre. En fin d'hiver et au printemps, il produit d'abondantes cymes terminales de petites fleurs blanches issues de boutons roses, un floraison automnale est parfois possible.	
Lavande (<i>Lavandula angustifolia</i>)	Fleur	Lavande, sous-arbrisseau à floraison estivale.	




Nom	Type	Description	Image
Liane à lait (<i>Allamanda cathartica</i>)	Buisson		
Liard ou cotonnier (<i>Populus deltoides</i>)	Arbre	Liard (cotonnier), gros peuplier des berges de rivière et des plaines alluviales.	
Lierre rampant-a (<i>Hedera helix</i> 'Glacier')	Herbe	Plante couvre-sol retombante.	




Nom	Type	Description	Image
Lierre rampant-b <i>(Hedera helix var.)</i>	Herbe	Lierre anglais rampant.	
Lilas commun <i>(Syringa vulgaris)</i>	Arbuste	Arbuste ou petit arbre à feuilles ovales, au début de l'été panicules de fleurs blanches à violette.	
Lilas des Indes <i>(Melia azedarach)</i>	Arbre	Arbre à feuillage caduc, à port étalé. Feuilles vert foncé, au printemps, fleurs roses lilas, en étoile, suivies en automne par des fruits jaune orange pale.	




Nom	Type	Description	Image
Lin de Narbonne <i>(Linum narbonense)</i>	Fleur	Plante semi-persistante formant des touffes, feuilles vert grisâtre, abondante floraison estivale bleu foncé.	
Lin textile <i>(Linum usitatissimum)</i>	Fleur		
Luzerne cultivée <i>(Medicago sativa)</i>	Fleur		




Nom	Type	Description	Image
Lys blanc (<i>Lilium candidum</i>)	Fleur	Lys à grandes fleurs blanches retombantes.	
Lys carnaval (<i>Lilium bulbiferum</i>)	Fleur	Lys carnaval, lys à floraison dressée très colorée.	
Magnolia yulan (<i>Magnolia heptapeta</i> (syn. <i>denudata</i>))	Arbre	Arbre Japonais à port étalé, feuillage caduc, porte au printemps de nombreuses fleurs blanches.	




Nom	Type	Description	Image
Mahonia-c (<i>Mahonia x media</i> 'Charity')	Buisson	Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Mahonia-m (<i>Mahonia aquifolium</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant à feuillage persistant, feuilles rouges et baies bleues noires en hiver.	
Maïs cultivé (<i>Zea mays</i>)	Herbe		




Nom	Type	Description	Image
Manguier - VI POPAA (<i>Mangifera indica</i>)	Arbre		
Marronnier du Japon (<i>Aesculus turbinata</i>)	Arbre	Arbre à inflorescences blanches en "pain de sucre".	
Marronnier-a (<i>Aesculus x hippocastaneum-a</i>)	Arbre	Arbre jeune isolé au stade adulte sans taille souvent nécessite d'être taillé (voir marronnier b ou marronnier d).	




Nom	Type	Description	Image
Marronnier-b (<i>Aesculus x hippocastaneum-b</i>)	Arbre	Plante simulant une taille périodique du Marronnier-a souvent présent en ville le long des avenues.	
Marronnier-c (<i>Aesculus x hippocastaneum-c</i>)	Arbre	marronnier rouge simulant une taille périodique	
Marronnier-d (<i>Aesculus x hippocastaneum-d</i>)	Arbre	Grand arbre isolé simulant une taille périodique du Marronnier-a souvent trouvé en milieu urbain dans les parcs et jardins.	




Nom	Type	Description	Image
Masette noire (<i>Typha latifolia</i>)	Indéfini	Silhouette graminée, plante d'eau.	
Mélèze d'Europe (<i>Larix decidua</i>)	Arbre	Conifère à feuillage caduc et à croissance rapide, port conique à l'état jeune, s'élargissant ensuite.	
Mélèze laricin ou d'Amérique (<i>Larix laricina</i>)	Arbre	Epinette rouge (violon), conifère à aiguilles caduques.	




Nom	Type	Description	Image
Merisier <i>(Prunus avium)</i>	Arbre		
Merisier <i>(Prunus avium)</i>	Arbre	Merisier	
Micocoulier <i>(Celtis australis)</i>	Arbre	Arbre méditerranéen à croissance lente.	




Nom	Type	Description	Image
Morinda - NONO (<i>Morinda citrifolia</i>)	Arbuste	Cultivé en Polynésie l'arbuste, <i>Morinda citrifolia</i> , appartient à l'une des familles comportant le plus de plantes médicinales.	
Muguet (<i>Convallaria majalis</i>)	Fleur		
Mûrier à papier (<i>Broussonetia papyrifera</i>)	Arbuste	Arbre d'ornement à feuille caduc. Fleurit au printemps.	




Nom	Type	Description	Image
Myoporum (<i>Myoporum laetum</i>)	Arbre	Originare de Nouvelle Zélande, arbre persistant de 3 à 9 m de haut, il est intéressant pour la constitution de haie par sa croissance très rapide et son feuillage dense.	
Myrtillier commun, myrtille, airelle, brimbelle (<i>Vaccinium myrtillum</i>)	Herbe	Sous-arbrisseau traçant à feuilles caduques. Petites feuilles ovales, coriace, vert clair. Donne au début de l'été des fleurs en grelot pendant, rose pale, suivies de fruits globuleux, noirs à pruine bleutée.	
Nartheccium (<i>Nartheccium sp.</i>)	Fleur	Touffe de nartheccium.	




Nom	Type	Description	Image
Nepeta (<i>Nepeta mussini</i>)	Herbe	Nepeta, plante tapissante à floraison bleue.	
Nerprun (forme buisson) (<i>Rhamnus alaternus-a</i>)	Buisson	Buisson feuillu, fourni, en forme d'arche, avec d'étroites feuilles argentées et des baies orange soutenu (usage courant).	
Nerprun (forme tige) (<i>Rhamnus alaternus-b</i>)	Arbuste	Arbrisseau caractéristique des garrigues méditerranéennes, Ses minuscules fleurs jaunâtres apparaissent au mois de mars, parfois avant. Ses fruits sont des baies noires.	




Nom	Type	Description	Image
Noisetier de Turquie <i>(Corylus colurna)</i>	Arbre	Arbre conique à feuilles caduques ovales.	
Noyer commun <i>(Juglans regia)</i>	Arbre	Le noyer, est également appelé noyer commun ou noyer royal, en référence à son nom scientifique. C'est un arbre de grande taille à feuillage caduc, originaire d'Europe de l'Est, mais que l'on trouve poussant spontanément sur les contreforts de l'Himalaya, ou encore en Chine et en Iran. En Europe, cet arbre est cultivé depuis longtemps pour son bois et ses fruits.	
Noyer noir <i>(Juglans nigra)</i>	Arbre	Egalement appelé Noyer noir. Le plus caractéristique des arbres du Midwest américain. Arbre élevé avec un large couvert.	




Nom	Type	Description	Image
Noyer tendre (<i>Juglans cinerea</i>)	Arbre	Noyer à beurre en futaies.	
Olivier (Européen) (<i>Olea europaea</i>)	Arbre	Arbre fruitier méditerranéen simulant un vieille Olivier. Un olivier peu vivre très vieux, les unités d'âge sont donc des unités de dimensions et ne correspondent pas à l'âge physiologique réel.	
Olivier de Bohême, chalef (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)	Arbre	C'est un arbuste souvent planté dans les jardins en Provence. Originaire d'Asie l'olivier de bohême est un grand arbrisseau à feuillage caduc qui peut atteindre 7 à 8 mètres. Arbuste touffu ou petit arbre étalé. Feuilles caduques étroites, gris argenté. Ne pas dépasser 25 ans en 3D, pas de limite dans les autres modes.	




Nom	Type	Description	Image
Orme champêtre <i>(Ulmus campestris)</i>	Arbre	Arbre à port large et arrondi. Feuilles caduc en cymes globulaires au printemps, samares à aile large.	
Orme du Japon-a <i>(Zelkova serrata-a)</i>	Arbre	Arbre à feuillage caduc à port étalé, les feuilles devenant jaunes ou oranges en automne. Arbre adulte à vieux.	
Orme du Japon-b <i>(Zelkova serrata-b)</i>	Arbre	Arbre à feuillage caduc à port étalé, les feuilles deviennent jaunes ou oranges en automne. Arbre jeune à adulte.	




Nom	Type	Description	Image
Orpin géant <i>(Sedum telephium)</i>	Fleur	Sedum vivace à souche ligneuse, feuilles persistantes en rosette basale; cymes de fleurs étoilées en été.	
Ortie brûlante géante (en arbre) <i>(Obetia pinnatifida)</i>	Arbuste	Se trouve à basse altitude. Pousse généralement en buisson peu touffu. Feuilles couvertes d'épines creuses qui délivre un poison lorsqu'on les touche.	
Pachysandra du Japon <i>(Pachysandra terminalis)</i>	Herbe	Petit arbuste vivace à port rampant, les feuilles sont groupées à l'extrémité des rameaux. En début d'été, grappes de petites fleurs blanches.	




Nom	Type	Description	Image
Palette de peintre (<i>Caladium bicolor</i>)	Intérieur	Plante commune vivace à tubercule. Feuilles sagittées. Feuillage aux couleurs brillantes. Apprécie une atmosphère chaude et humide.	
Palétuvier rouge (<i>Rhizophora mangle</i>)	Arbre	Cet arbre de 5 à 20 m constitue l'espèce pionnière de la mangrove. Elle se rencontre dans les zones inondées. Ses branches et tronc émettent de très nombreuses racines aériennes (racines-échasses) qui s'enfoncent dans la vase ce qui assure la stabilité de l'arbre. Les feuilles sont simples, épaisses et opposées. Les fleurs sont petites à calice jaune et pétales épais jaunâtres. Le fruit pend, la graine germe sur l'arbre même en émettant une longue radicule pointue.	
Palmier "bouteille" (<i>Hyophorbe lagenicaulis</i>)	Palmier	Palmier originaire des îles Mascareignes (océan Indien).	




Nom	Type	Description	Image
Palmier (Phœnix) <i>(Phoenix sp.)</i>	Palmier	Palmier phœnix méditerranéen.	
Palmier à sucre <i>(Caryota urens)</i>	Palmier	Originnaire de l'Asie du sud-est (Birmanie, sud de l'Inde, Malaisie, Philippines), il pousse isolé. Sa sève est utilisée pour la confection du sucre de palme.	
Palmier à tronc rouge <i>(Cyrtostachys renda)</i>	Palmier	Petit palmier à touffe érigée originaire de Malaisie.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier Arenga (<i>Arenga pinnata</i>)	Palmier	Palmier à port unique de Malaisie.	
Palmier chamaerops (<i>Chamaerops sp.</i>)	Palmier	Arbre isolé.	
Palmier d'Arec (<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>)	Palmier	Persistant, feuilles pennées arquées	




Nom	Type	Description	Image
Palmier d'intérieur- b <i>(Phoenix humilis)</i>	Intérieur	Originaire d'Asie, très répandu au Viêt-Nam et le long des rives du fleuve Mékong au Laos, ce palmier ne dépasse pas 2 mètres de haut.	
Palmier dattier sauvage <i>(Phoenix reclinata)</i>	Palmier	Situé en Afrique équatoriale. Palmier à croissance rapide qui peut atteindre 7.5 mètres de haut. Feuilles pennées et tronc orange à sa base.	
Palmier de Chine <i>(Trachycarpus fortunei)</i>	Palmier	C'est l'espèce la plus commune parmi les palmiers rustiques, elle peut résister à des températures négatives jusqu'à -15/-20°C. S'adapte à une grande diversité de climats, mais préfère les régions humides. Il craint le manque d'eau et les grosses chaleurs, plus que le froid.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier de Guadeloupe <i>(Brahea edulis)</i>	Palmier	Originaire de la Guadeloupe. Atteint 10 m de haut. Grandes feuilles palmées vertes en éventail. Fruits jaunes ovoïdes.	
Palmier de Roebelen, Palmier dattier nain <i>(Phoenix roebelinii)</i>	Palmier	Originaire de l'Inde et de l'Asie du Sud-est, c'est un petit palmier décoratif qui ne dépasse pas 2 mètres de haut. La faible taille et la fragilité de ce Phœnix le destine particulièrement aux intérieurs et vérandas.	
Palmier de Washington <i>(Washingtonia filifera)</i>	Palmier	Palmier à grandes feuilles palmées dont les extrémités des lobes forment des fils. Port érigé et stipe unique.	




Nom	Type	Description	Image
Palmier femelle nain <i>(Rhapis humilis)</i>	Palmier	Originaire du sud de la Chine, palmier arbustif comparable à du bambou, pourvu de nombreuses grappes, de 5 ou 6 m de haut. Ses feuilles empalmées peuvent soutenir jusqu'à 25 segments.	
Palmier méditerranéen <i>(Chamaerops humilis)</i>	Palmier	Le Chamaerops humilis est aujourd'hui l'un des palmiers les plus cultivés en Europe du Sud. Il résiste au froid et à la sécheresse. Plante ornementale très utilisée dans les parcs et jardins.	
Palmier Royal (cocos) <i>(Arecastrum romanzoffianum)</i>	Palmier		




Nom	Type	Description	Image
Palmier royal de Cuba <i>(Roystonea regia)</i>	Palmier	Palmier à stipe unique originaire des Caraïbes.	
Palmier Washingtonia <i>(Washingtonia robusta)</i>	Palmier		
Pandanus, baquois - FARA, HINANO <i>(Pandanus odoratissimus)</i>	Indéfini	<p>Le Fara, Pandanus odoratissimus, arbre indigène du sud-est asiatique est le plus utilisé en Polynésie après le cocotier. Il pousse surtout sur les plages et terrains sablonneux de bord de mer, mais également, de manière moins alambiquée, en montagne, jusqu'à 800 m d'altitude. Il est aisément reconnaissable par ses racines aériennes qui poussent sur le tronc en un faisceau pyramidal, et ses feuilles qui tombent en grappes touffues à l'extrémité des branches.</p>	




Nom	Type	Description	Image
Papyrus souchet (<i>Cyperus involucratus</i>)	Herbe		
Parasol chinois (<i>Firmiana simplex</i>)	Arbre	Arbre robuste à grandes feuilles caduques lobées, écorce verte.	
Pâturin (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	Herbe	Pâturin, touffe de graminées décoratives.	




Nom	Type	Description	Image
Paulownia (<i>Paulownia tomentosa</i>)	Arbre	Originaire du Nord de la Chine, c'est un arbre à croissance rapide qui est utilisé pour son bois en Chine, où il peut se rencontrer dans les décombres. Le Paulownia s'utilise en alignement ou en isolé et il supporte bien la taille et la pollution.	
Pavot d'Islande (<i>Papaver nudicaule</i>)	Fleur	Pavot vivace à floraison variée.	
Pavot de Californie (<i>Eschscholtzia californica</i>)	Fleur	Pavot de Californie à floraison orange vif.	




Nom	Type	Description	Image
Pavot épineux du Mexique <i>(Argemone mexicana)</i>	Fleur	Plante annuelle avec une sève jaune brillant, des feuilles alternes, dentées et épineuses. Les fleurs sont à 6 pétales de couleur jaune vif	
Pensée cultivée <i>(Viola x wittrockiana)</i>	Fleur		
Perce-neige <i>(Galanthus niva)</i>	Fleur		




Nom	Type	Description	Image
Persea thunbergii (<i>Machilus thunbergii</i>)	Arbre	Grand arbre persistant situé en Chine, Japon et Corée. N'aime pas l'ombre. Provient des forêts chaudes du Japon.	
Pervenche (<i>Vinca major</i>)	Herbe	Plante tapissante à feuilles persistantes.	
Pétunia bleu (<i>Petunia 'Resisto'</i>)	Fleur	Massifs, bordures mixtes ou jardinières.	




Nom	Type	Description	Image
Peuplier blanc (<i>Populus alba</i>)	Arbre	Usage : Parcs ou jardins.	
Peuplier d'Italie (<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> ')	Arbre	Arbre isolé ou d'alignement.	
Peuplier de Chine, peuplier du Yunnan (<i>Populus yunnanensis</i>)	Arbre	Arbre érigé ou semi-étalé à branches souples. Feuillage lâche et clair devenant jaune à l'automne.	




Nom	Type	Description	Image
Peuplier hybride du Canada <i>(Populus deltoides x nigra)</i>	Arbre	Arbre à feuille caduc du Canada.	
Peuplier noir <i>(Populus nigra)</i>	Arbre	Plantations forestières, aires de repos.	
Peuplier tremble <i>(Populus tremula)</i>	Arbre	Parcs ou jardins.	




Nom	Type	Description	Image
Pin argenté <i>(Pinus monticola)</i>	Arbre	Originaire des montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord, en particulier dans les Montagnes Rocheuses, la chaîne des Cascades, la Sierra Nevada et les Chaînes côtières , il a une croissance régulière jusqu'à 30 à 50 m et peut atteindre exceptionnellement 70 m. Ne pas dépasser 25 ans en 3D, pas de limite dans les autres modes.	
Pin blanc ou pin du Lord <i>(Pinus strobus)</i>	Arbre	Grand pin de plaine et basse montagne.	
Pin d'Alep <i>(Pinus halepensis)</i>	Arbre	Conifère conique, à cime s'élargissant, avec des aiguilles vert parfois gris vert.	




Nom	Type	Description	Image
Pin de l'Himalaya (<i>Pinus wallichiana</i>)	Arbre	Originaire de la région de l'Himalaya , il pousse en haute altitude (1800-4300 m) rarement en dessous de 1200 m , il pousse dans des climats tempérés avec des hivers secs et des étés humides. Il est aussi utilisé en zones méditerranéennes pour sa rusticité.	
Pin de montagne, pin de Mongolie (<i>Pinus mugo</i> (<i>montana</i>) 'Mungho')	Arbuste	Conifère arbustif à taille variable. Feuilles en aiguilles de vert vif à vert foncé.	
Pin gris (<i>Pinus banksiana</i>)	Arbre	On le trouve dans la forêt boréale en Amérique du Nord à l'est des Montagnes rocheuses ce n'est pas un très grand pin il atteint la taille de 9 à 12 m. Ne pas dépasser 35 ans en 3D, pas de limite dans les autres modes.	




Nom	Type	Description	Image
Pin jaune des Montagnes Rocheuses <i>(Pinus ponderosa)</i>	Arbre	Originaire de l'ouest de l'Amérique , il peut atteindre une taille de 40 à 50 m. C'est la variété de pin la plus répandue dans l'ouest des Etats Unis Ne pas dépasser 35 ans en 3D, pas de limite dans les autres modes.	
Pin laricio <i>(Pinus nigra sp. laricio)</i>	Arbre	Originaire de Corse. Arbre parfaitement droit qui peut atteindre 40 m de haut et vieillir jusqu'à 600 ans.	
Pin maritime <i>(Pinus pinaster)</i>	Arbre	Conifère persistant à aiguilles longues et croissance lente.	




Nom	Type	Description	Image
Pin noir d'Autriche <i>(Pinus nigra)</i>	Arbre	Parcs ou plantations.	
Pin noir du Japon taillé <i>(Pinus thunbergii)</i>	Arbre	Pin taillé "à la japonaise".	
Pin parasol, pin pignon <i>(Pinus pinea)</i>	Arbre	Conifère à cime arrondie, en parasol, tronc apparemment court.	




Nom	Type	Description	Image
Pin rouge <i>(Pinus resinosa)</i>	Arbre	Originare du nord-est de l'Amérique du Nord. Ce pin peut atteindre 20 à 35 m avec un tronc de 1 m de diamètre. Ne pas dépasser 39 ans en 3D, pas de limite dans les autres modes.	
Pin rouge du Japon taillé <i>(Pinus densiflora)</i>	Arbre	Pin taillé "à la japonaise".	
Pin sylvestre <i>(Pinus sylvestris)</i>	Arbre	Arbre de plantation forestière.	




Nom	Type	Description	Image
Plante à pétrole <i>(Euphorbia tirucalli)</i>	Buisson	Arbrisseau commun succulent d'Afrique, qui s'adapte à de nombreux endroits, y compris sur les rives, ou les plaines sèches. Souvent utilisé comme barrage naturel pour le bétail.	
Platane taillé <i>(Platanus x acerifolia-c)</i>	Arbre	Arbre isolé taillé en gobelet, sur les places ou esplanades.	
Platane taillé (grand) <i>(Platanus x acerifolia-d)</i>	Arbre	Grand platane taillé.	




Nom	Type	Description	Image
Platane-a (<i>Platanus x acerifolia-a</i>)	Arbre	Usage : Arbre isolé ou d'alignement.	
Polygonum rouge (<i>Polygonum affine</i> 'Darjeeling red')	Herbe	Polygonum rouge, plante tapissante à feuilles caduques.	
Pometier à petits fruits (<i>Malus baccata</i> 'Columnaris')	Arbuste	Pometier à petits fruits, à port érigé.	




Nom	Type	Description	Image
Pometier Makamik <i>(Malus x 'Makamik')</i>	Arbuste	Isolé, squares ou alignements urbains.	
Pruche du Canada <i>(Tsuga canadensis)</i>	Arbre	Pruche (haricot), conifère de 20-25 mètres à flèche retombante. il est employé dans la grosse charpente, la construction des ponts et des pavages, dans la fabrication des caisses, des lattes et du bardeau. L'industrie de la tannerie utilise l'écorce de la pruche, qui est très riche en tannin.	
Prunier (ou pêcher) décoratif <i>(Prunus x persica)</i>	Arbre	Prunier décoratif, arbre d'ornement.	




Nom	Type	Description	Image
Prunier décoratif-w (<i>Prunus x padus</i>)	Arbre	Arbre d'ornement non taillé.	
Queue de lapin (<i>Pennisetum mezianum</i>)	Herbe	Herbe graminiforme touffetée qui atteint environ 1 mètre. Fleurit dans un sol sec et pauvre en plein soleil. Souvent trouvée dans la savane africaine.	
Raisin d'ours, busserole (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)	Buisson	Arbuste à feuillage persistant, rampant, parfois à branches arquées. Petites feuilles vert vif, en été fleurs blanches suivies de fruits globuleux rouges.	




Nom	Type	Description	Image
Rince bouteille pleureur (<i>Callistemon viminalis</i>)	Arbre	Arbuste persistant à feuilles alternes, simples, entières et lancéolées. Ses fleurs forment des épis terminaux en forme de goupillon jusqu'à 12 cm de long. Il est originaire d'Australie, mais se cultive très bien.	
Riz (<i>Oryza sativa</i>)	Herbe		
Romarin commun (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	Buisson	Arbuste buissonnant, dense et touffu, à feuilles persistantes étroites. Petites fleurs, de bleu violacé à bleu, de la mi-printemps au début de l'été, et parfois en automne.	




Nom	Type	Description	Image
Ronce décorative (<i>Rubus calcynoides</i>)	Buisson	Plante sarmenteuse à feuillage semi-persistant, floraison rose au printemps.	
Rosier ancien-c (<i>Rosa 'Golden Wings'</i>)	Buisson	Rosier ancien, rosier arbustif touffu et étalé. Fleurs jaunes très retombantes, fruits orangés en hiver. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Rosier ancien-d (<i>Rosa 'Nevada'</i>)	Buisson	Rosier ancien, buisson arbustif à floraison remontante blanche. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	




Nom	Type	Description	Image
Rosier grimpant (<i>Rosa 'New Dawn'</i>)	Grimpant	Rosier grimpant, feuilles caduques, bouquet de fleurs rose pale.	
Rosier polyantha (<i>Rosa 'Yesterday'</i>)	Buisson	Rosier polyantha, buisson à végétation basse et compacte.	
Sabal (<i>Sabal palmetto</i>)	Palmier	Largement répandu aux Bahamas, à l'ouest de Cuba et au sud-est des Etats Unis, son tronc mesure de 8 à 20 mètres de hauteur et jusqu'à 35cm de diamètre, de couleur grise. Les bases fendues des anciens pétioles persistent longtemps sur le stipe et forment un motif réticulé caractéristique du genre. Sa couronne est composée de 15 à 30 feuilles très costapalmées, de 1 à 1,5 m de large, de couleur verte. Il pousse dans les sols humides près de la mer, mais également dans les dunes, le long des rivières ainsi que dans les zones humides et inondées.	




Nom	Type	Description	Image
Sapin baumier <i>(Abies balsamea)</i>	Arbre	Originaire d'Amérique du Nord , ce sapin peut atteindre 15 à 20 mètres de hauteur. Le bois est utilisé pour la fabrication du papier et du bois de charpente. Les sapins baumiers servent aussi d'arbres de Noël.	
Sapin bleu <i>(Picea pungens 'Glauca')</i>	Arbre	Sapin bleu du Colorado, conifère à jeunes aiguilles bleues argentées.	
Sapin de Douglas <i>(Pseudotsuga douglasii)</i>	Arbre	"sapin" de Douglas, conifère érigé nord américain.	




Nom	Type	Description	Image
Sapin de Vancouver <i>(Abies grandis)</i>	Arbre		
Sapin du Colorado <i>(Abies concolor)</i>	Arbre	<p>Le sapin du Colorado est un conifère qui peut atteindre 55 m. L'écorce des jeunes troncs est lisse, grisâtre, à vésicules de résine ; elle devient épaisse, dure et crevassée avec des sillons en vieillissant.</p>	
Sapin du Japon <i>(Abies firma)</i>	Arbre	<p>Sapin "Momi", conifère à branches fortes, étalées et à rameaux semi-érigés.</p>	




Nom	Type	Description	Image
Sarcococca (<i>Sarcococca humilis</i>)	Buisson	Arbuste drageonnant à feuillage persistant, buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Saule argenté, saule blanc, saule vivier (<i>Salix alba-d</i>)	Arbre	Arbre caduque à croissance rapide, à cime étalée, conique dans le jeune âge. Les feuilles étroites sont gris argenté vif.	
Saule pleureur (<i>Salix alba 'Chrysocoma'</i>)	Arbre	Parcs ou jardins.	




Nom	Type	Description	Image
Saule taillé (<i>Salix alba-b</i>)	Arbre	Arbre taillé par rapprochement.	
Sawara (<i>Chamaecyparis pisifera</i>)	Arbre	Conifère à branches assez étalées.	
Saxifrage (<i>Saxifraga x arendsii</i> 'Gaiety')	Herbe	Plante couvre-sol à feuillage compact.	




Nom	Type	Description	Image
Senecio (Africain) Fleurs Jaunes (<i>Crassocephalum mannii</i>)	Arbuste	Mauvaise herbe succulente avec une tige duveteuse. Grandes feuilles. Fleurs jaunes.	
Séquoia côtier (<i>Sequoia sempervirens</i>)	Arbre	Originaire de Californie, c'est un des arbres les plus grands du monde pouvant vivre jusqu'à 2000 ans : le plus haut spécimen mesure 112 mètres Le bois, d'excellente qualité, dépourvu de canaux résinifères, est imputrescible. Il résiste bien aux insectes et aux incendies. Il est utilisé en menuiserie. Ne pas dépasser 30 ans en 3D, pas de limite dans les autres modes.	
Sisal sauvage, Sisal masaï, Sisal oldupai (<i>Sanseveria ehrenbergiana</i> (syn. <i>S. ehrenbergii</i>))	Indéfini	Plante succulente qui pousse dans la gorge de l'Oldupai au Serengeti.	




Nom	Type	Description	Image
Skimmia (<i>Skimmia japonica</i> <i>var.</i>)	Buisson	Buisson à port compact étalé, feuillage persistant, buisson limité comme par une taille de conduite.	
Sorbier des oiseaux, sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i>)	Arbre	Son aire de répartition naturelle couvre toute l'Europe et l'Asie tempérée. Répandu par la culture, il s'est naturalisé ailleurs, notamment en Amérique du Nord. Cet arbre, qui est le plus répandu des sorbiers, est souvent planté comme arbre d'alignement ou d'ornement dans les parcs et jardins. Arbre à feuillage caduc, port étalé. Feuilles à folioles vert moyen virant au rouge ou au jaune en automne. Fleurs printanières blanches, et fruits rouges à l'automne.	
Sorbier torminal, alisier (<i>Sorbus torminalis</i>)	Arbre	Arbre caduc.	




Nom	Type	Description	Image
Souchet géant (<i>Cyperus immensus</i>)	Herbe	Plante de marécage qui a besoin d'un sol humide à mouillé. Originaire de l'Afrique de l'Est, également connu sous le nom de plante ombrelle.	
Spirée blanche (<i>Spiraea x vanhouttei</i>)	Buisson	Arbuste à pousses minces et arquées, feuilles caduques. Buisson limité en hauteur comme par une taille de conduite.	
Sporobolus ioclados (<i>Sporobolus ioclados</i>)	Herbe	Herbe graminiforme commune des savanes africaines.	




Nom	Type	Description	Image
Sporobolus rouge (<i>Sporobolus festivus</i>)	Herbe		 A 3D digital rendering of a Sporobolus rouge grass plant. It features several thin, upright stems with long, narrow, blade-like leaves. At the top of one stem is a dense, elongated spike of small flowers.
Styrax du Japon (<i>Styrax japonica</i>)	Arbuste	Arbre à feuillage caduc, port étalé, portant en début d'été, parmi les feuilles luisantes vert foncé, une profusion de fleurs blanches pendantes en forme de cloche.	 A 3D digital rendering of a Styrax du Japon tree. The tree has a rounded, spreading canopy of dark green, glossy leaves. It is shown casting a soft shadow on the ground beneath it.
Tabac décoratif-a (<i>Nicotiana glauca</i> 'Domino')	Fleur	Tabac ornemental à floraison blanche.	 A photograph of a flowering plant, identified as Tabac décoratif-a. The plant is in full bloom, showing numerous small, white, star-shaped flowers. The background is slightly blurred, showing a white building with a red door and some greenery.




Nom	Type	Description	Image
Tabac décoratif-b (<i>Nicotiana glauca</i> 'Sensation')	Fleur	Tabac ornemental à floraison rouge.	
Tabebuia, Tecoma rose (<i>Tabebuia rosea</i>)	Arbre	Originnaire d'Amérique continentale, allant du sud du Mexique au Vénézuéla et à la partie côtière de l'Equateur, le tabebuia rosea est un grand arbre à feuillage caduc et à pousse rapide pouvant atteindre de 25 à 30 m de hauteur et 1 m de diamètre (tronc). La couronne est large, stratifiée et irrégulière, avec quelques branches horizontales épaisses. L'écorce est grise. Les feuilles sont composées de 5 lobes inégaux en taille, le lobe central étant le plus large.	
Taro géant - APE (<i>Alocasia macrorrhiza</i>)	Indéfini	Plante originaire de Malaisie, Sri Lanka, Inde et poussant tout autour du Pacifique Sud. Les Polynésiens l'appellent Ape. Elle est aussi nommée ""oreille d'éléphant"" en raison de la taille de ses feuilles. Les feuilles poussent à partir du centre de la plante et peuvent avoir une longueur de 3 à 4 mètres.	



Nom	Type	Description	Image
Taro, Grande toyave - APE <i>(Alocasia esculanta)</i>	Indéfini	Native de la Malaisie, du Sri-Lanka et de l'Inde, cette plante a de larges feuilles qui poussent sur des pétioles en forme de tubes.	 A photograph of a large green plant with heart-shaped leaves and thick, upright stems, set against a white background.
Teck <i>(Tectona grandis)</i>	Arbre	Situé en Inde, aux Philippines et à Java. Atteint environ 30 mètres de haut. Fleurs bleuâtres-blanches en glomérules. Connu pour sa résistance.	 A photograph of a tall, slender tree with a dense canopy of green leaves and small, light-colored flowers. A circular inset shows a close-up of the foliage. The tree is set against a white background with a shadow.
Thuja géant <i>(Thuja plicata)</i>	Arbre	Cette espèce est originaire des régions occidentales d'Amérique du Nord, très cultivée comme arbre d'ornement, notamment dans les jardins sous forme de haies.	 A photograph of a tall, conical evergreen tree with a dense, dark green canopy and a thick trunk. The tree is set against a white background with a shadow.

Nom	Type	Description	Image
Tiarelle vigoureuse (<i>Tiarella cordifolia</i>)	Herbe	Tiarelle vigoureuse, plante vivace à feuilles persistantes.	
Tilleul à grandes feuilles, tilleul de Hollande (<i>Tilia platyphyllos</i>)	Arbre	Arbre à port étalé. Feuilles caduques, arrondies, vert vif.	
Tilleul-a (<i>Tilia cordata</i>)	Arbre	Jeune tilleul.	

Nom	Type	Description	Image
Tilleul-b (<i>Tilia x europaea</i>)	Arbre	Tilleul taillé.	
Tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)	Fleur	Plante annuelle.	
Trèfle blanc (<i>Trifolium pratense</i>)	Fleur		

Nom	Type	Description	Image
Troène de Chine (<i>Ligustrum delavayanum</i>)	Buisson	Arbuste dense, buissonnant à feuillage semi-persistant.	
Tulipe hybride de Darwin (<i>Tulipa 'x Darwin'</i>)	Fleur	Plante bulbeuse à fleurs. Grandes fleurs simples, à fort pédoncule éclochant de la mi printemps à la fin de cette saison.	
Tulipier (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	Arbre	Arbre vigoureux à feuilles caduques lobées, tronquées, vert foncé. En été, fleurs blanc verdâtre teinté d'orange.	

Nom	Type	Description	Image
Valériane glauque (<i>Centranthus ruber</i> ' <i>Coccineus</i> ')	Fleur	Centranthus, valériane à floraison rose.	
Vigne vraie (<i>Vitis vinifera</i>)	Arbuste	Plante sarmenteuse, taillée en gobelet pour la récolte du raisin. Le feuillage caduque est vert devenant jaune à pourpre en automne.	
Viorne à feuilles de néflier (<i>Viburnum rhytidophyllum</i>)	Buisson	Arbuste vigoureux, à port étalé, longues feuilles étroites, persistantes, cymes de fleurs blanc crème au printemps suivies de fruits rouges puis noirs.	

Nom	Type	Description	Image
Viorne lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	Buisson	Arbuste vigoureux, dressé, feuilles caduques ovales foncées, parfois rougeâtre à l'automne, cymes de fleurs blanc crème au printemps parfois suivies de fruits rouges puis noir bleuté.	
Weigélia (<i>Weigela 'B. Ruby'</i>)	Buisson	Buisson à port assez érigé, abondante floraison rouge.	
Ylang Tlang - MOTOI (<i>Canaga odorata</i>)	Arbre	Originare d'Asie du Sud-est (Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines en zone tropicale humide). On le cultive pour ses fleurs dont on extrait par distillation une huile essentielle très utilisée en parfumerie.	